

মিওপ্যাথি মতানুযায়ী গাইস্‌স্‌ চিকি
প্রণালী ।

বৈদ্য-কুলজ
শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক
সঙ্কলিত ।

বেরিণী এবং কোম্পানি দ্বারা ৩

Calcutta :

P. ROY & CO. PRINTERS. No. 67, EMAMBARIEE LANE, BENTINCK ST.

1870.

মূল্য তিন টাকা আট আনা ।

প্রাচীন চক্ষুঃ পীড়া	৩৮
শ্লেষ্মা জন্ম চক্ষুঃ রোগ	৩৯
বায়াত এই এই এই	৩৯
চক্ষুর ভিত্তির কোণের নালি ঘা	৩৯
রক্তবর্ণ চক্ষুঃ	৪০
অপ্প দৃষ্টি	৪১
আঞ্জিনা অর্থাৎ চক্ষুঃবর্ণ	৪২
কর্ণ রোগ	৪৩
কর্ণ মূল	৪৩
কর্ণের ভিত্তির কল	৪৩
কর্ণ শূল	৪৪
কর্ণ হইতে রসস্ত্রাব অর্থাৎ কাণ্ গলা	৪৫
শ্লেষ্মা জন্ম কাণ্ গলা	৪৬
কর্ণের ভিত্তির শব্দ বোধ বা কাণ্ ভেঁ ভেঁ করা	৪৭
বন্ধুরতা অর্থাৎ শ্রবণ শক্তির অপ্পতা	৪৮

প্রাণাতির নাম

নাগিকার ক্ষী

নাগিকা দ্বারা

নাগিকার ভি

পলিপস্ । এ

মুখ রোগ

মাটির ফোড়া

জান দন্ত দ্বারা

মাটি হইতে রক্ত

দন্ত রোগ

বমন প্রদাহ

জ্বর প্রদাহের

বিস্তার

মুখে দুর্গন্ধ

শিশু বা অনা জগৎ

ঘাড়ের বেদনা অর্থাৎ কিক্

৭১

দন্তের পীড়া

৭২

গলার ভিতর পাকা

৭৫

কত বিশিষ্ট গলার বেদনা

৭৬

স্বরভঙ্গ

৮০

প্রাচীন স্বরভঙ্গ

৮১

কফ রোগ

৮২

মস্তকে কফ বদ্ধ হইলে মাথা ধর

৮৪

নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট

৮৫

মস্তকে কফ বদ্ধ হইলে

৮৬

কাশ রোগ

৮৬

দামাচা কাশীর চিকিৎসা

৮৭

কৃত্রিম রোগের কারণসমূহ

কৃত্রিম রোগ

কৃত্রিম রোগ

প্রাচীন রোগ

অজীর্ণ রোগ

অল্পপিত্ত

প্রকারান্তর অর্থাৎ শূল ব্যাধি

কোষ্ঠবদ্ধ

অর্শঃ

হারীষ

যক্ৰৎ

যক্ৰতের জড়তা

তক্ৰণ যক্ৰৎ হৃদ্ধি

যক্ৰতের স্ফোটক

প্রাচীন যক্ৰৎ রোগ

কামলা রোগ

রোগাদির নাম	
আমশূল	...
অতিসার	...
আমাশয়	...
ভেদ বমি অর্থাৎ ওলাউচা	...
আতিসারিক ভেদ	...
রসাপ্রিত ভেদ	...
অঙ্গগ্রহ বিশিষ্ট ভেদ	...
শুষ্ক ভেদ	...
প্রথর ভেদ	...
আত্মিক রসাপ্রিত ভেদ রোগ	...
আমাশয়রাসিত ভেদ রোগ	...
ভেদ রোগের অবস্থান্তরের বিশেষ চিকিৎসা	...
ভেদ রোগের লক্ষণানুসারে চিকিৎসা	...
প্রস্তাব	...
স্বব	...
বক্ষঃস্থল	...
খঁচনি বা খিল লাগা	...
নাড়ী	...
নানাবিধ মিশ্র লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা	...
ভেদ বমির পরেতে যে উপসর্গ উপস্থিত হয় তাহার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা	১৫৯
শোথঃ	...
বক্ষঃস্থলের শোথঃ	...
উদরীয় শোথঃ বা জ্বলোদরী	...
বাত রোগ	...
গ্রন্থিবাত	...
প্রাচীন গ্রন্থি বাতের চিকিৎসা	...

ঐ

১৫৭

ঐ

১৫৯

১৬১

ঐ

১৬২

১৬৫

ঐ

১৬৭

পরিচয়

	১৬১
	১৬২
	ঐ
	১৭০
	ঐ
	ঐ
	১৭৪
	১৭৫
	১৭৭
	১৮০
	ঐ
	১৮২
	১৮৩
	১৮৭
	১৮৮
মুখপান	১৮৯
কুইনাইন্ দোস জন্ম রোগের চিকিৎসা; .. .	১৯১
পারা দোস জন্ম রোগ	১৯৩
ম্যাগ্নেশিয়া বা এপ্সম্ সল্ট, ব্যবহার জন্ম রোগের চিকিৎসা; ...	১৯৬
হুল বিশিষ্ট কীটাদির আঘাত বা দংশন .. .	১৯৭
আঘাত	১৯৮
মোচড়ানি বা মচ্কিয়া যাবৎ	১৯৯
ক্ষত	২০০
কাটা ঘায়ের চিকিৎসা	২০১
ছিন্ন ক্ষত অর্থাৎ ছেঁড়া ঘায়ের চিকিৎসা .. .	ঐ
ছাঁচা ঘায়ের চিকিৎসা	২০২

রোগাদির নামঃ	
খোঁচা ঘায়ের চিকিৎসাঃ	...
গুলির ঘায়ের চিকিৎসাঃ	...
চর্ম রোগঃ	...
রক্তকৃষ্ঠ	...
স্ফোটক অর্থাৎ ফোড়া	...
রক্তবর্ণ ব্রণ	...
কণ্ঠ অর্থাৎ চুল্কনা	...
পাচড়া	...
দস্ত (দাউদ)	...
পোড়া বা বালসান পঃ	২১
সংসারণ ক্ষত	২১
আঙ্গুলহার, বা ছুরা	২২
স্ত্রীলোকের চিকিৎসাঃ	৩২
আন্তর রোগের চিকিৎসাঃ	১২২
প্রদর	২১
কফাক্তস	২২
গার্তবাতিশযা	২৩
পেচুরা বা পাওয়া এক প্রকার বায়ু রোগ	২৩
গর্ভ	২৩
অন্তরপতাবস্থায় কর্তব্য বিধি	২৬
গর্ভকালীন চিকিৎসাঃ	২৪
গর্ভকালীন কোষ্ঠাবরোধের চিকিৎসাঃ	২৪
গর্ভকালীন মূচ্ছা	২৪
গর্ভকালীন দন্তরোগ	২৪
গর্ভকালীন বদন কুলিলে চিকিৎসাঃ	২৪
গর্ভকালীন শিরা ফোলা	২৪

শিশুর মস্তকে শ্লেষ্মাবদ্ধ	...	১৭৬
সদ্ব্যজাত শিশুর অনিদ্রা ও রোদন পরায়ণতা	...	১৭৬
শিশুর উদব ক্ষীততা	১৭৭
শিশুর দুগ্ধ কৃষ্ণুড়ি	১৭৮
শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা	১৮০
শিশুর অস্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা	১৮১
শ্লেষ্মাবদ্ধতার অতিসার	১৮২
মাত্রের অসংযততা	১৮৫
শিশুর মৃত্যাবরোধ	১৮৬
শিশুর কমল রোগ	১৮৭
শিশুর দাঁতি লাগা	১৮৮
দন্ত উঠিবার সময়ের রোগ	১৯০
শিশুর তজ্জ টঙ্কার	১৯১
শিশুর শোথঃ মস্তকে জলভাব	১৯৭
শিশুর স্বাস কাশ রোগ অর্থাৎ ইম্প্যানি	৩০০
শিশুর পাল জ্বর	৩০২
এই রোগ বহুকাল স্থায়ী বা অশুভজনক হইলে তাহার চিকিৎসা	...	৩০৬
শিশুর ক্ষয় রোগ	৩০৮
এই পুস্তকে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইল তাহাদিগের বিশেষ গুণ	...	৩১৩
এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নির্যণ্ট	...	৩৫৫
এতদ্ব্যন্তরে যে সকল কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ	...	৩৫৭

মুখবন্ধ ।



... দ্বন্দ্বার্থ কাম্যমোক্ষাণাং আরোগ্যংমূলমুত্তমম ॥

মনুষ্য লোক মাত্রেই সংসার মধ্যে বহুবিধাংশ সহকারে উন্মোক্ত বর্ণ
চতুষ্টয় সংসাদন প্রত্যাশায় বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট ঘৃণা,
আরোগ্য । এই রূপ আমাদের দেশস্থ প্রাচীন মুনিগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত
হইয়াছে, এবং নানা দিগ্দেশীয় বহু-বিজ্ঞা-বিশারদ পাণ্ডগণ ও স্বীকার
করিয়াছেন । অতএব সেই আরোগ্য বিধান উদ্দেশ্যে এতদ্দেশীয় প্রাচীন
চিকিৎসা বিজ্ঞাবিৎ পাণ্ডিতগণ বহুবিধ যত্ন পূর্বক কঠিনশ্রম, দ্রব্য গুণ
পরীক্ষা, প্রভৃতি করিয়া দেশের পরম মঙ্গলের মূল সংস্থাপন করিয়া গিয়া-
ছিলেন । তদ্বাধ্য ধন্যত্বি, দিবোদাস, চরক, প্রভৃতি মুনি এবং পাণ্ডিতগণ
আয়ুর্বেদ, চরক, সূত্রসংহিতা প্রমুখ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা জীবের কতই উপকার সাধন
করিয়াছেন তাহা বর্ণন করা যায় না, কিন্তু বর্তমান কালে এতৎ প্রদেশের
দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ গ্রন্থ সকলের আলোচনা, পাঠ, এবং তদনুসারে
চিকিৎসা করণাদি প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, এক্ষণে যে
কোনো জন আমাদের বৈজ্ঞানিক কলতিলক চিকিৎসা বিজ্ঞা-বিশারদ,
চিকিৎসক মাত্র জীবিত আছেন, তাঁহার লোকান্তর গত হইলেই বোধ হয়
আর তাদৃশ চিকিৎসার উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হইবে না, সুতরাং দেশ, কাল, পাত্র
বৈষম্যবশতঃ আমাদের বিজ্ঞাতীয় চিকিৎসা প্রণালীর শরণ লইতে হই-
তেছে । অপিচ চরক বলিয়াছেন “তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায়
কম্পতে । সচৈব ভৈষজ্যং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥” যদ্বারা
আরোগ্য হয় তাহাই উপযুক্ত ঔষধ এবং যিনি রোগ হইতে মুক্ত করেন
তিনিই চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অতএব এক্ষণে যাহাতে অস্পায়্যাণে
নিশ্চয় রূপে রোগ আরোগ্য হয়, সেই মতই গ্রাহ্য ।

বহুকালাবধি এতৎ প্রদেশে আয়ুর্বেদী মতানুযায়ী চিকিৎসা প্রকরণ প্রচলিত হওয়া অব্যাহত যবনাধিকার কালে ক্রিয়াকাল পর্যন্ত ইউনানি (ইকিমি) মত প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন এবং পরেতে অল্পকাল মধ্যে উপরোক্ত উভয় মতকে নিরংপ্রায় করিয়া রাজ-সহায় এলোপ্যাথি, (ডাক্তরি) মত প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে সদৃশ ব্যবস্থা (হোমিওপ্যাথি) মত প্রকাশিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু এতন্মতে সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রকরণ সুনির্বেশিত কোন পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রচারিত না থাকায় তাদৃশ অভাব কথঞ্চিৎ প্রকারে দূরীকরণ-ভিলাষে, কএক জন পর হিতৈষী বিশিষ্ট ভদ্র লোক, বিশেষতঃ এবং প্রথমতঃ আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের অনু-রোধে এই গ্রন্থ প্রণয়ন রূপ মহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু ইহাতে আমি কত দূর রূতকার্য্য হইব তাহা নির্দেশ করিতে পারি না, কারণ ইহা মাদৃশ জনের পক্ষে “প্রাংশুগম্যে ফলে লোভাদুহ্বাহরিব বামনঃ” ইত্যাদির ত্রায় দুরাশা, তবে কেবল এই মাত্র ভরসা করিতে পারি, যখন আমি সাধারণের উপকার উদ্দেশে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন সন্থদয় মহানুভাব ব্যক্তি মাতেই যে আমাকে উৎসাহ প্রদান করিবেন তাহাতে অনুমাত্র ও সংশয় নাই।

সদৃশ ব্যবস্থা একটা নব প্রকাশিত মত, অত্য়াপি ইহার তাৎপব বিশেষ রূপে সর্বসাধারণে অবগত হইতে পারেন না, তজ্জগৎ এতন্মতের উপস্থিত প্রতিদ্বন্দী এলোপ্যাথি, মতের সহিত এমতের চিকিৎসাপ্রণালীর দোষ গুণের ভারতম্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি, এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণ সমীপে এই মাত্র সবিনয়ে প্রার্থনা যে, তাঁহারা পক্ষ-পাত শূন্য হইয়া বিচার করিলেই আমি চরিতার্থ হইব।

এতৎ প্রদেশে ঐহাদের এলোপ্যাথি মতে একান্ত ভক্তি আছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই (নিরুপক্ষ, যতার্থ বাদী, প্রতিষ্ঠাপত্র-প্রাপ্ত, ডাক্তর গণও) যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে প্রাচীন রোগের পক্ষে উক্ত মতের ঔষধ কোন প্রকারে ফসাদায়ক হয় না, অতএব তাদৃশ বিষয় পরিত্যাগ করিয়:

জ্বরাদি তরুণ রোগের চিকিৎসায় উক্ত মতানুসারে যে আশু প্রতিকার কারিণী শক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহারই প্রযোজনায় প্রস্তুত হইতেছি।

এলোপ্যাথি মতের চিকিৎসায়, জ্বর রোগের প্রথমাবস্থায়, স্ট্রালাইন্স মিক্সচর প্রভৃতি ভেদক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিরেচন করাইয়া জ্বর বিরাম কালে (বিরতি না হইলেই ঘোর বিপদ) বহু পরিমাণে পুনঃ পুনঃ কুইনাইন্ সেবন করাইয়া জ্বর নিবারণ করা রীতি আছে, তদ্রূপ উপদংশ রোগে অধিক পরিমাণে পারা সেবন দ্বারা অতিরিক্ত লাল নিঃসরণ করাইয়া ক্ষত আরোগ্য করা নিয়ম প্রচলিত আছে। উক্ত উভয় প্রকার রোগে উভয় প্রকার ঔষধ, আশু বিশেষ উপকার দায়ক হইলে ও পরেতে যে নানাবিধ শরীর নাশকরোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় এতৎ প্রদেশে তাহারই অবিস্তৃত নাই।

প্রবাদ আছে যে কুইনাইন্ দ্বারা প্রথমতঃ জ্বর, বন্ধ হইয়া পরেতে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্বার প্রকাশিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, কুইনাইন্ একটী স্বতন্ত্র রোগ রূপে পরিণত হইয়া তাহার আনুসঙ্গী পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যক্ষ্মা, কামলা, শোথঃ, অজীর্ণ, অতিসার, রক্ত ক্ষয়, ইত্যাদি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে। এইরূপে অপর ঔষধ পারা, অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে, প্রথমতঃ উপদংশের ক্ষত আরোগ্য করিয়া স্বয়ং একটী স্বতন্ত্র রোগ রূপ ধারণ করতঃ সর্বদা ক্ষত, পিনস্, চক্ষুঃ, কর্ণ, এবং মুখ রোগ, বাত প্রভৃতি নানাবিধ শরীরনাশক দ্রুদ্রম্য রোগ সকল উৎপন্ন করায়।

উপরেক্ত উভয় প্রকার ঔষধ জন্ম বিরুদ্ধিজ রোগ সকলের প্রতিকার করিতে হইলে এলোপ্যাথি মতে বহুকাল পর্যন্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করান রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তদ্বারা রোগী, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আমৃত্যু নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। এতৎ প্রদেশে এলোপ্যাথি মতের চিকিৎসার বিস্তীর্ণতা নিবন্ধন প্রায় সকলেই উক্ত ঔষধদ্বয় জন্ম বিরুদ্ধি এবং তন্নিবারণের উপায়, উক্ত মতানুসারে যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা

বিশেষ রূপে অবগত আছেন, অতএব তদ্বিষয়ে অধিক আন্দোলন করণের প্রয়োজনীয়তা। একান্ত পরিণেবে ইহাও উল্লেখ করা কর্তব্য হইতেছে যে কুইনাইন্ এবং পারা অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহারা কেবল ভুক্ত-দ্রব্য-বাহক-প্রণালী বা পাকস্থলীতে নিবদ্ধ থাকে না যে বিরেচন দ্বারা নির্গত হইতে পারে। তাহারা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিরা, স্নায়ু-শিরা, স্নায়ু, অস্থ্যাবরক-স্নায়ু-তন্তু, অস্থি, মজ্জা, পর্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে, অতএব পৃথিবী মধ্যে অত্যাধিক ও এমত কোন প্রকার বিরেচক ঔষধ আবিস্কৃত হয় নাই যে, তাহাদিগকে বিরেচন দ্বারা শরীর হইতে নিঃসৃত করণের শক্তি ধারণ করে।

সদৃশ ব্যবস্থা মতে জ্বর নিবারণ জন্ত প্রথমতঃ বা চিকিৎসার কোন কালে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করাইয়া রোগীকে অবসন্ন করা রীতি নাই। জ্বরের প্রবলাবস্থায় অত্যধিক পরিমাণে লক্ষণানুযায়ী ব্যবস্থায় ঔষধ সেবন করাইলে ক্রিয়াকালের মধ্যে জ্বর নিবারিত হইয়া রোগী ক্রমশঃ সবল হইতে থাকে এবং পরেতে কোন প্রকার ঔষধ জন্ত বিরূতি বা প্রাচীন জ্বরাদি কদাচই প্রকাশিত হয় না। তদ্রূপ উপদংশ রোগ, লক্ষণানুসারে ঔষধ সেবন করিলে লাল নিঃসরণাদি না হইয়া, অত্যশ্চর্য্য রূপে নিরাকৃত হয়, এবং পরেতেও কোন প্রকার ঔষধ জন্ত উপসর্গ উপস্থিত হয় না। এতদ্ভিন্ন কুইনাইন্ এবং পারা, রোগ বিশেষের লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা এরূপ অনুমাত্র মাত্রায় যে তত্তৎ ঔষধ দ্বারা কেবল উদ্দেশ্য রোগই নিবারিত হয়, অথচ তাহারা কোনমতেই শরীরের মন্ব বিশেষ আশ্রয় করিয়া বিরূতি জন্মায় না। অতএব উভয় মতের মধ্যে যাহার ঔৎকর্য্য সংস্থাপিত হইতেছে তাহা নিকপেক্ষ পাঠকগণ বিচার পূর্বক স্থির করিবেন আমার অধিক প্রতিবাদের প্রয়োজনাত্মক।

সদৃশ ব্যবস্থা মত, এতৎ প্রদেশে নবাগত, এবং রাজসহায় বিহীন স্মৃতরাং ইহাকে উন্মূলিত করিবার মানসে এতৎ প্রদেশীয় অনেকানেক বুদ্ধিমান লোক ও বিশেষ রূপে দোষ গুণের পরীক্ষা না করিয়া এলোপ্যাথি মতের প্রতি অচলা ভক্তি বশতঃ নানাবিধ প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, অতএব

ততৎ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদানে বাধ্য হইতেছি। বোধ করি উদার-স্বভাব পাঠক মহোদয়গণ স্বীয় স্বীয় উদারতা প্রদর্শন করিবেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন্ হোমিওপ্যাথি মতের ঔষধের মাত্রা এমত অল্প যে তাহাতে কোন মতেই রোগ নিরাকৃত হইতে পারে না, কেবল বিশ্বাসে অথবা পথ্য ব্যবস্থার কাঠিন্য প্রযুক্ত বা স্বভাবতঃই কালেতে আরোগ্য হইয়া থাকে ইত্যাদি।

যে স্থলে দেখা যাইতেছে যে (ইতরেরের জ্ঞানাতঃ সত্ত্বে ও) শিশুর এবং পশুর রোগ সকল অপর্যায়সে এমতের ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হইতেছে, তখন বিশ্বাসে আরোগ্য হয়, এরূপ কদাচই বলা যাইতে পারে না।

আমি অল্প চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করিয়া বহু সংখ্যক দরিদ্র লোকের আহারের পথ্য ব্যবস্থানুসারে চলিবার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। এই মতের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছি, অনেকেই অত্যশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, অতএব পথ্য ব্যবস্থার কাঠিন্য প্রযুক্ত আরোগ্য হয়, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আর ও যদি তাহাই সত্য হইত তাহা হইলে দেশস্থ ধনীগণ, যাহারা অনায়াসে আহার পরিচ্ছদাদির নিয়মানুসারে চলিতে পারেন, তাহাদের আর চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের প্রদেশে পূর্বে যে আয়ুর্বেদী মতে চিকিৎসিত হইয়া এককালে আরোগী হইত, সে মতে যে প্রকার উপবাস প্রভৃতি কঠিন নিয়মাদি আছে, তাহার সহিত ইহার পথ্য ব্যবস্থার তুলনা করিলে,--এমতের নিয়ম যে কত গুণ সহজ তাহা পাঠক গণ অনুভব করিবেন।

এতৎ প্রদেশে যে সময়ে তাড়িৎবার্তাবহ প্রকরণ প্রকাশ ছিল না, তৎকালে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি এতদ্বিষয়ের আশ্চর্য্য গুণ প্রকাশ করিলে অনেকানেক বুদ্ধিমান লোকও অলীক জ্ঞান করিয়া উপহাস করিতেন। পরে বঙ্গের কালের গতিতে এক্ষণে তাহার গুণ বালকেও অবগত হইয়াছে, স্তরং

তদ্বিষয়ে আর কাহারই সংশয় জন্মেনা, তদ্রূপ সন্দৃশ ব্যবস্থা মতের তাৎপর্য্য-
নভিজ্ঞ জনগণের নিকট সম্প্রতি হাশ্বাস্পাদ হইলেও যে কালেতে ইহা সংসার
মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া বহু মঙ্গলের আকর হইবে, তাহাতে অনুমাত্র ও
সংশয় নাই।

এক্ষণে পাঠকগণ সমীপে বিনয় পুরসংগ আমার এই মাত্র নিবেদন
যে তাঁহার অন্যত্র নাট্য, কাব্য, উপন্যাসাদি বিভ্রান্ত পুস্তকগণের ন্যায়
গ্রন্থ খানি পাঠান্তে পরিত্যাগ না করিয়া, এতদ্ব্যতীত ঔষধ সকল
লিখিত লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করতঃ কি প্রকার ফলদায়ক হয়, তাহা
দর্শনপূর্ব্বক পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিবেন।

আমি এতদ্ব্যতীত প্রণয়ন জন্য পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। ইহা কোন
গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ মাত্র নহে। চিকিৎসা বিভ্রাণিশারদ, লরি, হেরিং,
হেম্পল্, জম্বলিন্, মর্গ্যান্, জার্, হম্ফ্রিস্ প্রভৃতি গ্রন্থ কর্তৃগণের গ্রন্থ
সকলের আশ্রয় লইয়া চিকিৎসা দ্বারা স্বয়ং যাদৃশ ফল দেখিয়াছি তাহাই
এতৎ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং ভিন্ন দেশীয় আহার পরিচ্ছদাদির
নিয়ম, এতৎ প্রদেশীয় লোকের প্রতি কোন মতেই বিধেয় হয় না, তজ্জন্ত
প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতের পথ্য ব্যবস্থার সহিত সন্দৃশ ব্যবস্থার পথ্য নিয়মের
ঐক্য করিয়া পথ্যাদির নিয়মাবধারণ করিয়াছি।

পরিশেষে যে সকল ব্যক্তি পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে আমার সাহায্য
করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া এবং তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা
স্বীকার না করিয়া প্রস্তাবনা পরিসমাপ্ত করিতে পারিলাম না।

মহামাত্র সর্গীয় ৮ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র মহানুভাব
শ্রীযুক্ত কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর তাঁহার কর্মোপার্জ্জ্বে আমাদি-
গের বাস গ্রামে অবস্থিতি সময়ে, প্রথমতঃ বহু তর্কের পর, সন্দৃশ ব্যবস্থা
মতের গুণ পরীক্ষায় যত্ন শীল হওনের জন্ত স্বয়ং পুস্তক এবং ঔষধাদি প্রদান
করতঃ আমাকে উপদেষ্টা করেন। আমি তদবধি বহু সহস্র লোকের
চিকিৎসা করিয়া ক্রমশঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম! কিয়ৎকাল গতে
উক্ত মহাত্মা প্রত্যহের বঙ্গভাষায় এক খানি সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য চিকিৎসার

উপযোগী পুস্তক লিখিতে আমাকে নিতান্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তৎকালে আমি চিকিৎসা কার্যে অত্যন্ত ব্যাপ্ত থাকায়, এবং লেখক অভাবে স্বহস্তে লেখা অত্যন্ত দূরূহ বিবেচনায়, অতাপ্পমাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। অনন্তর স্বীয় কার্যোপলক্ষে জেলা রাজশাহী বোয়ালিয়াতে আমার অবস্থিতি কালে তত্রতা কএকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বিশেষতঃ লোকনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ত্রিযুক্ত বাবু ত্রিশচন্দ্র রায় মহোদয় এবং বোয়ালিয়া গবর্ণমেন্ট স্কুলের অন্যতর শিক্ষক ত্রিযুক্ত বাবু বেগীমাধব সরকার, এতদুভয়ে লেখকের কঠোর ভার গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতে পুস্তক আরম্ভ করিলাম এবং তাঁহাদের প্রযত্নে অতাপ্পকাল মধ্যে সম্পন্ন হইল। কিন্তু আমার দূরদৃষ্ট প্রযুক্ত কেহই সংশোধনের ভার গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং পুস্তকে যে কিছু দোষ লক্ষিত হইবে তাহা কেবল আমারই জানিবেন। ভরসা করি দীর্ঘগণ, স্বীয় স্বীয় গুণে সংশোধন করিয়া লইবেন।

১২৭৭ সাল। }
১০ই আশ্বিন। }

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক।
মেহেরপুর জেলা নদীয়া।

উপক্রমিকা ।

মদুশ ব্যবস্থা অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির সংক্ষেপ বিবরণ ।

এই চিকিৎসা প্রণালী প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে পরম পণ্ডিত ডিমোক্রাইটস্ কর্তৃক প্রথম কল্পিত হইয়া পরেতে হিপক্রেটিস্ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয় । তদনন্তর ইউরোপ মহারাজ্যের অধীন জার্মানী মহাপ্রদেশের অন্তর্গত স্যাক্স-নির অন্তর্ভূত মাইসন্ নগরে ১৭৫৫ সালের ১০ই এপ্রেল দিবসে হানিম্যান নামক মহাত্মার জন্ম হয় । উক্ত মহাত্মা ল্যাটীন, গ্রীক, ফরাষি, ইংরাজি, জার্মন্ প্রভৃতি ভাষার পারদর্শী ছিলেন । ১৭৯০ সালে গোমরগ নগরে তাঁহার অবস্থিতি কালীন ঔষধের শক্তি বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হয় । তাহার আদিম বৃত্তান্ত এই যে এলোপ্যাথি মতের ঔষধের রোগ নিরাকরণ শক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে প্রথমতঃ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া স্বাস্থ্যাবস্থার কুইনাইন সেবন দ্বারা দেখিলেন যে, তদ্বারা জ্বর উৎপন্ন হয় । তৎপরে অন্যান্য ঔষধের ঐক্যপ পরীক্ষা করিয়া পরম পণ্ডিত চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মা স্থির করিলেন যে, যে সমুদয় ঔষধ স্বচ্ছন্দ শরীরে সেবন করিলে যাদৃশ রোগ উৎপন্ন করায়, তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত রোগ সেই ঔষধ দ্বারা নিরাকৃত হয় । তখন এই মতে কিচিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে ঔষধের ভাগ যত অল্প পরিমাণে দেওয়া যায় ততই অধিক উপকার করে । পরে এই মতের চমৎকারিতা

দর্শনে আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডস্থ বহুতর চিকিৎসা বিদ্যা
বিশারদগণ বাঁহারা পূর্বে এলোপ্যাথি মতের এম ডি, উপাধি
প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এই মত
গ্রহণ করিয়া নানাবিধ ঔষধ প্রকাশ ও তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি
প্রস্তুত করিয়াছেন এবং করিতেছেন । এক্ষণে তদনুসারে এ
মতের চিকিৎসা দেশ বিদেশে চলিতেছে ।

হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ ।

এই মতে চারি প্রকারে ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—

- ১। (টিক্‌চর) আরক।
- ২। (পিলিউল) বড়ি।
- ৩। (গ্লবিউল) ক্ষুদ্র বটীকা।
- ৪। (ট্রাইটিউরশেন) গুঁড়া।

অনুপান জল ।

তাঁহাও চারি প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা ;—

- প্রথম। কলের দ্বারা নির্মলীকৃত জল
- দ্বিতীয়। বর্ণার জল।
- তৃতীয়। রাক্টর জল।
- চতুর্থ। গরম জল শীতল করিয়া।

এই সকল নিয়ম পুস্তকে লিখিত আছে । যদিপিও
উক্ত প্রণালী মত পর পর ক্রমশঃ জলের গুণের তারতম্য
আছে কিন্তু সকল স্থানে সকলের দ্বারা তাদৃশ জল প্রাপ্ত
হওয়া কঠিন বিবেচনায় আমি সাধারণ পরিষ্কৃত জলে ঔষধ
মিশ্রিত করিয়া দেখিয়াছি যে ঔষধের কোন প্রকারে গুণের

লাঘব হয় না । পুস্তকঃ মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা লিখিতে হইলে অতিশয় বাহুল্য হয়, তজ্জন্য এই নিয়ম নির্ধারণ করা বাইতেছে যে, যে সকল স্থানে ঔষধের মাত্রার বিশেষ নিয়ম লিখিত হইল না, সেই সেই স্থানে নিম্ন লিখিত মতে ঔষধের মাত্রা নির্দিষ্ট করিতে হইবে । অর্থাৎ যদ্যপি আরক ঔষধ হয়, তাহা হইলে শিশুর প্রতি এক ফোঁটার তিন ভাগের এক ভাগ । বালকের প্রতি এক ফোঁটার অর্দ্ধ ভাগ । এবং যৌবনাৱুঢ় ব্যক্তিগণের প্রতি এক ফোঁটা । যদ্যপি বড়ি ঔষধ হয় তাহা হইলে শিশুর প্রতি তিন ভাগের এক ভাগ । বালকের প্রতি অর্দ্ধ ভাগ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রতি একটী ।

যদ্যপি ক্ষুদ্র বটিকা হয়, শিশুর প্রতি একটী, বালকের প্রতি দুইটী এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রতি তিন বা চারিটী । *

যদি গুঁড়া হয় তবে শিশুর প্রতি এক গ্রেনের তিনভাগের এক ভাগ ও বালকের প্রতি অর্দ্ধ গ্রেন্ এবং তদূর্দ্ধবয়স্কের প্রতি এক গ্রেন্ ।

উক্ত প্রকার আরক ভাগ করিবার উপায় এই যে, পরিমিত জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল ছুই কিয়া তিন ভাগ কবিয়া লইলে অনায়াসে হইতে পারিবে ।

যদ্যপি সদৃশ ব্যবস্থার অনেকানেক গ্রন্থে জলের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহতে ইংরাজী মাপের গ্লাস আবশ্যক, কিন্তু তাদৃশ গ্লাস সকলের পক্ষে সকল সময়ে সুলভ নহে । সুতরাং আমি তাদৃশ বিধিতে আবদ্ধ

* এস্থলে ইহাও জানা কৰ্ত্তব্য যে আড়াই বৎসর বয়স্ককে শিশু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, ও তদূর্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিমিত বয়স্ককে বালকরূপে পরিগণিত হইবে ।

থাকিতে অশক্ত হইয়া এই নিয়ম নির্ধারণ করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছি যে প্রত্যেক মাত্রায় শিশুর প্রতি অর্দ্ধ তোলা, বালকের প্রতি এক তোলা, তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রতি দুই তোলা পরিমাণ । অর্থাৎ যে কয়েক বার ঔষধ সেবন করিতে হইবেক উক্ত পরিমাণে তত গুণ জল একটী পাথরের কিয়া কাঁচের বাটীতে, বা চীনের বাটীতে রাখিয়া সেই কয়েক মাত্রার পরিমাণ মত ঔষধ তাহাতে দিলে প্রস্তুত হইবে এবং কয়েক গুণ তাহার উপর বর্তিবে । মিশ্রিত হইলে ক্ষণকাল পরে প্রস্তুত জল তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার সেবন করিবে ।

এ স্থলে ইহাও জানা কর্তব্য যে ঔষধে কোন প্রকারে হস্ত কিয়া অঙ্গুলি স্পর্শ না হয় । তাহা হইলে ঔষধের গুণ নষ্ট হইবে । অপিচ ঔষধ প্রত্যেক বার সেবনের পর পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া যে স্থানে সূর্য্যের কিরণ বা বায়ু না লাগে এমন স্থানে রাখিতে হইবে, আর যদ্যপি তামাক ব্যবহার করা অভ্যাস থাকে তাহা হইলে ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা অগ্রে কিয়া পরে ব্যবহার করিবে । সদৃশ ব্যবস্থার পুস্তক সকলে যে প্রকার আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা লিখিত আছে, তাহার সহিত এতৎ প্রদেশীয় আহার পরিচ্ছদের কোন মতেই ঐক্য হইতে পারে না । কারণ যে সকল প্রদেশ হইতে এই হোমিওপ্যাথি মত প্রচারিত হইয়াছে সে দেশের আহাৰ্য্য দ্রব্যে এবং এতৎ প্রদেশের ভোজ্য দ্রব্যে অনেক বিভিন্নতা, তজ্জন্য আমি এতৎ প্রদেশীয় আয়ুর্বেদী মহাত্ম-য্যায়ী স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া যে প্রকারে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি সেইরূপ আহারের ব্যবস্থার নিয়ম বদ্ধ করিয়া রোগ বিশেষের

চিকিৎসার রুত্তান্ত লিখিয়া পরিশিষ্টে আহ্বারের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিলাম । ব্যবস্থা মধ্যে এই নিয়ম সকল অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যে লঙ্কার ঝাল, পিয়াজ, রসুন, আদা, হিঙ্গ, ছোট এলাচী, লবঙ্গ, বৈত্রি, জায়ফল, প্রভৃতি গরম মসলা সকল পাকের সহিত অথবা পানে কোন মতে ব্যবহার করিবে না, বিশেষতঃ কপূর এই মতে এক কালীন বর্জিত । কারণ তদ্বারা ঔষধের গুণ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় । কোন প্রকার মাদক দ্রব্য অর্থাৎ বাহাতে নেশা হয়, তাহা ব্যবহার করিবে না । ফলের মধ্যে যদি মধুর রস বিশিষ্ট সুপক্ক ফল হয়, এবং তাহা ভক্ষণ করিলে পীড়া বিশেষকৈ বৃদ্ধি না করে, তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে, দুগ্ধ কোন মতে নষেধ করা যাইতে পারে না, এমনত স্থলে কিয়া রোগ বিশেষে যে স্থলে সাধারণের প্রতি দুগ্ধ ব্যবস্থা হইবে, তৎকালে হোমিওপ্যাথির মতানুযায়ী দুগ্ধ জাল দিয়া প্রস্তুত করিবে, অর্থাৎ দুগ্ধ ছাঁকিয়া কড়া বা অন্য পাত্রে অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া কিঞ্চিৎ পরে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষ উত্তিত হইলেই নামাইয়া সর অন্তর করিয়া কেবল দুগ্ধ অথবা তাহাতে মিস্রি দিয়া ব্যবহার করিবে । আর যে শিশু কেবল মাতৃস্তন্য পান দ্বারা পোষিত হয়, তাহার খাত্তীকে শিশুর চিকিৎসার নিয়মানুসারে সাবধান থাকিতে হইবে ।

সদৃশ ব্যবস্থার ঔষধ জলে মিশ্রিত হইলে তাহার গুণ অক্ট প্রহরের অধিক থাকে না । অতএব এক দিনে যে পরিমাণে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার অতিরিক্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে না ।

হোনিওপ্যাথিমতের ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম।

চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার প্রথমে রোগ নির্ণয় করা আবশ্যিক। তাহার নিয়ম এই যে, আদৌ রোগীর অবয়ব দর্শন করিবেক অর্থাৎ জিহ্বা, চক্ষুঃ ও বর্ণ পরীক্ষা করিবেক, দ্বিতীয়তঃ স্পর্শন দ্বারা অর্থাৎ নাড়ী দেখিয়া পরীক্ষা করিবেক, অবশেষে প্রশ্নের দ্বারা অর্থাৎ রোগীর আন্তরিক উপস্থিত যাতনা কি প্রকার এবং তাহা কি কি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া রোগ নির্ণয় করিবেক। কারণ যে সকল লক্ষণ আপাতত দেখা যায়, তাহার আদিকারণ ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে কোন মতে রোগ আরোগ্য হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব সেই কারণ ধরিয়া উপস্থিত লক্ষণের সহিত ঐক্য করিয়া যে ঔষধ ব্যবস্থা হইবে, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বদ্যপি তিন চারি মাত্রা প্রয়োগের পর লক্ষণের কোন প্রকার ত্রাস না হয়, তবে পুনর্বার বিশেষ করিয়া রোগের পরীক্ষা করিয়া অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করা কোন মতে বিধেয় নহে। এক ঔষধে যদি কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, তবে তাহার কার্য কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিয়া, যদি আর লক্ষণের ত্রাস না করে তবেই অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। আর যদি ক্রমশই উপশম করে, সেই ঔষধ ব্যবহার করাইবে। রোগের লক্ষণ সমুদয় অন্তর্হিত হইলে আর ঔষধ সেবন করাইবে না।

হোনিওপ্যাথিক ঔষধ রাখিবার নিয়ম।

ঔষধ সকল ছিপি দ্বারা বিলক্ষণ আবদ্ধ করিয়া বাক্সের ভিতর রাখিয়া রৌদ্রের উত্তাপ না লাগে, এবং শীতল বায়ু

বাহিত হয়, অথচ অন্ধকার থাকে এমত স্থলে বায়ু রক্ষা করিবে । উক্ত ছিপি উত্তম রূপ বদ্ধ থাকিলে বহু কালেও ঔষধের গুণের বৈলক্ষণ্য হইবে না । যদ্যপি দৈবাৎ কোন শিশি ভগ্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে যে ঔষধ ছিল তাহা অন্য শিশিতে রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ সেই শিশি শীতল জলের দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া পুনরবার ঔষধ জলে তিন চারি বার ধৌত করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে এবং অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করণান্তর তাহাতে ঔষধ রাখিবে এবং ছিপি পরিষ্কার করার পক্ষে ও ঐ নিয়ম করিতে হইবেক, যদ্যপি দুই ঔষধ এক কালীন জলে মিশ্রিত করিতে হয় তাহা হইলে এক একটা স্বতন্ত্র পাত্রে প্রস্তুত করিয়া এইরূপ চিকিত্ত করিয়া রাখিতে হইবে যে কোন প্রকারে ভ্রম না হয় ।

যদি কোন ঔষধের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ জন্মায় অর্থাৎ যদি ঔষধ বিবর্ণ হয় কিম্বা শিশিতে দাগ ধরে, কি ঔষধে ছিপির গুড়া পড়ে, কি উহার নাম উঠিয়া কি মুছিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ঔষধ এক বারে পরিত্যাগ করাই পরামর্শ সিদ্ধ । এক ঔষধের ছিপি অন্য ঔষধের শিশিতে ব্যবহার করা কোন মতে উচিত নহে, যে হেতু ছিপি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, উহাতে ঔষধের অংশ একরূপে প্রবেশ করে যে তাহা কোন রূপে বিশুদ্ধ করা যায় না সুতরাং উহা একে বারেই পরিত্যাগ করা উচিত ।

যে স্থানে প্রস্তুত ঔষধ থাকিবে সেখানে কোন প্রকার গন্ধ দ্রব্য থাকিবে না, এবং সেই স্থান পরিষ্কৃত, শীতল, শুষ্ক, এবং অন্ধকারময় হইবে । এ মতানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার কালে অন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিবেক না । এবং

শরীরের উপরে ও এই মতের ব্যবস্থানুযায়ী দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। এই মতানুযায়ী কপূরের আরক অন্য সমুদয় ঔষধ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

স্নান বিধি ।

স্বাস্থ্য বিধানের নিমিত্তে যে রূপ ঔষধ, পথ্যের প্রয়োজন, তদ্রূপ স্নানও একটি প্রধান। অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা কর্তব্য। নব জ্বরে কোন প্রকারে স্নান করিলে জ্বরের ভোগ কালের আধিক্য হয়, অতএব তাহা কোন মতেই বিধেয় নহে। কোন স্থান প্রদাহ বিশিষ্ট হইলে শীতল জল অপেক্ষা উষ্ণ জলে স্নান অনেকাংশে উপকার করে। স্নান করিয়া অধিক কাল আর্দ্র বস্ত্রে থাকিবে না, এবং জলে দশ মিনিটের অধিক কাল থাকাও কর্তব্য নহে। এবং স্নানের সাধারণ নিয়ম এই যে, অত্যন্ত সূর্য্যের উত্তাপ এবং জল অতি শীতল থাকে এমত সময়ে ও জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও উপরে অত্যন্ত শীত বোধ এ প্রকার কালে স্নান করা বিধেয় নহে। অতএব নাড়ী শীতোষ্ণ সময়ে স্নান করিয়া শীঘ্র অঙ্গ মার্জ্জনা দ্বারা শরীর এবং মস্তক নির্জ্বল করিয়া গাত্রে বস্ত্রাবৃত করিবেক। কোন মতে রোগীর পরিশ্রম না হয়।

রোগ পরীক্ষার প্রকরণ ।

চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে রোগ পরীক্ষা, তদনন্তর ঔষধ পথ্যাদি ব্যবস্থা। সদৃশ ব্যবস্থার মতানুসারে বিজ্ঞবর গ্রন্থ কর্তারা যে রূপ লিখিয়াছেন তদনুসারে রোগ পরীক্ষার

নিয়মাদি বিশেষরূপে লিখিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হয় অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রকারমাত্র এতদগ্রন্থে সন্নিবেশিত করা গেল ।

প্রাচীন গ্রন্থকর্তাগণ পরীক্ষা তিন প্রকার করিয়াছেন; প্রথম দর্শন, দ্বিতীয় স্পর্শন, তৃতীয় প্রশ্ন ।

দর্শন—রোগীর অবয়ব, বিশেষতঃ চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি, এবং মূত্র পুরীষাদির বর্ণ দর্শন ।

স্পর্শন—রোগীর শরীর বা বিশেষ কোন স্থানে হস্ত দ্বারা শীতোষ্ণাদি উপলব্ধি এবং হস্ত বা যন্ত্রাদি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ও নাড়ীর গতির জ্ঞান ।

প্রশ্ন—প্রথমতঃ রোগীর যে কারণে রোগোৎপত্তি হইয়াছে তাহা বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া । রোগীর ধাতু (অর্থাৎ বাতপিত্ত কফাদি জনিত) জ্ঞাত হওয়া এবং তাহার পিতা মাতা অথবা পূর্ব পুরুষগণের শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করা ইত্যাদি ।

দর্শন—রোগীর অবয়বাদি দর্শনের বিষয় বিশেষ বিশেষ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে অতএব তদনুসারে পরীক্ষা করিবে । এই ক্ষণে মূত্র পরীক্ষা বিষয়ে এ স্থানে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে । যৎকালে মূত্র, হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ হয় তৎকালে রোগ উপস্থিত হয় জানিবে । যদিও রক্তবর্ণ হইয়া নাড়ীর তীব্র গতি রাখে তাহা হইলে আন্তরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া কোন প্রকার প্রদাহ বিশিষ্ট অঙ্গ বিদ্যমান আছে বোধ করিবে । যদিও জ্বরের বর্ণের ন্যায় হয় তাহা হইলে কামলা রোগ স্থির করিবে । যদি গাঢ় এবং ক্রমবর্ণ হয় তাহা হইলে শরীরের তিতর কোন প্রকার প্রদাহ বিশিষ্ট পচা অবস্থা ঘটিয়াছে, এবং তাহা গাঁলিবার সম্ভব

আছে বিবেচনা করিবে। যদিও পুঁজ মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে শরীরের ভিতরে কোন স্থানে পুঁজ হইয়াছে বিবেচনা করিবে। যদিও শিশুর মূত্র ছুঁকের ন্যায় দেখা যায়, তাহা হইলে অস্ত্র নাড়ি মধ্যে কুঁমি হইয়াছে জানিবে। যদিও রক্ত মিশ্রিত হয় তাহা হইলে মূত্রস্থলীতে প্রদাহ হইয়াছে বিবেচনা করিবে। যদিও পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে মূত্রস্থলী হইতে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ নির্গত হইতেছে অথবা মূত্রস্থলীর উপরিভাগ কোন প্রকার অবাস্তুর পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

স্পর্শন—শরীরের স্থান বিশেষে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যে প্রকারে পরীক্ষা করিবে তাহা বিশেষ বিশেষ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে পরীক্ষা কর্তব্য। এইক্ষেণে নাড়ীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

নাড়ীর পরীক্ষার নিয়ম—রোগীর সহিত প্রথমতঃ আলাপ দ্বারা তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তদনন্তর স্থির ভাবে স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর নাড়ী স্পর্শ করিয়া গতি অনুধাবন করিবে। কদাচ বাস্ত হইয়া বা হঠাৎ নাড়ী পরীক্ষা করিবেক না।

স্বভাবতঃ নাড়ীর গতির নিয়ম। যুবকব্যক্তিদিগের পূর্ণ-বস্থায় সুস্থ সময়ে বিশেষতঃ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ হইলে নাড়ী দৃঢ় এবং চাপিলে সহজে ধমনী (শিরা) মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু পূর্ণ সমগতি বিশিষ্ট, এবং এক মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ বার পর্য্যন্ত আঘাত হয়। স্থল খর্বাকৃতি পুরুষের স্বাস্থ্যাবস্থায় ৭০ হইতে ৭৮ বার পর্য্যন্ত এক মিনিটে আঘাত হয়। দীর্ঘাকৃতি যুবতী স্ত্রীলোকের নাড়ী ৮০ হইতে ৮৫ বার পর্য্যন্ত এক মিনিটে আঘাত করে। কিন্তু পুরুষের ন্যায় তাহার নাড়ী সবলা বা পূর্ণ হয় না। সাত বৎসর হইতে চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক সুস্থ বাল-

কের নাড়ী ৮০ হইতে ৮৬ বার এক মিনিটে আঘাত করে । তাহার ন্যূন বয়স্ক অর্থাৎ দন্ত নির্গত হওয়ার কাল হইতে সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত স্থূল বালকের নাড়ী এক মিনিটে ৮৬ হইতে ৯৬ বার পর্য্যন্ত আঘাত করে । সদ্যজাত শিশুর দন্ত নির্গত হওয়া কাল পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যাবস্থার নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ বার পর্য্যন্ত আঘাত করে । ভ্রাসাবস্থার প্রথম কালে সুস্থ শরীরে পুরুষের প্রায় ৭০ ও স্ত্রীলোকের ন্যূনাধিক ৭৫ বার নাড়ী এক মিনিটে আঘাত করে । বৃদ্ধাবস্থায় পুরুষের ৫৫ হইতে ৬৫ বার পর্য্যন্ত, এবং স্ত্রীলোকের ৬৫ হইতে ৭০ বার পর্য্যন্ত এক মিনিটে নাড়ী আঘাত করে ।

নাড়ীর গতির প্রকার ভেদ ।

পৌনঃপুন্য নাড়ী—এতদ্বারা নাড়ীর পৌনঃপুন্য গতি, অর্থাৎ নাড়ীর স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা কক্ষণ বেগ বুঝাইবে ।

মৃদু নাড়ী—এই শব্দদ্বারা নাড়ীর স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা ধীরগতি অবলম্বন করিয়াছে জ্ঞানবে ।

বেগবতী নাড়ী—ইহা দ্বারা ধমনী মধ্য দিয়া যে প্রকার দ্রুত গতিতে রক্তশ্রোত প্রবাহিত হয় তাহা বুঝাইবে ।

কঠিনা নাড়ী—স্পর্শ দ্বারা দৃঢ় বোধ হয় ।

কোমলা নাড়ী—স্পর্শ করিলে ধমনীর মধ্য দিয়া অতি কোমল ভাবে রক্ত পরিচালিত হইতেছে বোধ হয় ।

বলবতী নাড়ী—যে নাড়ী চাপিলে অঙ্গুলির নীচে হইতে বলের সহিত ঠেলিয়া উঠে ।

হৃৎকলা নাড়ী—যাহা চাপিলে উপরে উঠিতে পারে না ।

পূর্ণা নাড়ী—যে নাড়ী সংযুক্ত ভাবে প্রত্যেক বার অঙ্গুলির অগ্রভাগে সমান আঘাত করে ।

অনিয়মিত নাড়ী—যে নাড়ী সময়ে সময়ে আঘাত করে এবং সময়ে সময়ে করে না ।

অসমান নাড়ী—যে নাড়ী সময়ে সময়ে স্থির না হইয়া প্রত্যেক বার কখন কখন কঠিনা কখন কোমলা, কখন দুর্বলা, নানাবিধ রূপে আঘাত করে । নাড়ীর গতি বিশেষের দ্বারা রোগ নির্ণয় করিবার জন্যে প্রত্যেক প্রকরণের লক্ষণ মধ্যে যেখানে যে প্রকার লিখিত লইয়াছে, তদনুসারে নাড়ীর গতি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেক ।

সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা ।

জ্বর । *

যাবতীয় তীব্র রোগের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকে ।

নবজ্বর লক্ষণ ।

প্রথমতঃ শীত বোধ, তাহার পর উষ্ণতা, নাড়ীর তীব্র গতি, ও পিপাসা অস্থিরতা ও দ্রোণীল্য হইয়া থাকে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ণমাত্রা, তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

মস্তকে উত্তাপ, মুখ রক্ত বর্ণ, মাথাধরা, বিশেষতঃ কঁাপনি, ঘাড়ের শীর্ষ টানা, প্রলাপ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, অন্তর্দাহ, ও বাহ্য দাহ, অতিরিক্ত পিপাসা ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্বোক্ত মতে ।

একজ্বরী, মাথাধরা, মাথা কাটিবার মত বোধ হয়, উঠিতে ভ্রম, ও পেট কসিয়া ধরা, হাত পা কামড়ান, কিঞ্চিৎ উৎকাশী ।

ঔষধ—ব্রাযোনিয়া, ঐরূপ ।

* সমস্ত রোগের মধ্যে জ্বর সর্ব প্রধান, তজ্জন্য চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদগণ ইহার চিকিৎসাই প্রথমতঃ লিখিয়াছেন, অতএব আমিও তদনুসারে জ্বর চিকিৎসা লিখিয়া পরেতে ক্রমশঃ মস্তক হইতে চরম পর্যন্ত মানাবিধ রোগের চিকিৎসা প্রকরণ লিখিয়া তদনন্তর স্বীলোকের ও চিকিৎসা প্রণালী স্বতন্ত্ররূপে লিখিলাম ।

রাত্রিতে জ্বর বৃদ্ধি, নাড়ী কঠিন, পিপাসা ও মুখশোষ, দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা ।

ঔষধ—ক্যাস্‌টারাইডিস্, পূর্ণমাত্রা ।

ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত বোধ, গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা দিয়া তাহার তিন ঘণ্টা পরে ক্যামোমিল। পূর্ণমাত্রা দিয়া পুনর্বার ঐ একোনাইট তিন ঘণ্টা অন্তর ও তাহার তিন ঘণ্টা পরে পুনর্বার ক্যামোমিল। এই রূপে রোগের লক্ষণ সকল বিদূরীত হওয়া পর্যন্ত উপর্য্যাপারি রূপে দিবেক ।

বিকার জ্বর .

সামান্য শীত বোধের পর উষ্ণতা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ধরা, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, শরীরে শীতল বাতাস অসহ্য, অল্প নিদ্রা, নিদ্রাকালীন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, ও ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন, চেতন কালেও উহা দেখা, মুখে তিক্তরস, আহারে অনিচ্ছা, গা বমি বমি করা, জিহ্বার উপর হরিদ্রাক্ত এবং জিহ্বা শুষ্ক, পেট ভার, কোষ্ঠ বদ্ধ, উভয় পার্শ্বের পাঁজরের নিচে টেনে ধরা ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা, তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

অগ্নির উত্তাপে ও গরম বোধ হয় না, হাড় হইতে মাংস পৃথক হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, জিহ্বার উপর সাদা, গ্লেজা বমন, শয্যাকন্টক, হাত পায়ের শক্তি হীন হয়, এই লক্ষণ সকল রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় ।

ঔষধ—রস্‌ক্লিকোডেগুন্, একরূপ ।

উদর ভঙ্গ হইয়া জলবৎ হরিদ্রা বর্ণ অথবা কিঞ্চিৎ সবুজ

বর্ণ পিচ্ছিল মল বিরেচিত হয়, অঙ্গ উষ্ণ গাত্র-অধিক কম্পা, অথবা তৎ বিপরীত, অর্থাৎ অঙ্গ কম্প-অধিক উষ্ণতা।

ঔষধ—ইপেক্যাকুয়ান, পূর্ববৎ।

পুনঃ পুনঃ কম্প, এবং উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে, কিম্বা অধিক অশ্রু পাত হইলে

ঔষধ—পলেসট্রিলা, পূর্ববৎ।

প্রস্রাব অবরোধ।

শরীর হরিদ্রা বর্ণ, পকাশয়ে বেদনা বোধ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, অঙ্গ প্রস্রাব, মস্তকের ও মুখের অত্যন্ত জ্বালা, ভাবি দুর্ভাগ্যের চিন্তা।

ঔষধ—ডিজিটেলিস, মাত্রার বিগুণ ছয় ঘণ্টা অন্তর।

কোষ্ঠের বেগ অথচ বন্ধ, পেট কসিয়া ধরা, হাত পায়ে ছেঁচা আঘাত বোধ, রাত্রিতে অস্থিরতা এবং প্রলাপ, প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি।

ঔষধ—নক্স ভমিকা, পূর্ববৎ মাত্রা ঐরূপ।

চক্ষুতে ঘোর দর্শন, কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ, অঙ্গ শুনিতে পাওয়া, হরিদ্রা কিম্বা সাদা বর্ণ জিহ্বা, মুখ শুষ্ক এবং তিক্ত, জলযৎ রেচন, প্রস্রাব ধূস্রবর্ণ, নিদ্রা-হীনতা।

ঔষধ—চায়না, মাত্রা পূর্ববৎ।

শীতের পর অত্যন্ত জ্বালা; কঠিন, অত্যন্ত তীব্রগতি বিশিষ্ট নাড়ী; চর্ম্ম, মুখ, ও জিহ্বা শুষ্ক; অতি পিপাসা, রক্তবর্ণ প্রস্রাব, ঘন শ্বাস, রাত্রিতে বৃদ্ধি, কিঞ্চিৎ প্রলাপণ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ববৎ।

ঘাড়ের শীর দপ্ দপ্ করে, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চতুর্দিকে
দৃষ্টিপাত, ভয় বোধ, পলায়নের ইচ্ছা, অত্যন্ত প্রলাপ, বাহ্য
জ্ঞান রহিত, বিছানা ধরিয়া টানা, গলায় বেদনা, কণ্ঠমূল ফুলা ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ

মুখের মাংস পেশী টানিয়া ধরা, ইতস্ততঃ অঙ্গ চালনা,
অনর্থক হাস্য ।

ঔষধ—স্ট্রামোনিয়ম্, ঐরূপ ।

সমস্ত শরীরে কাঁটা বেঁধার ন্যায় বোধ, এবং সতত প্রলাপ,
পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ ।

ঔষধ—হায়োসায়ামস্, ঐরূপ ।

ঐকাহিক অর্থাৎ বিরতি জ্বর-প্রথমে আসিয়া পরে
ছাড়িয়া পুনর্ব্বার অর্থাৎ পর দিনে ঐ সময়ে আইসে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, নক্স ভর্মিকা, পলেনটিলা, ইহার যে কোন
একটি পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

দ্ব্যাহিক জ্বর—অর্থাৎ এক দিন পর এক দিন আইসে ।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্, ক্যালেকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম্,
স্ট্রাকিসেগ্রিয়া, পূর্ববৎ ।

ত্র্যাহিক জ্বর—অর্থাৎ দুই দিবস পরে এক দিবস হয় ।

ঔষধ—বিরামের দুই দিবস, আর্সেনিকম্, জ্বরের দিবস একোনাইট্,
পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর । অথবা লাইকোপোডিয়ম্, প্রত্যহ দেওয়া
যাইবেক ।

প্রাতঃকালে হইলে

ঔষধ—ক্যামোমিলা, ক্যালেকেরিয়া, স্ট্রাকিসেগ্রিয়া ।

বিকালে হইলে

ঔষধ—স্ট্রাকিসেগ্রিয়া, সিপিয়া ।

রাত্রিতে হইলে।

ঔষধ—মর্কিউবায়স্, কার্বোবেজিটেবিলিস্।

বিরতি জ্বরে শোথ হইলে।

ঔষধ—অরন্ মেটালিকম, চারি বার করিয়া পূর্ণমাত্রা।

পথ্য নির্ণয়।

জ্বর কালীন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শীতল জল মাত্র দিবে, জ্বরের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, তৎকালে, যব এক ছটাক, থেঁতলাইয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া, সেই কাথ দুই ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ পোওয়া করিয়া দিবে।

দ্বিতীয়তঃ—এ কথ এক ছটাক আতপ চাউল ঐরূপ জলে সিদ্ধ করিয়া উক্ত প্রকারে দিবে।

তৃতীয়তঃ—অরোরুট্ দুই তোলা অর্দ্ধ সের গরম জলে ফেলিয়া ঐরূপ।

চতুর্থতঃ—সেগো (মাগুদানা) সিদ্ধ করিয়া ঐরূপ।

পঞ্চম—জ্বর ছাড়িলে অন্ন, মৎসের ঝোল।

নিষেধ।

দুগ্ধ তিন দিবস, অম্ল দ্রব্য সাত দিবস, লঙ্কা মরিচ ও উগ্র গরম মসলা সাত দিবস। তামাক অগ্নি পরিমাণে অর্থাৎ ঔষধ সেবনের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে বা পরে।

(৩)

হাম জ্বর ।

প্রথমে জ্বর বোধ, শুষ্ক কাশী, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, গাত্রে ক্ষুদ্র চিহ্ন অর্থাৎ মশার কামড়ের ন্যায় দেখা যায়, প্রথমতঃ ঘাড়ে এবং মুখেতেই প্রকাশিত হয় পরেতে সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয় ।

ঔষধ—একোনাইট্, এবং পলেসটিলা, উপর্যুপরি রূপে অর্থাৎ প্রথমে একোনাইট্, একমাত্রা, পরে তিন ঘণ্টা অন্তর পলেসটিলা, এক মাত্রা জ্বরের লাঘব কাল পর্য্যন্ত এইরূপ চলিবে ।

শ্লেষ্মার আধিক্য বোধ হইলে ।

ঔষধ—পলেসটিলা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

হাম উদ্ভাবার পূর্বে বক্ষঃস্থলে কষ্ট বোধ হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ববৎ ।

অত্যন্ত মাথাধরা ও চক্ষুতে আলোক অসহ্য এবং নাসিকা ও চক্ষুঃ দ্বারা জল স্রাব হইলে, ও শুষ্ক কাশী ও ঘাড়ের বেদনা বোধ হইলে ।

ঔষধ—ইউফ্রেশিয়া পূর্ববৎ ।

গলায় বেদনা বোধ, চক্ষুঃ অত্যন্ত ক্ষীত, মস্তিষ্কে জ্বালা বোধ হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা ঐরূপ ।

যদি চক্ষুর স্বেত ভাগে যা বোধ হয়,

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইলে ।

ঔষধ—ট্রায়োনিয়া, তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

হাম দমনের চিকিৎসা ।

সামান্যতঃ হাম দমন ব্রায়োমিয়া ।

ঐ হাম দমনের পর ।

উদর ভঙ্গ হইয়া হাম নির্গত হইলে ... পল্‌সেটিল ।

কাঠ বনি হইলে ইপিকাকুয়ান ।

শিশুর ঐক্লপ বমন হইলে... .. ক্যামোমিলা ।

গলা ফুলিলে একোনাইট্-হেপার-সল্‌ফর ।

অতিসার অথবা কর্ণ পথে রক্ত নির্গত হইলে ... সল্‌ফর, পল্‌সেটিল ।

কর্ণ মূল ফুলিলে আর্বিকা, ডল্‌কেমেরা ।

শরীরে ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইলে নক্স-বমিকা, আর্সেনিকম্ ।

বসন্ত রোগের চিকিৎসা ।

এই রোগ দুই প্রকার, পৃথক্ এবং প্রবাহক, মস্তুরিকা পরস্পর কেহ কাহার গায়ে না লাগে তখন পৃথক্, এবং যখন পরস্পর একত্রিত হইয়া এক চাপ মত হইয়া যায়, তখন ইহাকে প্রবাহক বলা যায় ।

লক্ষণ—এই রোগ হঠাৎ উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ শীত বোধ হইয়া কম্প হয়, পরেতে জ্বর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া অত্যন্ত মাথা ধরে । মাজায় এবং পশ্চাৎ ভাগে গুরুতর যাতনা বোধ হয়, ও সামান্যতঃ শ্রান্তি বোধ হয় । তৃতীয় দিবসে মস্তুরিকা প্রকাশিত হয়, কফের লক্ষণ অর্থাৎ হাঁচি, কাশী প্রভৃতি ও হইয়া থাকে ।

পৃথক্ বসন্তের চিকিৎসা ।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় যখন অস্থিরতা মাত্র থাকিয়া
জ্বর অতি প্রবল ভাব ধারণ না করে তৎকালে ।

ঔষধ—কফি, অর্দ্ধ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর চারি মাত্রা পর্য্যন্ত দিবে ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ চারি মাত্রা দেওয়ার পর জ্বরের লাঘব
হয়, এবং অত্যন্ত পিপাসা চর্ম্মের উত্তাপ ও শুষ্কতা, নাড়ী বেগ-
বতী থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ব্ববৎ, (এই ঔষধ চিকিৎসার সমস্ত কালীন
মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করা কর্তব্য) ।

যদ্যপি বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরা বোধ হয়, ও বমনেচ্ছা,
বমন, বা বিরেচন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি বসিয়া থাকার অবস্থায় মস্তকের পশ্চাত্তাগে,
এবং মাথায় প্রখরতর যাতনা বোধ হয়, ও অঙ্গ চালনে ক্ষণিক
নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-টক্সিকোডেন্ ড্রন্ অর্দ্ধ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

এই রোগ বালকের হইলে, যদ্যপি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট
বোধ হয়, উদর ভঙ্গ হইয়া গাঢ় সবুজ বর্ণ মল নির্গত হয়, পেট-
কামড়ায়, বমি হয়, রাত্রিতে কাশী হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা অর্দ্ধ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি অত্যন্ত অলস বোধ হয়, মুখ ফুলিয়া অর্দ্ধ নয়ন
মুদ্রিত করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, এবং নিয়ত ইতস্ততঃ হস্ত
বিক্ষেপ করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর জিহ্বার নীচে রাখিয়া
চুষিবে ।

প্রবাহক বসন্তের চিকিৎসা ।

জ্বরের অত্যন্ত প্রবলতার সময় একোনা'ইট্ এবং সল্ফুর্ তিন ঘণ্টা অন্তর অর্ধ মাত্রা পরিমাণে উপর্যুপরি দিবেক ।

আর যদ্যপি চক্ষুঃ ফুলে, গলার এবং নাকে বেদনা বোধ হয়, কাশী, স্বর-ভঙ্গ, অত্যন্ত বেগের সহিত অতিসার হইয়া রক্ত নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্ধ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর ।

মসুরিকা প্রকাশিত হইবার পূর্বে অথবা পরে, বিশেষতঃ যদ্যপি বমন বা বমনেচ্ছা থাকে, এবং রাত্রিতে লক্ষণ সকল বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল্লেসটিলা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ দ্বারা বমনাদি নিবারিত না হয় অতিশয় পিপাসা, মুখ শোষ থাকে, জিহ্বা অপরিষ্কৃত এবং বলের অত্যন্ত হ্রাস হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি মসুরিকা গাঢ় কটা বর্ণ, এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্ধ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি বসন্ত পাকিয়া গলা-ঘায়ের ন্যায় বোধ হয়, মসুরিকা গাঢ় কটা বর্ণ হয়, এবং তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বোবেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি স্বর ভঙ্গ, কাশী, গলার বাহিঁরে বেদনা, এবং চর্ম্মে উত্তাপ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

মসুরিকা পূর্ণ হইলে, যখন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, তখন

সম্পূর্ণ রূপে চিহ্ন অন্তর্হিত করিবার নিমিত্তে, এবং অন্য রোগ উৎপাদনের কারণ নিবারণ জন্য।

ঔষধ—সল্ফর, এবং রস-টক্সিকোডেগুন ক্রমশঃ বা উপর্যুপরি রূপেদ্বিগুণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবেক।

যদ্যপি মসুরিকা প্রকাশিত হইয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হয়, এবং মস্তিষ্ক পীড়িত হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—কুপ্রম্, অর্দ্ধ মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায়, যে পর্য্যন্ত মসুরিকা পুনর্বার নির্গত না হয়, আরও এই অবস্থায় ত্রায়োনিয়া, বিশেষ উপকারক হয়।

বসন্ত রোগের পরিশিষ্ট চিকিৎসা।

এই রোগে যদ্যপি বায়ু-প্রবাহক-প্রণালীর উপরিভাগ ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্, হেপারসল্ফর, স্পঞ্জিয়া, এই ঔষধ সকলের মধ্যে যে কোন একটি, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক। এবং উক্ত প্রকার রোগে বেলাডোনা, ল্যাক্সিসিস্, মর্কিউরিয়স্, বা আর্সেনিকম্, ও উক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যদ্যপি বসন্ত রোগ নিবারণের পর কোন স্থান ফুলিয়া স্ফোটকের ন্যায় হয় তাহা হইলে, তাহার চিকিৎসা স্ফোটকের চিকিৎসার ন্যায় করিবেক।

যদ্যপি এই রোগের পর কাশী হয়, তাহা হইলে বেলাডোনা, বা মর্কিউরিয়স্, বা আর্সেনিকম্, পূর্ণমাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে, প্রত্যহ এক এক বার।

যদ্যপি এই রোগের পর অতিসার হয়, এবং যদ্যপি

অতিসারের লক্ষণ কখন থাকে ও কখন থাকে না, এমত হয় তাহা হইলে

ঔষধ—চায়না, বা কস্ফরস্, দ্বিগুণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—এই রোগে পথ্যের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্তব্য । কারণ তাহার যদিপি কিছু ভারতম্য হয়, তাহা হইলে সামান্য হইতে ভয়ানক অবস্থা হইতে পারে । অতএব জ্বর যখন অত্যন্ত প্রবল থাকে, তৎকালে কেবল মাত্র জ্বর কালীনের ব্যবস্থা মত পথ্য ব্যবস্থা করিবেক, কিন্তু পরেতে কিঞ্চিৎ বলকারক অথচ সহজে পরিপাক হয় অর্থাৎ মাংসের কুথ ইত্যাদি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবেক । আর ও যে পর্যন্ত ক্ষত থাকিবে সে পর্যন্ত দ্ধ আমিষ খাদ্য এক কালীন সজ্জিত করিবেক ।

জল বসন্ত

লক্ষণ—এই রোগ আকারে সাধারণ বসন্তের ন্যায়, কিংবাসন্ত হইতে অধিক পরিমাণে নম্র ভাব ধারণ করে ইহায়ে প্রায় ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন করে না । এই রোগে জ্বর অত্যন্ত প্রবল বেগ ধারণ করে । এই রোগ সামান্য বসন্ত অপেক্ষা অতি অল্প কালে, মস্তুরিকার ন্যায় প্রকাশিত হয় তাহাও প্রায় তৃতীয় দিবসে হইয়া চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে কোচিহ্ন না রাখিয়া অন্তর্হিত হয় ।

জল বসন্তের চিকিৎসা ।

এই রোগে জ্বর যখন অত্যন্ত প্রবল থাকে তৎ কালে

ঔষধ—একোনাইট্ অর্দ্ধমাত্রা, পাঁচ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি জ্বর লক্ষণ প্রকাশ না থাকিয়া কেবল অত্যন্ত
অস্থিরতা মাত্র থাকে, তৎ কালে

ঔষধ—কফি পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগে সমস্ত শরীর আক্রমণ করে তাহা
হইলে

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি বসন্ত হইতে জল নির্গত না হইয়া গাঢ় ঈষৎ হরিদ্রা
বর্ণ ক্লেদ নির্গত হয়, এবং প্রস্রাবে কটু থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

এই রোগ দমন করিতে হইলে সামান্যতঃ বসন্ত নিবা-
রণের বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে
হইবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—এই রোগে যখন জ্বর বিদ্যমান থাকে
তৎ কালে জ্বর কালীন পথ্য ব্যবস্থার ন্যায় ব্যবস্থা করিবেক,
পরে, ক্রমশঃ আরোগ্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে আমিষ, দুগ্ধ
এবং মিষ্ট এক কালীন বর্জ্জন করিয়া কেবল উদ্ভিজ্জ দ্রব্য মাত্র
পথ্য করিবেক ।

প্রাচীন জ্বরের চিকিৎসা ।

অতিরিক্ত ক্ষুধা, নাসিকা দ্বার দিয়া অতিরিক্ত জলস্রাব,
পাণ্ডু বর্ণত্ব, কোষ্ঠ বদ্ধ, অথবা অতিসার, শুষ্ক কাশী, দুর্বলতা,

সদৃশ ব্যর্থতা চিকিৎসা দীপিকা ।

হস্ত পদাদি শ্রান্ত ও ভার বোধ, শেষ বেলায় জ্বর বোধ, বাঁম
গণ্ডে রক্ত বর্ণ চিহ্ন, এবং পিপাসা থাকিলে ।

ঔষধ—সঙ্কর, প্রাতঃকালে দ্বিগুণ মাত্রা এক বার করিয়া ।

শরীরে উষ্ণ বোধ পিপাসা বিহীনতা, মুখ রক্ত বর্ণ, চক্ষের
শুষ্কতা, চক্ষুর দৃষ্টির অপততা, সর্বদা আপন স্বাস্থ্য বিষয়ে চিন্তা,
কিঞ্চিৎ আহারের ব্যতিক্রম হইলে অজীর্ণ বোধ, রাত্রিতে ঘর্ম,
নাসিকা দ্বারা রক্ত স্রাব, অথবা নাসিকা রক্তবর্ণ, পেট ফুলা,
অত্যন্ত কোষ্ঠ বদ্ধ, অথবা অতিসার হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকরিয়া, দ্বিগুণ পরিমাণে প্রাতঃকালে অনাহারে এক
এক বার সেবন করিবে ।

অতিরিক্ত কোষ্ঠ বদ্ধ এবং লোম বিশিষ্ট স্থানে ফুস্ফুড়ী
ইত্যাদি হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকরিয়া, দ্বিগুণ মাত্রা সাত দিবস পর্য্যন্ত সেবনের পর, লাই-
কোপোডিয়ম্ প্রাতঃকালে এক বার ও সন্ধ্যা কালে এক বার করিয়া
সেবন করিবেক ।

উদর ভঙ্গের সহিত অত্যন্ত অলস বোধ থাকিলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্ উক্ত প্রকারে সেবন করিবে ।

গলায় বেদনা, প্রস্রাবের অধারগতা এবং রাত্রিতে বিছা-
নায় প্রস্রাব করার পক্ষে ।

ঔষধ—বেলাডোনা উক্ত প্রকার ।

প্রকারান্তর প্রাচীন জ্বর ।

সদত চিহ্না যুক্ত, কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ অথবা কেবল শীত
বোধ, নাড়ী সূক্ষ্মা, দ্রুত গামিনী, কিঞ্চিৎ উৎসাহে, অত্যন্ত বেগ-

বর্তী হয়, জ্বরের লক্ষণ সকল প্রাতঃকালে, অথবা পেট খালি থাকে অবস্থায় বৃদ্ধি, ও আহার করিলে হ্রাস হয় ।

ঔষধ—চায়না, দুই প্রহরের সময় এক বার ও রাত্রিতে এক বার ।

উষ্ণতার পরিবর্তে শীত বোধ, সর্বক্ষেপে ঘর্ষ হয় না, মাথা ধরা, কেবল রূপাল ও পা ঘামে, নানাবিধ স্বেপ্নের দ্বারা নিদ্রার ব্যাঘাত, শীঘ্র চুল উঠিয়া যাওয়া, স্মরণ শক্তির হানি, পিচুটির দ্বারা চক্ষু বদ্ধ হইয়া থাকা, এবং পেট কাঁপা থাকিলে ।

ঔষধ—ক্যাকিসেগ্রিয়া, রাত্রিতে শয়নের পূর্বে এক বার ।

নাড়ীর অসমান গতি, বাহ্য শীতলতা, অত্যন্ত বৃথা বাচালতা, দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে, নাসিকার এবং হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল ।

ঔষধ—বেরাট্রম্ প্রাতঃকাল হইতে ছয় ঘণ্টা অন্তর তিন বার ।

প্রাচীন জ্বরের পথা ।

লঘু পাক দ্রব্য সময়ের অতিক্রম না করিয়া, (এক কালে অধিক পরিমাণে না হয়) আহার করিবেক । এবং গুরু পাক দ্রব্যাদি বিশেষতঃ অম্ল, লব্ধা মরিচের ঝাল, গরম মসলা, শাকাদি ও নেশা মাত্র বর্জন করিবে, এবং অভ্যাস থাকিলে, তামাক অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবেক ।

শিরো রোগ

মাথা ঘোরা বমনেচ্ছা, বমন, উদ্বিগ্নতা, ও অস্পষ্ট দৃষ্টি, এবং যদি রাগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

স্তন্যের শিরা টানিয়া ধরা, অর্দ্ধ-মস্তকে জ্বালার ন্যায়
যাতনা বোধ, মুখ রক্ত-বর্ণ, চক্ষুতে অন্ধকার দৃষ্টি অথবা দর্শনে
এক দ্রব্য দুইটা বোধ হয়, কান ভোঁ ভোঁ করে তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, ঐরূপ।

যদ্যপি পান দোষে অথবা রাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে,
অত্যন্ত মাথা ধরা, (বিশেষতঃ ললাটে) বোধ হয়, এবং কাশীতে
কিছা নিম্নে দৃষ্টি করিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ও কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে;
তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, ঐরূপ।

কেবল পান দোষ জন্য হইলে, এবং উপরোক্ত ঔষধে
আরোগ্য না হইলে।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক বার দ্বিগুণ মাত্রা।

ভয় হইতে অথবা অলস স্বভাব প্রযুক্ত উৎপন্ন হইলে,
এবং অতিরিক্ত পিপাসা, মুখ শোষ, অল্প উদ্যার ও বমনেচ্ছা
থাকিলে।

ঔষধ—ওপিয়াম্, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর।

উষ্ণিতে মাথা ঘুরিলে ক্যামোমিলা।

শয়ন কালীন হইলে রস টক্কিকোডেন্ড্রুন্

বসিয়া থাকার কালে হইলে পহেসটিলা।

নাসিকার দ্বারা রক্ত-স্রাব জন্য সফর।

মূর্ছিত হইলে ক্যামোমিলা।

এই সকল ঔষধ পূর্ণমাত্রা চারি বা ছয় ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার
করিবেক।

শিরঃশূল ।

যদি মাথাধরা নিয়ত থাকে অথবা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, ও চক্ষুতে আলোক অসহ্য হয়, সমস্ত মস্তক অথবা এক দিকে ধরিয়া থাকে, এবং মাথার তালুতে অর্থাৎ চাঁদিতে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হয় রোগির অনিদ্রা ও প্রলাপ পর্য্যন্ত হয়, উদ্যার উঠে ও বমনেচ্ছা হয়, এবং উদরে যাতনা বোধ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

পূর্বোক্ত লক্ষণঅন্তর হইয়া যদি কেবল একপার্শ্বে অর্থাৎ আধ কপালিয়া মাথাধরা হয়, অথবা মুখের অর্দ্ধ দিক শীতল বোধ হয়, এবং মস্তকের ভিতর ভোঁভোঁ করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্ল্যাটিনা, পূর্ববৎ ।

যদি পূর্বোক্ত ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ হয় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, ও অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ববৎ ।

স্ত্রীলোকের রজঃস্রা কালে, অথবা সম্ভান প্রসবের পর, পাণ্ডু রোগাক্রান্ত হইলে, কিম্বা স্বেত প্রদর থাকিলে, মস্তকে অল্প বিষ্কার ন্যায় যাতনা বোধ হইলে, ও যদি সমস্ত মস্তকে বা এক পার্শ্বে, অথবা চক্ষুর নীচে যাতনা বোধ হয়, ও আলোকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিপিয়া, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার পূর্ণমাত্রা ।

উপরোক্ত ঔষধে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে, এবং যাতনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে ।

ঔষধ—হেপার-সলফর, পূর্ববৎ ।

যদি মস্তক কাটায়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, এবং মস্তকের উভয় পার্শ্ব হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া নাসিকা পর্য্যন্ত, কিম্বা দন্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করে ও পুনঃ পুনঃ ঘর্ষ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সাইলিশিয়া পূর্ববৎ।

যদি একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাতনা থাকে, কিম্বা প্রত্যহ আহ্বারের পর বা প্রাতঃকালে কপালে বোধ হয়, বৈকালে একবারে দূর হইয়া সন্ধ্যা সময়ে, পুনর্বার তীব্র হইয়া আইসে, এবং মস্তকের উভয় পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ববৎ।

শরীর কিঞ্চিৎ চালিত হইলেই যাতনা বৃদ্ধি হয়, মাথা নোয়াইতে কিম্বা চক্ষুতে আলোক দেখিতে অসহ্য ক্লেশ হয়, যাতনা এমত একটি ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ থাকে যে একটি মঙ্গুলির দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করা যায়, ও চক্ষুতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাত্তাগে এবং স্বল্পদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, বিশেষতঃ যদি মদ্য পানাদি দোষে উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি যাতনা কর্ণ এবং নাসিকার মূল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, আহ্বারের পর নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছাকরে, কিঞ্চিৎ চালনাতেই বৃদ্ধি হয়, প্রত্যেক পাদ বিক্ষেপে মস্তকে দপ্ দপ্ করে, অথবা মস্তকের তিতর জল থাকিবার ন্যায় ভার বোধ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—রস-টক্সিকোডেণ্ড্রন পূর্ববৎ।

স্ত্রীলোকের মাসিক স্ত্রীধর্মের কালাতীত জন্য হইলে।

ঔষধ—গল্‌সেটীলা, পূর্ববৎ।

দুর্বলতা জন্য সমান্যতঃ অত্যন্ত যাতনা বিশিষ্ট মাথা ধরা হইলে।

ঔষধ—চায়না, উপরোক্ত মতে।

যদ্যপি অন্তর্দাহের সহিত বমন, অথবা বমনেচ্ছা লক্ষিত হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—বেরাট্রিম্, পূর্ববৎ।

যদি মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে এবং চক্ষুর গহ্বরের ভিতর অথবা উপরে যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ল্যাক্সিস, ঐরূপ।

প্রাচীন মাথাধরা হইলে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের পর,—

ঔষধ—সলফর, ঐ রূপে ব্যবহার করিবে।

পথ্যব্যবস্থা—যে সকল দ্রব্য লঘু পাক অথচ বল কারক হয়, তাদৃশ দ্রব্য দিবসে, রাত্রিতে ঠিক এক সময়ে পথ্য করিবে। রাত্রি জাগরণ করিবেক না, এবং প্রত্যহ প্রতুষে শয্যা ত্যাগ করিবেক।

অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগ।

লক্ষণ—রোগী আক্রান্ত হইলে জ্ঞান শূন্য হয়, মুখে কোঁপড়া উঠে, কিয়ৎকালপরে পুনর্বার চৈতন্য হয়, এবং দুর্বলতা ও ক্ষীণতা তথবা মস্তকে তার বোধ হয়। এই রোগ অতি ভয়ানক, পুনঃ পুনঃ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইলে মৃত্যু ঘটিয়া

থাকে, যদ্যপি যৌবনাবস্থার পূর্বে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, এই চিকিৎসার প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে অতি অল্প আয়াসে আরোগ্য হইতে পারে। আর যদি যৌবনাবস্থা গন্ত হইয়া হয় কিম্বা পৈতৃক দোষ জন্য হয়, তবে বহুকাল বিলম্বে আরোগ্য হয়।

যদি সবল শরীরে উৎপন্ন হয়	}	বেলা ডোনা, সলফর, বেরাট্রম্।
দের্বল্য বা শোণিত ক্ষয় জন্য হইলে,	}	নক্স-বমিকা, সলফর।
যদি কৃমি জনা হয়.....	{	ল্যাক্সিসম্, মর্কিউরিয়গ., ওপিয়ম্।
যদ্যপি মনোবেগ জন্য ...		ওপিয়ম, ক্যামোমিলা,
অথবা ভয় জন্য হয়। ...		বা নক্স-বমিকা।
মস্তকে আঘাত জন্য হয়	{	ককিউলস, সাইকিউটা- বাইরোস।

সদ্যোৎপন্ন অপস্মার রোগের চিকিৎসা ।

হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শুড়্ শুড়্ করে ও মুখ এবং মুখের মাংসপেশী আপনি চালিত হয় মুখ রক্ত কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু অর্ধমুদ্রিত, চোক গিলিতে কষ্ট বোধ, মুখে ফোঁপড়া উঠা, স্বীয় চেষ্টা ভিন্ন মল ও মূত্র নিঃসরণ, বোধ শূন্যতা, নিদ্রা হীনতা অথবা গাঢ় নিদ্রাকালীন ঈষৎ হাস্য, এবং চমকিয়া রোদনের সহিত জাগরিত হওয়ার পক্ষে।

ঔষধ—বেলাডোনা অর্ধগ্রান্স চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার।

মুখ কিঞ্চিৎ নীল বর্ণ, এবং ফুলা চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হও-
বার ন্যায়, কিঞ্চিৎ জলীয় দ্রব্য পান করিতেই রোগের উপসর্গ
উপস্থিত হওয়া দন্ত কড়্ মড়্ করা, অজ্ঞানতঃ প্রস্রাব হওয়া
এবং গাঢ় নিদ্রার সহিত নাসিকা ডাকার পক্ষে ।

ঔষধ—হায়োসসাইমস্ পূর্ববৎ ।

মুখ কখন রক্ত বর্ণ এবং কখন পাণ্ডু বর্ণ হয়, ফোঁপড়া
উঠে, নিশ্বাস প্রস্থাসের অবরোধের ন্যায় কষ্ট, পুনঃ পুনঃ
হাঁহ, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং প্রত্যহ
রোগাক্রান্ত হওয়া, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেসিয়া, প্রথমতঃ ছয় ঘণ্টা অন্তর এক দিবস পরেতে
বার ঘণ্টা অন্তর এক সপ্তাহ ।

রোগী চীৎকার করিয়া উঠে মস্তক পশ্চাত্তাগে নিক্ষেপ
করে, হস্ত পদাদির গতিহীনতা, বমন, অত্যন্ত ঘর্ষ হইলে ও
কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে, কিঞ্চিৎ রাগ বা মনোবেগ উপস্থিত হইলে
রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, অর্দ্ধমাত্রা এক এক বার রোগের বেগ নিবারণ
কাল পর্য্যন্ত তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে দুই বেলা দুই বার
করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত ।

যদ্যপি রোগ রাত্রিতে কিম্বা সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হয়,
রোগী অত্যন্ত হস্ত পদাদি চালনা করে, অজ্ঞান হয়, নিশ্বাস
বন্ধ হওয়ার ন্যায় গাঢ় নিদ্রা হয় ও ক্রন্দন করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্ পূর্ববৎ ।

স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব সময়ে উপস্থিত হইলে ।

ঔষধ—কুকিউলস্ পূর্ববৎ ।

মস্তক পশ্চাদ্দিগে নিক্ষেপ করা, শরীরের উর্দ্ধ ভাগে ও

সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা ।

উদর অত্যন্ত চালিত করা, জ্ঞান হীনতা, এবং উজ্জ্বল কোন পদার্থ দেখিলে রোগ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে ।

ঔষধ—ক্লামোনিয়ম্ পূর্ববৎ ।

প্রাচীন অগ্ন্যার রোগের চিকিৎসা ।

রোগের আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে কোন ক্ষুদ্র জন্তু শরীরের ভিতর বেড়াইতেছে এমত বোধ হয়, এবং শীতল ও প্রবল বায়ুতে রোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফার, দ্বিগুণ মাত্রা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া যদিও প্রাতঃকালে মাথাধরা থাকে এবং উক্ত ঔষধের দ্বারা কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়, পরেতে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, সাত দিবস পর্যন্ত পূর্ববৎ ।

যদি প্রতি মাসান্তে রোগ উপস্থিত হয়, হস্ত পদাদির অক্ষুণ্ণ চালিত হয়, ও বাক্-রোধ হয়, মুখ দিয়া লাল ও কোঁপড়া নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কুপ্রম্ পূর্ববৎ ।

রোগ আক্রমণ করিবামাত্র চীৎকার করিয়া পতিত হয়, জ্ঞান শূন্য হয়, চরণ শীতল, মাথা ভার এবং বুক ধস্ ধস্ করে এমত হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস্, পূর্ববৎ ।

যদিও পেট কামড়ায়, সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়, মুখে কোঁপড়া উঠে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইকিউট-বাইরোসা, পূর্ববৎ ।

বোগাক্রান্ত হইলে কর্তব্য বিধি।

রোগিকে হেলান্ দিয়া বসাইয়া রাখিবে, নিকটে এমত কোন দ্রব্য না থাকে যে পতিত হইলে আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে; জিহ্বা রক্ষা করিবার নিমিত্তে মুখের ভিতর কাপড় দিবেক, এবং বদনে শীতল জল সেচন করিবেক।

পথা নির্ণয়।

সহজে বাহ্য পরিপাক হয়, এবং বলকারক হয়, এমত দ্রব্য আহাৰ করিবেক, মাদকদ্রব্য এক কালীন নিষেধ, এক এক বার অল্প পরিমাণে আহাৰ করিবেক, শারীরিক বা মানসিক কোন পরিশ্রম করিবেনা, এবং স্থান ও বায়ু পরিবর্তন করা বিশেষ উপকারী হয়।

নির্লোম অর্থাৎ চুল উঠিয়া যাওয়া রোগের চিকিৎসা।

যদি অল্প বয়সে টাক পড়ে তাহা হইলে তল্কের চর্বির পোমেটম্ মর্দন, এবং প্রত্যহ সেই স্থান কামাইবেক।

যদি জ্বর হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা হইলে প্রাতঃকালে, এবং সন্ধ্যাকালে ঝর্ণার জলে মস্তক ধৌত করিবেক, যদি স্বস্তি স্বতন্ত্র টাকলক্ষিত হয় তাহা হইলে সেই মস্তক স্থান ও তল্ক টঙ্ক কিয়দূর পর্য্যন্ত স্কুরের দ্বারা কামাইবেক, এবং একটা পেঁয়াজ অঙ্ক কর্ত্তন করিয়া তদ্বারা ঐ স্থান সন্ধ্যার সময়ে ঘর্ষণ করিবেক।

সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা ।

যদ্যপি দুর্বলতা জন্য হয় চায়না, ফেরম্ ।
 যদ্যপি অত্যন্ত ঘর্ম্ম জন্য হয় মর্কিউরিয়স্-বাইবল্ ।
 যদ্যপি অতিরিক্ত কুইনাইন } বেল্লাডোনা ।
 সেবন জনা হয়
 যদ্যপি অধিক পরিমাণে } হেপার, কার্বো-বেজিটেবিলিস্ ।
 পারা সেবন জন্য হয়
 অত্যন্ত দুঃখ এবং কষ্ট জন্য হইলে { ক্যাকিসেগ্রিয়া, এসিডম্-
 ফস্ফরিকম্ ।
 সস্তাপ জ্বরের পর হইলে { ক্যালেকেরিয়া, সাইলিশিয়া,
 লাইকোপোডিয়ম্ ।

উক্ত ঔষধ সকল পূর্ণ মাত্রায় প্রত্যহ রাত্রিতে এক এক বার সেবন করিতে হইবেক । এক এক ঔষধ ছয় কিম্বা আট মাত্রা সেবনের পর যদি আরোগ্য বোধ না হয়, ক্রমে উক্ত সমুদয় ঔষধ ঐ রূপে ব্যবহার করিবে, তাহাতেও যদি আরোগ্য না হয়, তবে তিন্ত বাদামের তৈল এক ফোটা, দুই তোলা মিষ্ট বাদামের তৈলে মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া ঐ ঐ স্থানে লাগাইবেক ।

চক্ষুঃবোগ ।

সমুদয় ইন্দ্রিয় মধ্যে চক্ষুঃ সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ, অতএব তাহাতে পীড়া বোধ হইলে, কোন প্রকার, তীব্র গুণ বিশিষ্ট ঔষধ উপরে দিয়া তাহার হানি করা বিধেয় নহে । চক্ষুতে বেদনা উপস্থিত হইলে কেবল শীতল জল সেচন করিবেক, যদি শীতল জল অসহ্য হয়, তবে তৎপরিবর্তে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল সেচন করা বিধেয়, এবং এক খানী ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড তিন, চারি তোলা করিয়া উক্ত জলের দ্বারা ভিজাইয়া তাহার উপরে দেওয়া আর

চক্ষুঃ নীরস হইলে পরিকৃত জলপাইয়ের তৈল, দেওয়া বিধেয় :
যদ্যপি সমস্ত চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, এবং যাহাকে চক্ষুর প্রদাহ বল-
য়ায় তাদৃশ হয়, তখন তাহাতে কোন শীতল দ্রব্য প্রয়োগ না
করিয়া বস্ত্রখণ্ড মধ্যে তুলি পুরিয়া একটী ক্ষুদ্র গদি প্রস্তুত করতঃ
তাহার উপরে বাঁধিয়া দিবে, এবং নিম্ন লিখিত লক্ষণানুসারে
ঔষধ সেবন করাইবে।

চক্ষু-ফুলার সহিত যদি অর বিদ্যমান থাকে, এবং শুষ্ক
অথবা অত্যন্ত জল স্রাব ও রক্ত বর্ণ হয়, আলোক অসহ্য এবং
অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্ পূর্ণ মাত্রা প্রথমে চারি বা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক
এক বার দিবেক (যে পর্য্যন্ত অর লক্ষণ নিবারিত না হয়)।

চক্ষুর শ্বেত ভাগে এবং পাতার কিনারায় ও কোণে যদি
ফুলা বোধ হয়, আলোক নিতান্ত অসহ্য হয়, চক্ষুর গহ্বরে অত্যন্ত
যাতনা বোধ হয়, সন্ধ্যাকালে ঝাপসা দেখা যায়, দর্শন করিলে
দৃষ্ট বস্তু ছুইটা দেখায়, বিশেষতঃ যদ্যপি মাথা ধরা থাকে,
শ্লেষ্মা স্রাব হয়, রাত্রিতে কাশী বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্ধমাত্রা, ছয় ঘণ্টা অন্তর।

কোন দিকে দৃষ্টি করিতে হইলে চক্ষুর ভিতর বালি থাকার
ন্যায় বোধ হয়, বাতাস লাগিলে চুল্‌কায়, চক্ষুঃ গোলাপি বর্ণ,
অগ্নির আলোক অসহ্য, শ্বেত-ভাগে ফুসুড়ী ও ঘা বোধ হয়,
কিঞ্চিৎমাত্র শীতলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ চক্ষুর পুত্তলিকার
পীড়া বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্ প্ৰকৌস্ত মতে প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক
এক বার।

যদি অত্যন্ত যাতনা থাকে এবং চক্ষুঃ কর্ কর্ করে, ও

পাতা চুল্কায, শ্বেত ভাগে ফুঙ্কুড়ী ও ঘা বোধ হয়, এবং পুঁজের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, ও চক্ষুঃ আঁটিয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সল্ফর অক্সিমাট্রা ছয় বা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদি চক্ষুতে রক্তবর্ণ শিরা দেখায়, চক্ষুর ভিতর শুড় শুড় করে এবং চুল্কায, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জ্বর বোধ হয়, চক্ষুর পাতা বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং প্রাতঃকালে যাতনা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বনিকা, অক্সিমাট্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক !

যদ্যপি অত্যন্ত জ্বালা থাকে রোগীকে অস্থির করে, এবং পাতার কিনারা, ভিতরের দিকে ঘুরিয়া পড়ে তাহাহইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

চক্ষুর শ্বেতভাগ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং গোলাপি বর্ণ হয়, চাপিয়া ধরার ন্যায় যাতনা হয়, কটু জল স্রাব হয়, ও রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, শিরা সকল টানিয়া ধরে, শ্বেত ভাগের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুঙ্কুড়ী দেখা যায়, পুত্তলিকার উপর শাদা দাগ দৃষ্ট হয়, এবং নাসিকার দ্বারা অত্যন্ত জল স্রাব হয়, অত্যন্ত মাথা ধরা, এবং সন্ধ্যাকালে যাতনা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইউগ্লেশিয়া, পূর্ববৎ ।

যদি চক্ষুঃ হইতে জল স্রাব হয়, আলোক অসহ্য এবং রক্ত বর্ণ দেখা যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেশিয়া, অক্সিমাট্রা পরিমাণে আট ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

সন্ধ্যাকালে, কিঞ্চিৎ শীত বোধ হইয়া জ্বর হয়, মল্লাদি থাকে, চক্ষুতে কণ্টক বিজ্ঞার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, আলোক

দৃষ্টি করিলে, কিম্বা কাতাস লাগিলে, অত্যন্ত জল শ্রাব হয়
সন্ধ্যাকালে যাতনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেসেটিল, অর্ধমাত্রা। ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া
তিন চারি দিবস সেবনে যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য বোধ না হয়, পরেতে
ঔষধ, এসিডম্-নাইট্রিকম্ পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

চক্ষুরোগের শান্তি হইয়া যদি কিঞ্চিৎ শেষ থাকে অর্থাৎ
কিঞ্চিৎ যাতনা, এবং চক্ষুর কোণে পিচুটি জমা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—এণ্টমোনিয়ম্-ক্রুডম্ পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যার সময়
এক এক বার করিয়া।

প্রাচীন চক্ষুঃপীড়া।

ঐ পীড়া যদি বহুকাল থাকে এবং অধিক যাতনা না থাকে
তাহার পক্ষে।—

ঔষধ—হেপার অর্ধমাত্রা পরিমাণে দুই বেলা দিবেক আর ও
আর্সেনিকম্, সলফর, ক্যালেকরিয়া এই তিন ঔষধের মধ্যে অন্যতর
একটি প্রত্যহ পূর্ণমাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক সপ্তাহ পর্যন্ত
সেবন করিয়া কিছু উন্নতি হইলে তাহার ছয় দিন পরে পুনর্বার ঐ রূপে
চালাইবেক, অথবা ঐ ঔষধের দ্বারা রোগীর ধাতু পরিবর্তিত হইবে।

শ্লেষ্মা জন্য চক্ষুঃ রোগ।

যদি চক্ষুর পাতার লোম অর্থাৎ ভোঁয়া উঠিয়া যায় এবং
চুলু হইয়া না হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফর বা আর্সেনিকম্, প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিগুণমাত্রা
করিয়া দিবেক। উক্ত দুই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য না হইলে, ঔষধ
মর্কিউরিয়স্, ইউক্লেসিয়া, পেসেটিল, এসিডম্-নাইট্রিকম্, হেপার।

আঘাত জন্য চক্ষু রোগ ।

বাহ্য আঘাতের দ্বারা চক্ষু ফুলিলে, এবং তাহার সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে প্রথমতঃ ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

জ্বর লক্ষণের বিরতি হইলে, বার ঘণ্টা পরে, আণিকা, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক । আর আণিকা অমিশ্র আরক, পাঁচ ফোটা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলের দ্বারা প্রত্যহ তিন বার করিয়া চক্ষুঃ ধৌত করিবেক । যদিও দুই দিবসে আরোগ্য না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সকল প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে পূর্ণমাত্রা পরিমাণে সেবন করিবেক, ঐ রূপ পাঁচ দিন পরে যদি আরোগ্য না হয় তাহা হইলে, ক্যালেকরিয়া, এক মাত্রা করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ।

চক্ষুর ভিতর কোণের নালি ঘা ।

চক্ষুর যে কোণ নাসিকার গোড়ায় থাকে তাহার মধ্যে একটা থলিয়া আছে, তদ্বারা জল ও শ্লেষ্মা চক্ষুঃ হইতে নাসিকা দ্বারা দিয়া স্রাব হয়, সেই থলিয়াতে কোন প্রকার প্রদাহ উপস্থিত হইলে সেই পথ অবরোধ হইয়া নাসিকার দ্বারা দিয়া জলাদি স্রাব রোধ হয়, এবং নিয়ত অশ্রুপূর্ণ ও পিচুটির দ্বারা বদ্ধ হইয়া চক্ষুরোগ উপস্থিত হয়, এই রোগ দৌর্য্যল্যবা শ্লেষ্মাধিকা শরীরে উপস্থিত হইলে, বহু দিনে আরোগ্য হয় ।

চিকিৎসা ।

যদি এই রোগ অস্পকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, অত্যন্ত প্রদাহ, ও যাতনা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি রোগীর স্লেয়াধিক্য ধাতু হয়, এবং এই রোগ সন্ধ্যাকালে, বা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কিম্বা অজীর্ণ রোগ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—পলেসটিলা, কিম্বা নক্স-বমিকা পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাতে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি পিত্তাধিক্য ধাতুতে হয়, এবং প্রাতঃকালে, বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি অধিক দিন স্থায়ী অর্থাৎ এই রোগ প্রাচীন হয় তৎপক্ষে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, এবং সলফর, অর্দ্ধমাত্রা দুই বেল ।

রক্তবর্ণ চক্ষুঃ ।

এই পীড়া আঘাত বা পতন হইতে, কিম্বা বমন, কাশী, কোন প্রকার বেদনাদি হইতে উৎপন্ন হইলে ইহা প্রায় আপনাই আরোগ্য হইয়া থাকে, যদি আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, দুই বেল পূর্ণ মাত্রা এবং আর্গিকার অমিশ্র আরক ছয় ফোটা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রত্যহ তিন বার করিয়া চক্ষুঃ ধৌত করিবেক ।

যদ্যপি ঘাড়ের শিরা দপ্ দপ্ করে, মুখ ফোলে, এবং মস্তকে যাতনা বোধ হয়, আরও যদি কেবল কোন আঘাতে দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক ।

চক্ষুঃ দিয়া রক্তস্রাব ।

ঔষধ—বেলাডোনা, ক্যামোগিলা, নক্স-বমিকা, ইহার মধ্যে অন্যতর একটি ঔষধ পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ স্বায়ং এবং প্রাতঃকালে, এক এক বার করিয়া সেবন করিবেক ।

অগ্নি দৃষ্টি ।

যদ্যপি চক্ষুরোগ উপস্থিত হইয়া তাহা নিবারিত হওয়ার পর অগ্নি দৃষ্টি হয় ।

ঔষধ—সল্ফর, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালেও সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া ।

যদ্যপি বিকার জ্বর হইতে মুক্ত হওয়ার পর দৃষ্টির অগ্নিতা হয়, অথবা চক্ষুঃ নীরস জন্য উক্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এসিডম্-ফস্ফরিকম্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পার্শ্ব দোষ জন্য হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্ বা সল্ফর পূর্ববৎ ।

পথ্য ব্যবস্থা—যে পর্য্যন্ত চক্ষুরোগ প্রবল থাকে সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার মৎস্য মাংস ব্যবহার করিবেক না, চর্কণে অতিশয় কঠিন দ্রব্য আর শাকাদি, অম্ল, মাসকলাইর দাইল, প্রভৃতি বর্জন করিবেক । চক্ষুঃ আলোক হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেক, অধিক কাল এক বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করিবেক না ।

আঞ্জিনা অর্থাৎ চক্ষুব্রণ ।

চক্ষুর পাতার কোণেতে এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহাতে অত্যন্ত প্রদাহ এবং সাধারণতঃ জ্বর বোধ হইয়া থাকে ।

যখন স্থানীয় প্রদাহ অত্যন্ত প্রবল থাকে, এবং জ্বরের সহিত সংযুক্ত থাকে ।

ঔষধ—পল্লেসটিসা, পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে ।

যদ্যপি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়া পুঁজ হইবার উপক্রম হয়; ও দপ্ দপ্ করে, তৎকালে চক্ষুব্রণ পাকাইয়া শীঘ্র কাটাইবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—হেপার, অর্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ছয় বার দিবেক ।

যদ্যপি প্রদাহের হ্রাস হইয়া কেবল শ্বেত বর্ণ ও কঠিন একটি ব্রণের ন্যায় অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—স্ট্র্যাক্সিসেগ্রিয়া, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ।
(কিন্তু এই ঔষধ পূর্বোক্ত কোন প্রকার ঔষধ সেবনের দুই দিবস পরে আরম্ভ করিবেক ।)

পথ্য ব্যবস্থা—পূর্বোক্ত চক্ষুরোগের পরিশেষে যে প্রকার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তদনুসারে পথ্য ব্যবস্থা করিবেক, কেবল হঠাৎ শীত হইতে গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্ম হইতে শীত, ও অত্যন্ত আলোক, অতি শীতল বায়ু বহন অথবা কুজ্জ্বটিকার সময়ে গৃহ হইতে কদাচ বহির্গমন করিবেক না ।

কর্ণরোগ ।

কর্ণের ভিত্তর এবং বহির্ভাগের প্রদাহকে কর্ণ শূল বলা যায় ।

কর্ণমূল।

কর্ণের মূলস্থানে যে গুঠলি থাকে তাহা ফুলিলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-বাইবস্, চারি ঘণ্টা অন্তর পূর্ণমাত্রা পরিমাণে সেবন করিবেক।*

যদ্যপি প্রদাহ বিশিষ্ট হইয়া ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা পূর্ববৎ।

যদ্যপি ফুলা হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া মস্তকে আক্রমণ করিবার উপক্রম বোধ হয়।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ববৎ।

এই রোগের শেষ চিহ্ন নষ্ট করিবার নিমিত্ত।

ঔষধ—সরফর, পূর্ববৎ।

কর্ণের ভিতর ফুলা।

যদ্যপি কর্ণশূলের সহিত জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

ঔষধ—প্রথমে একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

পরেতে জ্বর লক্ষণের বিরাম হইলে যদ্যপি মুখ রক্তবর্ণ হয়, ও কিলক বিঁধার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, কিঞ্চিৎ মাত্র শব্দ শ্রবণে কষ্ট বোধ, ও জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিয়া মস্তিষ্কের প্রদাহ থাকে ও রোগী প্রলাপ বলিতে থাকুক তাহাহইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক।

* এই ঔষধের তিন চারি মাত্রাতেই প্রায় আরোগ্য হইবেক।

কর্ণের ভিতরের যাতনা যদিও গণ্ডদেশ এবং দন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, ও কর্ণের অভ্যন্তরে শীত বোধ, ও রক্ত মধ্যে ঘাইয়া রস নির্গত হয়, এবং গুঠলি ফুলে তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দ্বারা রসঃস্রাব নিঃশেষিত না হয়, এবং কাণ্‌ভোঁ ভোঁ করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সল্‌ফর, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি কর্ণের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে, এবং অভ্যন্তরে কিলক বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, ও অতিরিক্ত পরিমাণে রসঃস্রাব হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পলেস্‌টিলা, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর । *

কর্ণ শূল ।

যে কর্ণ স্বভাবতঃ ভিজ্জা থাকে ও যাহা হইতে সময়ে সময়ে রসঃনির্গত হয় তাদৃশ কর্ণে বেদনা হইলে ।

ঔষধ—পলেস্‌টিলা, অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে প্রত্যেক ঘণ্টায় সেবন করিবেক ।

যদ্যপি কর্ণ শুষ্ক থাকে ও ললাটে, মস্তকের উভয় পাশ্বে, এবং বদনের অস্থিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা ব্যাপ্ত হয়, ও সেই যাতনা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জলে ভিজাতে বা শ্লেয়া জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—ডল্ফেমেরা, পূর্ববৎ ॥

ছুরিকা বিদ্ধ করার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, কোন শব্দ সহ্য হয়না এমত হইলে।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, অর্দ্ধ মাত্রা ঐ রূপ।

উচ্চ শব্দ অসহ্য বোধ হইলে।

ঔষধ—আর্নিক', পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর।

উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর যদি কিছু শেষ থাকে তাহা দূর করিবার নিমিত্তে।

ঔষধ—সল্ফর পূর্ববৎ

কর্ণ হইতে রসঃস্রাব অর্থাৎ বাণ্ গলা।

কর্ণের ভিতর কেবল ঈষৎ উষ্ণ জল দিয়া পরিষ্কার করিবে, অন্য কোন পদার্থ বা পিচ্কারি দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।

চিকিৎসা।

যদ্যপি এই উপসর্গ উপস্থিত হইবার পূর্বে কর্ণে কোন প্রকার প্রদাহ হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য ইহা উপস্থিত হওয়া লক্ষিত হয়, অথবা কর্ণ উষ্ণ ও রক্ত বর্ণ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—পেটসেটলা, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও নৈশকালে।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ সেবনের দুই দিবস পরে, উপশম বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূরোক্ত প্রকারে ছয় দিবস পর্য্যন্ত দিয়া তাহার চারি দিবস পরে সলফর্, ঐ রূপে দিবেক ।

শ্লেষ্মা জন্য কাণ্ গলা ।

কর্ণদ্বার দিয়া যে রস নির্গত হয় তাহা যদ্যপি পুঁজের ন্যায় না হইয়া শ্লেষ্মার ন্যায় দেখা যায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, মর্কিউরিয়স্, পল্লেসটিলা, বা সলফর্, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ পূর্ণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে, সেবন করিবেক ।

যদ্যপি কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ, জলবৎ রস্, বা পুঁজঃ নির্গত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কটিকম্, বা কার্বো বেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ বহু কাল স্থায়ী হইয়া প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার্, সাইলিশিয়া, বা সলফর্, দ্বিগুণ মাত্রা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে, এক বার করিয়া সেবন করিবেক ।

যদ্যপি কর্ণ দিয়া রক্ত পড়ে তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পল্লেসটিলা, বা সাইলিশিয়া, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার ।

যদ্যপি কর্ণ দিয়া রক্ত মিশ্রিত পদার্থ স্রাব হয়, এবং তাহা প্রায় দোষ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ঔষধ—হেপার্, এসিডম্-নাইট্রিকম্, সাইলিশিয়া, ইহার মধ্যে যে

কোন একটা ঔষধ পূর্ববৎ বা সফর, দ্বিগুণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক বার করিয়া।

যদ্যপি কর্ণের ভিতর অস্থিতে ঘা হইয়া পাতলা তুর্গন্ধ ক্লেদ নির্গত হয়, এবং তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—অরম্-মেটালিকম্, ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্, সাইলিশিয়া, বা সফর, পূর্ববৎ।

কোন অন্যায় উপায়ের দ্বারা কর্ণ হইতে রসঃস্রাব বন্ধ করিলে যদ্যপি অন্য কোন প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, ব্রায়োনিয়া, অথবা সফর, পূর্ববৎ সেবন করিবেক।

কর্ণের ভিতর শব্দ বোধ বা কাণ্ ভোঁ ভোঁ করা।

এই উপসর্গ যদ্যপি কাণ্ গলা, বা কর্ণশূল, বা বধিরতার সহিত সংযুক্ত থাকে এবং কখন কখন মাথা ধরে তাহা হইলে, ও বিশেষতঃ যদি শ্লেষ্মা জন্য হয়, ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ তিন বা চারি বার করিয়া।

যদ্যপি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—পতেসটিলা, পূর্ববৎ।

রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে।

ঔষধ—ডল্ফেমেরা, পূর্ববৎ।

উক্ত উপসর্গ থাকিয়া যদি রোগীর অতিরিক্ত ঘর্ম হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-বাইবস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি উক্ত উপসর্গ উপস্থিত হইয়া ঘর্ম না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ ।

এই রোগের সহিত যদ্যপি জ্বর থাকে এবং কণ্ঠের ভিতর গান করা বা যন্ত্রের শব্দের ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ বোধ হয় তাহা হইলে,

ঔষধ—চায়না, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি উক্ত প্রকার শব্দ অতিরিক্ত পরিমাণে বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি প্রত্যেক বার পদবিক্ষেপ কালীন কণ্ঠের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া শব্দ হয়, ও রোগীর হস্ত পদাদি কামড়ায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফিকম্, পূর্ববৎ ।

বধিরতা অর্থাৎ শ্রবণ শক্তির অল্পতা ।

যদ্যপি বধিরতার সহিত কণ্ঠের ভিতর গানের শব্দের ন্যায়, বা ঝন্ ঝন্, টন্ টন্ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরট্রুম্, দ্বিগুণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক বার করিয়া ।

যদ্যপি মস্তকে রক্ত বদ্ধ জন্য অথবা কর্ণ রক্ত মধ্যে রক্ত বদ্ধ হওয়াতে এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, বা সফর, পূর্ণমাত্রায় পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই উপসর্গের সহিত কাণ্ গলা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেসেটলা, মর্কিউরিয়স্, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ পূর্ববৎ সেবন করিবেক ।

যদ্যপি মস্তকে জল বদ্ধ জন্য এই উপসর্গ হইয়া তাহার সহিত গলায় বেদনা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাসোমিলা, আসেনিকম্, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ উক্ত প্রকারে সেবন করিবে ।

যদ্যপি শরীরের কোন স্থানের ঘা, বাহ্যিক কোন প্রকার ঔষধ দ্বারা নিবারণ করাতে বধিরতা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সফর, বা এন্টিমোনিয়ম্-কুডম্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জিহ্বার নীচে ফুলিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাফিসেগ্রিয়া, বা মর্কিউরিয়স-বাইবস্, পূর্ববৎ ।

সহকারী বিধি ।

ঈষৎ উষ্ণ জল পিচ্কারি দ্বারা টানিয়া কর্ণে দিয়া কর্ণ পরিষ্কার করাইবেক, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দ্রব্য কর্ণের ভিতর দেওয়া বিধেয় নহে ।

পথ্যব্যবস্থা—কর্ণরোগের তরুণাবস্থায় জ্বর কুলাীন যৈ

প্রকার পথ্য উক্ত হইয়াছে সেই রূপ ব্যবস্থা করিবেক । আর যদি প্রগাঢ় জ্বর, বা হাম, বা বসন্ত, রোগের অন্তে কণ হইতে স্রাব হয়, তৎকালে সহজে পরিপাক করা যায়, এবং বলকারক হয়, ও সামান্য রূপে পাক করা এমত দ্রব্য মাত্র ব্যবহার করা বিধেয়, মৎস্য, দুগ্ধ, অন্ন, শাকাদি, কলাইর দাইল, মিষ্টান্ন, এবং ঘাহাতে শরীরের রক্তকে উষ্ণ করে এমত মসলাদি ও নেশার দ্রব্যাদি নিষেধ ।

নাসিকা রোগ ।

নাসিকার স্বীততা ।

যদ্যপি নাসিকা কোন আঘাতের দ্বারা ফোলে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণ মাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার সেবন করিবেক এবং আর্গিকা অমিশ্র আরকের ৪০ চল্লিস ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা দিবসের মধ্যে তিন বার ধৌত করিবে ।

যদ্যপি কোন প্রকার পারা ঘটিত ঔষধ সেবন জন্য হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার্, এসিডম্-নাইট্রিকম্, বেলাডোনা অথবা সলফর এই কএকটি ঔষধের মধ্যে যে কোন একটি ঔষধ পূর্ববৎ নিয়মাত্মসারে, সেবন করিবেক ।

যদ্যপি তীব্র-বীর্য মদ্য পান জন্য তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-ধমিকা, ল্যাকিসিস্, আর্সেনিকম্ বা সলফর, পূর্ব ব্যবস্থা মতে সেবন করিবেক ।

যদ্যপি কারণ লক্ষিত না হয় তাহা হইলে ।

উষধ—বেলাডোনা, মর্কি উরিয়স্, হেপার, বাঁ পতেসটিলা পূর্ববৎ ব্যবস্থা মতে সেবন করিবেক ।

উক্ত কএক প্রকার ঔষধের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা ।—

নাসিকা রম্ম ফুলিয়া অভ্যন্ত জ্বালা হয়...বেলাডোনা ।

নাসিকা চুল্‌কায় এবং রক্ত বর্ণ হয় ...মর্কি উরিয়স্-বাইবস্ ।

যদি ফোলায় সহিত কাল দাগ থাকে ...সলফর্

নাসিকার উপরে লাল দাগ থাকে ...এসিডম্-ফস্‌ফরিকম্

যদি নাসিকার অগ্রভাগ লাল হয় ...রস-টক্সিকোডেগুন ।

যদি তাম্র বর্ণ লাল হয় আসেনিকম্ ।

নাসিকা দ্বারা রক্ত স্রাব ।

যদ্যপি বাহ্য আঘাত কিম্বা পতনের দ্বারা নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হয়, এবং নাসিকা ও কপাল চুল্‌কায় তাহা হইলে

উষধ—আণিকা পূর্ণমাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার সেবন করিবেক,

যদি স্ত্রীলোকের রজস্রাৱা কালীন অগ্নি স্রাব জন্য নাসিকা দ্বারা রক্ত স্রাব হয়, এবং রক্ত কখন বন্ধ ও কখন স্রাব হয়, আরও যখন বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে, বা দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে স্রাব হইতে আরম্ভ হয় তৎকালে ।

উষধ—পতেসটিলা, পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা কোন মতে রক্ত বন্ধ না হয়, এবং হঠাৎ বন্ধ করিবার আবশ্যক হইলে যে দিকের নাসিকা

দ্বার দিয়া রক্ত স্রাব হইতে থাকে সেই দিকের হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া কিয়ৎকাল রাখিলে রক্ত বন্ধ হইবেক, যদিপি মদ্যাদি পান জন্য রক্ত স্রাব হয় তাহা হইলে গরম জলে হাত ডুবাইয়া, পরেতে জল হইতে উঠাইয়া স্থির ভাবে রাখিবেক, ইহাতেও যদি নিবারণ না হয় তবে পৃষ্ঠাঙ্ঘ্রি অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উপর প্রস্তুত কিম্বা লোহ নির্মিত কোন শীতল পদার্থ কিয়ৎকাল ধরিয়া রাখিবেক ।

নাসিকার ভিতরের অস্থিতে বা আর্থাৎ পিনস্ রোগ ।

যদিপি উপদংশ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং রোগী পূর্বে পারা ব্যবহার না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃকালে এক বার করিয়া দশ দিন যাবৎ সেবন করিবেক ।

যদি পারা দোষে কিম্বা, শ্লেষ্মা জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—অরম্-মেটালিকম্ পূর্ববৎ ।

যদিপি পারা দোষ জন্য হইয়া সমুদয় নাসিকাকে, আক্রমণ করে এবং অরম্ নামক ঔষধে আরোগ্য বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্, সফর, ক্যালেকরিয়া বা সাইলিশিয়া ইহার অন্যতর একটী ঔষধ পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ রাত্রিতে এক বার এবং প্রাতঃকালে এক বার করিয়া সেবন করিবেক ।

পারা দোষ জন্য পিনস্ হইলে, নিম্নোক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার হইয়া থাকে যথা, হেপার-সল্ফুর, কার্বো-বেজিটেবিলিস্, ল্যাকিসিস্, এসিডম্-ফস্ফরিকম্ ।

পথ্যব্যবস্থা—যদ্যপি আঘাত জন্য নাসিকা রোগ হয় তাহা হইলে, দুই দিবস পর্য্যন্ত লঘু আহার করিয়া থাকিবেক, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য কিম্বা যাহাতে শোণিত উত্তেজিত করে তাহা ব্যবহার করিবেক না, কিন্তু যদ্যপি ঐ রোগ পারার দোষে কিম্বা অন্য কোন আঘাত জন্য ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত আরোগ্য না হইবে সেকাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার আহার এবং ব্যবহারের নিয়ম রাখিতে হইবেক কোন প্রকারে গুরুপাক দ্রব্যের দ্বারা পাকস্থলিকে ভারায়িত করিবেনা, আহারের নিয়ম কাল এক সময়ে রাখিবেক, অল্প রাত্রিতে শয়ন এবং প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতে ক্রটি করিবেনা ।

পলিপস্।—(এক প্রকার নাসিকা রোগ)

নাসিকার মধ্যে উভয় পাশ্বে ঝিল্লুর মধ্যস্থ পদার্থের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া নাসিকার দুই দ্বার হইতে বাহির হয় । তাহাদিগের গোড়া অল্প পরিসর এবং অগ্রভাগ বিস্তৃত । যখন এই রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া উভয় নাসিকার দ্বার বদ্ধ হয়, তখন রোগী অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে । ইহার চিকিৎসার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ সকল ক্রমশঃ প্রয়োগ করিবেক ।

যথা—ক্যালেকেরিয়া, ফস্ফরস্, স্ট্যাকিসেগ্রিয়া, সিপিয়া, সাইলিশিয়া, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্ন কালে এক বার করিয়া ।

নাসা-রোগ, বাহা সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন নাই তজ্জন্য অরের চিকিৎসা করিলেই আরোগ্য হইবে। নাসা ভাঙ্গা, অর্থাৎ কোন প্রকার অস্ত্র বা অন্য প্রকরণ দ্বারা নাসিকা হইতে রক্ত বাহির করা বিধেয় নহে। অতএব ইহা নিবারণ জন্য—

ঔষধ—একোনাইট্ বেলাডোনা, বা পতেসটিলা পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার উপর্যুপরি বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেবন করিবে।

মুখ রোগ ।

এই রোগে মুখে দুর্গন্ধ ও মাটী রক্ত বর্ণ, উত্তাপযুক্ত অতি কোমল হয়, এবং মাটী দিয়া রক্ত স্রাব হয়। কখন কখন ফুস্ফুড়ীর ন্যায় ফুলিয়া উঠে, লাল কাটে, দন্ত চালিত হয়, চর্ষণ করিতে এবং গিলিতে অসুখ বোধ হয়। অত্যন্ত দুর্বলতার সহিত কিঞ্চিৎ অর থাকে, এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক বার করিয়া পূর্ণ মাত্রায় দিবেক।

যখন গলার গুঠলিতে বেদনা বোধ হয়, অথবা শীতল কোন পদার্থ সংলগ্ন হইলে যাতনা হয় তৎকালে।

ঔষধ—ভল্কেমেরা পূর্ববৎ।

যদি চর্ষণ কালীন দন্ত দিয়া রক্ত স্রাব হয়, জিহ্বা চালনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, অথবা অধিক পরিমাণে লবণ দ্রব্য ভোজন, বা পারার দোষে এই উপসর্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, বা হেপার্, পূর্ববৎ।

যদ্যপি প্রথমোক্ত ঔষধের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপশম বোধ হয় তাহা হইলে পরেতে ।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই উপসর্গের সহিত মাটির উপরের মাংস ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাফেসেগ্রিয়া পূর্ববৎ ।

যদি ঘা হয় ও মাটী কৃষ্ণ বর্ণ, অতি কোমল-স্পর্শ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, এবং জ্বালা থাকিলে আসেনিকম্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি মাটির ঘা শীঘ্র আরোগ্য হইবার উপক্রম না দেখা যায়, এবং জিহ্বার উপর, ওষ্ঠে ও গণ্ডদেশে এমত ফোঁকা উঠে যে তজ্জন্য বাক-শক্তির হানি, এবং চর্ষণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট জন্মায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্ ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

পথ্যব্যবস্থা—মাটিতে ঘা থাকা কালীন মৎস্যাদি বর্জিত করিবেক, এবং লঘু পাক দ্রব্য নিয়মিত সময়ে পরিমিত রূপে আহাৰ করিবেক । দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জন পরিত্যাগ করিবেক ।

মাটির ফোড়া ।

লক্ষণ—মাটির উপর প্রদাহ যুক্ত অত্যন্ত যাতনার সহিত ফোড়া উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া পুঁজ হইয়া নির্গত হয় ।

যখন ফুলিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ হয়, এবং তালু পর্য্যন্ত ফোলে তৎকালে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, এবং বেলাডোনা, উপর্য্যুপরি রূপে । অথবা কেবল মর্কিউরিয়স্, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক ।

যদ্যপি এই রোগ অজীর্ণ জন্য হয়, এবং জিহ্বার বিকৃতি, ক্ষুধার অল্পতা, কোষ্ঠ বদ্ধ এবং স্তম্ভিত হইয়া থাকে, অথবা থিট্ থিটে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে, এবং সন্ধ্যাকালে দুই দিবস পর্য্যন্ত দিয়া তাহার শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি উক্ত উপসর্গ উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত পাক-স্থলির দোষ থাকে, অর্থাৎ কখন কোষ্ঠ বদ্ধ, ও কখন অতিসার হয়, ও যদ্যপি রোগী ম্লান স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেচেনটিলা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা কিঞ্চিৎ কমিয়া এক ভাবে থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফর, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার চারি দিবস যাবৎ দিবেক ।

যদ্যপি দন্ত ক্ষয় জন্য এই রোগ উপস্থিত না হইয়া থাকে এবং দপ্ দপ্ করে ও ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠে ও স্ফোটক উৎপাদন বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার, অর্দ্ধ মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর (যে পর্য্যন্ত রোগ শান্তি না হয়,) সেবন করিবেক ।

যদি এই রোগ দন্ত ক্ষয় নিমিত্ত হয় এবং পূর্কোক্ত ঔষধ

• মধ্যে অন্যতর কোন ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে আর
যদ্যপি মাটি ফোলে এবং পুঁজ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, রোগের তরুণাবস্থায় পুর্বোক্ত মতে সেবন
করিবেক । পরে কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পূর্ণমাত্রা প্রাতঃকালে ও
সন্ধ্যাকালে, এক এক বার সেবন করিবেক ।

জ্ঞান দন্ত (আঁকেল দাঁত)

উঠিবার সময় অত্যন্ত যাতনার সহিত মাটি ফুলিয়া যদ্যপি
তাহার সহিত উত্তেজিত অর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহা
হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর (যে পর্য্যন্ত
অর লক্ষণ হ্রাস না হয়) সেবন করিবেক ।

যদি মাটি তৎকালে সম্পূর্ণ কোমল এবং বা হওয়ার ন্যায়
বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণবৎ ।

যদ্যপি অত্যন্ত ফোলা থাকে এবং তাহার সহিত মুখ
ফোলে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, এবং ক্যামোমিলা, উপর্যুপরি, অর্ধ মাত্রা
চারি ঘণ্টা অন্তর ।

পুর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগদ্বারা যাতনা, ফোলা, এবং প্রদাহের,
কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে এবং দন্ত বাহির হইতে বিলম্ব ও কষ্ট
হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে, এক
সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিয়া, অষ্টাহ পরে যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে
পুনর্বার এই ঔষধ ঐরূপে ব্যবহার করিবে ।

মাটি হইতে রক্ত আব।

যদ্যপি মাটির উপর মাংস বৃদ্ধি হইয়া রক্ত আব হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যাফিসেগিয়া, পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে।

যদ্যপি পারা দোষ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মাটি যাতনা বিশিষ্ট ক্ষীত ও কোমল স্পর্শ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ববৎ।

একপ লক্ষণ থাকিয়া যদ্যপি এই রোগ পারাদোষ জন্য নিশ্চয় লক্ষিত হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্, প্রথমতঃ পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা মধ্যে চারি বার সেবন করিয়া তাহার দুই দিবস পরে, চায়না এই রূপ চারি বার, এই রূপে উপযুগ্মপরি রূপে দিবেক।

যদ্যপি উক্ত প্রকার চিকিৎসা দ্বারা কিছু মাত্র আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে পর—

ঔষধ—হেপার্, এবং এসিডম্-নাইট্রিকম্, উক্ত প্রকারে উপযুগ্ম-পরি দিবেক।

যদি পূর্বোক্ত ঔষধসকলে আরোগ্য বোধ না হয়, এবং কিঞ্চিৎমাত্র স্পর্শ অথবা ঘর্ষণ করিলে রক্তপাত হয়।

ঔষধ—এসিডম্-ফস্ ফরিকম্, পূর্ণ মাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে দিবেক।

যদি বহুকাল স্থায়ী এবং সহজে আরোগ্য হয় না ও মাটিতে ঘা হইয়া থাকে এবং সামান্য বা বিনা কারণে রক্ত আব হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—কটিকম্, ন্যাট্রম-মিউরিএটিকম্, লাইকোপোডিয়ম্, ইহার অন্যতর একটা ঔষধ পূর্বোক্ত ব্যবস্থামত সেবন করিবেক।

যাহাদের এই রোগ পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে এবং যে রোগ সহজে আরোগ্য হয়না তৎপক্ষে ।

ঔষধ—এলমিনা, সিপিয়া, মাইলিশিয়া, এসিডম্-সল্ ফরিকম্, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে পূর্ণমাত্রায় সেবন করিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা—যদ্যপি এই রোগ সামান্যতঃ দন্ত ক্ষয় বা জ্ঞান দন্ত উঠা কিম্বা অজ্ঞানতা রূপে দাঁত তোলা জন্য হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত প্রদাহ অবস্থা থাকিবেক সে কাল পর্য্যন্ত পরিমিত রূপে আহার করিবেক এবং কোন মতে শীত বৃদ্ধি কারক বায়ু সেবন করিবেক না, বা শীতল জল মুখে দিবেক না, অপিচ এই রোগ প্রায় পাকস্থলির শক্তি হীনতা জন্য হইয়া থাকে অতএব গুরুপাক দ্রব্য কোন মতে আহার করিবেক না এবং মৎস্য মাংসাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল উদ্ভিজ্জ দ্রব্য মাত্র (কোন প্রকার গরম মসলা ইত্যাদি না দিয়া কেবল সামান্য প্রকারে প্রস্তুত করিয়া) ভোজন করিবেক ।

দন্ত রোগ ।

দন্ত শূল প্রথমে দন্তে আরম্ভ হইয়া, মস্তক, কণ, নীচের উপরের মাড়ী এবং মুখের অস্থি পর্য্যন্ত আক্রমণ করে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি এমত যাতনা হয় যে রোগী রোদন করে, কল্পিত হয়, এবং এমত অস্থির হয় যে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা থাকেনা, আরও যদ্যপি যাতনা, কখন থাকে এবং কখন, থাকেনা, এমত হয় তাহা হইলে—

ঔষধ—কফি, পূর্ণমাত্রা যাতনা বিবেচনায় ছুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উক্ত ঔষধের দ্বারা যাতনার নিবৃত্তি না হয় এবং হিম জলে ঠেকিলে দপ্ দপ্ করে মস্তকে রক্ত বদ্ধ হয় মুখে জ্বালার ন্যায় যাতনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ণ মাত্রা এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধে বিশেষ বোধ না হয় এবং রোগী রোদন করিতে থাকে, অসহ্য যাতনা সময়ে সময়ে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি কএসের দন্তে এমত যাতনা হয় যে, সেই দিগের মুখের অস্থি সকল, মস্তকের পার্শ্ব পর্য্যন্ত যাতনা যুক্ত হয়, দন্ত ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বোধ হয়, দন্তের ভিতর দিয়া মাটী পর্য্যন্ত চিবাইতে থাকে, চৰ্চরণ করিবার বাধা দায়ক হয়, এবং মাটী কিঞ্চিৎ ক্ষীত হয় তাহা হইলে

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা এক, দুই, বা তিন, ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি দন্ত শুলের সহিত এক পাশ্বে মাথা ধরা এবং কর্ণ শূল থাকে ও ক্ষয় দন্তে এমত যাতনা বোধ হয় যে, তাহা বদনের বাম দিক্ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বসিয়া থাকিলে কৰ্কট বোধ হয়, এবং ভ্রমণ করিলে কিঞ্চিৎ স্তম্ভ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেসেটিল, পূর্ববৎ ।

যদি এমত যাতনা বোধ হয় যে, রোগীকে উন্মাদের ন্যায় করে এবং মাটীতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, ও চৰ্চরণ কালীন দস্ত লড়ে, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েনস, পূর্ববৎ ।

- যদি জ্বর থাকে একোনাইট্
- রাত্রিতে হৃদ্ধি হইলে এবং পিপাসা থাকিলে } একোনাইট্, বেলাডোনা,
- লড়িলে এবং হৃদ্ধি হওয়া বোধ হইলে ... ত্রায়োনিয়া
- বালকের হইলে { ঐকোনাইট্, ক্যামোমিলা,
মর্কিউরিয়স্ ।
- শীতল জলে হৃদ্ধি হইলে ত্রায়োনিয়া, নক্স-বমিকা সর্ফর,
- যদি দন্ত ক্ষয় হয় বেলাডোনা, মর্কিউরিয়স্,
- যদি দন্ত রোগ জন্য মাটি ফোলে... মর্কিউরিয়স্, নক্স-বমিকা,
- যদি মাটির নীচের গুঠলি ফোলে... ঐ ঐ
- রাত্রিতে শয়ন করিলে হৃদ্ধি বোধ হয় } ক্যামোমিলা, পতেসটিলা,
মর্কিউরিয়স্, ফস্ফরস্,
- যদি শীতল হস্ত দস্তে দিলে আরাম বোধ হয় } রস-টক্সিকোডেণ্ড্রন, ত্রায়োনিয়া,
- যদ্যপি তাহার সহিত অভিশয় যাতনা থাকে } ক্যামোমিলা, ডল্কেমেরা,
- যদ্যপি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে ত্রায়োনিয়া, নক্স-বমিকা, সর্ফর,
- যদি ঔষধ দ্রব্য লাগিলে অধিক কষ্ট হয় } বেলাডোনা, এসিডম্-ফস্ফরিকম্,
- যদি আহার করিবার সময়ে কষ্ট বোধ হয় } মর্কিউরিয়স্, কার্বো-বেজিটে-
বিলিস্ ত্রায়োনিয়া,
- যদি চাপিলে আরাম বোধ হয় ... বেলাডোনা, চায়না, পতেসটিলা,
- যদি গমন কালীন হৃদ্ধি বোধ হয় ত্রায়োনিয়া, নক্স-বমিকা,
- যদি শয়ন কালে যাতনা হৃদ্ধি হয় ইগ্লেশিয়া,
- যদি চেতন কালে হৃদ্ধি হয় { বেলাডোনা, নক্স-বমিকা, কার্বো-
বেজিটেবিলিস্.

দন্ত উঠানের পর যেযাডনা থাকে তাহা নিবারণ জন্য আর্গিকা, (অশ্রিম আরক) পাঁচ কোটা এক পোওয়া শীতল জলেতে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা পুনঃ পুনঃ কুলকুচা করিবেক।

ব্রসনা প্রদাহ।

(জিহ্বা প্রদাহের সহিত কোলা)

লক্ষণ—জিহ্বাআলার সহিত কুলিয়া রক্ত বর্ণ হয়, সেই কোলা কখন কখন এমন বৃদ্ধি হয় যে, মুখের গহ্বরকে প্রায় অবরোধ করে, যদ্যপি চিকিৎসিত না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পরেতে পাকিয়া পুঁজ হইয়া গলিয়া যাইবার সম্ভব।

উৎপাদক নিদান, অর্থাৎ যে কারণে উৎপন্ন হয়।

বাহ্য আঘাত জন্য, কটু দ্রব্য সংলগ্ন হওয়াতে, বা শ্লেষ্মা জন্য, অথবা শরীরের অভ্যন্তরস্থ এক যন্ত্রে রোগ উপস্থিত হইয়া অন্য যন্ত্রে নীত হওয়া।

চিকিৎসা।

যদ্যপি দন্ত রোগ জন্য কিম্বা দন্ধ জন্য জিহ্বা কোলে তাহা হইলে।

ঔষধ—আর্গিকা, (অমিশ্র আরক) বিষ কোটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা দিবা, সন্ধ্যাতে তিন চারি বার জিহ্বা ধৌত করিবে।

যদ্যপি ভক্ত মতে আরোগ্য না হয় এবং রোগ কাঠন হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—এনিডম্-ফস্ফরিকম্ পূর্ণ মাত্রা বার বার। অন্তর এক এক বার দিবেক।

উক্ত ঔষধ দ্বারা কিঞ্চিৎ আরোগ্য বোধ হইলে সর্বতোভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—সত্বর, এবং সাইলিশিয়া, পূর্ণ মাত্রা, প্রাতঃকালে, এবং সন্ধ্যাকালে উপর্যুপরি অথবা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে ।

যদ্যপি কোন প্রকার অগ্নি দাহন জন্য হয়, এবং অত্যন্ত জ্বালা করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—অটিকা, ইউরেন্স, অমিশ্র আরকের বিষ ফোটা এক পোওয়া জলে মিশ্রিত করিয়া তন্দ্বারা দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক বার জিহ্বা ধৌত করিবেক ।

যদ্যপি কেবল অত্যন্ত ফোলা থাকে এবং জিহ্বা কঠিন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্দ্ধ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দ্বারা শীঘ্র উপশম বোধ না হয়, এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ,

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ মাত্রা, কিন্তু চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি অর্শঃ কিম্বা বাতজ কোন ব্যাধি হঠাৎ নিবারিত হওয়াতে এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল্‌সেটিলা, পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে চারি দিবস পর্য্যন্ত ।

যদ্যপি পাকিয়া গলিবার উপক্রম হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, ল্যাক্সিস্ এই উভয় ঔষধের প্রথমোক্তটী প্রয়োগ করিতে হইলে অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক, এবং পরেতে ছয় ঘণ্টা অন্তর শেষোক্ত ঔষধ পূর্ববৎ দিবে ।

পথ্যব্যবস্থা—দ্রব্য দ্রব্য অর্থাৎ যাহা চর্ষণ করিতে না হয়, অথচ লঘু পাক হয়, এমত দ্রব্য কিঞ্চিৎমাত্র উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ভোজন করিবেক ।

বিস্তার ।

- প্রাতঃকালে তিক্ত আশ্বাদন
পাকিলে } সফর, ব্রায়োনিয়া, ক্যাস্কেরিয়া,
- চর্ষিত দ্রব্য তিক্ত বোধ হইলে { সফর, ব্রায়োনিয়া, হেপার,
কলোসিন্থিস্,
- আহার্য এবং পানীয় উভয় তিক্ত
বোধ হইলে } পেসেটিল, চায়না,
- ভোজন কিম্বা পানের পর তিক্ত
বোধ হইলে } পেসেটিল, ব্রায়োনিয়া,
- প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে তিক্ত
বোধ হইলে } পেসেটিল, আর্ণিকা,
- যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিম্বা নিয়-
তই তিক্ত বোধ হয় } একোনাইট্, বেলাডোনা, বেরাট্রুম্,
- যদি লবণ রস বোধ হয় ... { এসিডম্-ফস্ফরিকম্, নক্ল-বমিকা,
কুপ্রম্, সফর,
- কাশীবার সময় যদি লবণরস
বোধ হয় } কার্বো-বেজিটেবিলিস্, ককিউলস্,
- যদি অম্লরস বোধ হয় { এসিডম্-ফস্ফরিকম্, নক্ল-বমিকা
চায়না, সফর,
- আহারের পর অম্লরস বোধ হইলে { পেসেটিল, নক্ল-বমিকা,
সাইলিশিয়া,
- জল পান করিলে, যদি অম্লরস বোধ হয় নক্ল-বমিকা সফর,
- দুগ্ধ পান করিলে যদি অম্লরস
বোধ হয় } কার্বো-বেজিটেবিলিস্ সফর,
- যদি প্রাতঃকালে অম্লরস বোধ হয় নক্ল-বমিকা সফর,

সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা ।

কটু কিম্বা কষায় রস বোধ হইলে { বেরাট্রম্, রস্-টক্কিকো-
ডেগুন, .

জলবৎ আন্বাদন বোধ হইলে ক্যাকিসেগ্ৰিয়া, চায়না,
তামাকু ভাল না লাগিলে ইগ্লেশিয়া, পমেসটিলা,

যদি এককালীন আন্বাদ শূন্য হয় { ব্রায়োনিয়া, পলসেটিলা,
বেলাডোনা,

এই রোগ প্রাচীন এবং বহুকাল { সাইলিশিয়া, ন্যাট্রম্-মিউরি-
স্থায়ী হইলে এটিকম্, .

এই সকল ঔষধ লক্ষণানুযায়ী ব্যবস্থা পূর্বক পূর্ণ মাত্রায়
প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার সেবন করিবেক ।

মুখে দুর্গন্ধ ।

নিদান—মুখ উত্তমরূপে ধোত না করা, মাতীতে কোন
রোগ থাকা, মুখেতে ঘা থাকা, ও পারার দোষ, বিশেষতঃ এই
রোগটি অজীর্ণ অর্থাৎ পাকস্থলির অস্বাস্থ্য জন্য হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি প্রাতঃকালে মুখে দুর্গন্ধ বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, এক মাত্রা শয়ন কালীন ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা যদ্যপি চারি দিনে আরোগ্য না হয়, তবে
তাহার আট দিন পরে সাইলিশিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে, এক
মাত্রা এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবেক । শেষোক্ত
ঔষধ প্রয়োগের অষ্টাহ পরে যদি আরোগ্য য়োদ্ধ না হয়, তাহা
হইলে ।

ঔষধ—সকফ্, প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া সেবন করিবেক

পূর্বোক্ত তিন ঔষধের দ্বারা যদিও আরোগ্য না হয় তবে সন্ধ্যায় দেওয়ার আট দিন পরে ক্রমেতে পূর্বোক্ত তিন ঔষধ প্রয়োগের নিয়মানুসারে ।

ঔষধ—আণিকা, বেলাডোনা, সন্ধ্যায়, ব্যবহার করিবেক ।

যদিও আহারের পর মুখে দুর্গন্ধ বোধ হয় তাহা হইলে,
ঔষধ—নক্স-বমিকা, ক্যামোমিলা, এবং সন্ধ্যায়, পূর্বোক্ত নিয়মানু-
যায়ী ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করিবেক ।

যদিও এই উপসর্গ রাত্রিতে উপস্থিত হয় তাহা হইলে,
ঔষধ—পেটসটিলা, সন্ধ্যায়, পূর্ণ মাত্রা শয়ন কালে এক এক বার ।

অতিরিক্ত পারা সেবন জন্য যদিও মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্ , প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার এক মাত্রা করিয়া ছয় দিন পর্য্যন্ত, তাহার এক সপ্তাহ পরে ল্যাক্সিস্ , এক মাত্রা করিয়া রাত্রিতে ছয় দিন পর্য্যন্ত, তাহার এক সপ্তাহ অন্তর পুনর্বার ল্যাক্সিসিস , ঐ রূপে ব্যবহার করিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা—যদিও এই রোগ মাটির কোন পীড়া জন্য হয়, তাহা হইলে, যে কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য লবণ ভিন্ন অন্য দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং লঘু ও সহজে পরিপাক-করা যায় এমন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে ।

শিরা যাতনা জন্য পীড়া ।

লক্ষণ—এই যাতনা চক্ষুর নীচে তীব্র জ্বরের সহিত এবং কখন কখন কর্ণের সম্মুখে বোধ হয়, সেই স্থান হইতে মুখ-মণ্ডলের অর্ধেক আক্রমণ করে, গণ্ড দেশের অস্থি সকল, নাসিকা, চোঁয়াল কিম্বা কর্ণের নিকটস্থ অস্থি গণকে যাতনার

সহিত বিদ্ধ করে কিম্বা ঘাড়ের শিরী টানিয়া ধরে এবং উভয় চোয়াল আঁটিয়া ধরে, চক্ষুর পাতা টানে, কিম্বা চক্ষুতে অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, মুখ রক্ত বর্ণ এবং প্রদাহ বিশিষ্ট হয়, যাতনা উপস্থিত হইবার পূর্বে বদনের সেই দিক শুড়্ শুড়্ করে এবং কোন পদার্থ ভিতরে চালিত হইতেছে এমনত বোধ হয় এবং রোগী সেই দিক ক্রমাগত রগড়াইতে থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত দিক শীতল এবং স্তম্ভিত হয় আর কর্ণের নিকটস্থ অস্থিতে যাতনা বোধ, ভিতরে পিপীলিকা গমনের মত বোধ হয়, এবং সন্ধ্যাকালে কিম্বা রিশ্রামের সময়ে যাতনা অধিক হয়, চক্ষুঃ দিয়া অশ্রু পাত হয়, এবং মুখ রক্ত বর্ণ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—গ্ল্যাটিনা, পূর্ববৎ ।

পূর্বোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিয়া যদ্যপি স্তম্ভিত হওয়া এবং শুড়্ শুড়্ করা না থাকে এবং বদনের দক্ষিণ দিক পীড়ায় আক্রান্ত হয় তাহা হইলে,

ঔষধ—লাইকোপোডিয়ম্, দুই মাত্রা করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে সেবন করিবেক ।

যদ্যপি তীর বিদ্ধার ন্যায় যাতনা হয় এবং বদনের বাম দিক মাত্র আক্রমণ করে ও স্পর্শ মাত্রেই যাতনা বৃদ্ধি করে, এবং মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত আক্রমণ করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কলোসিন্থিস্, পূর্ববৎ ।

যদি অগ্নির জ্বালায় ন্যায় যাতনা বোধ হয় এবং চক্ষুর চারি

দিকে ও মস্তকের উভয় পার্শ্বে যাতনা থাকে, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়, পীড়িত স্থান শীতল-স্পর্শ হয়, এবং বাহ্য উত্তাপ দ্বারা কিঞ্চিৎ উপশম হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্ পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি পীড়া নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করে কিঞ্চিৎ স্পর্শ মাত্রেই রোগ বৃদ্ধি হয়, পীড়িত স্থান স্তম্ভিত এবং শক্তি হীন হয়, রোগী অত্যন্ত অনর্থ বাক্য কহে এবং বদন পাণ্ডু বর্ণ ও কখন কখন রক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, যে সময়ে রোগ উপস্থিত থাকেনা সে সময়ে দিবসে তিন বার পূর্ণ মাত্রা সেবন করিবেক ।

যদি এমত অসহ্য যাতনা হয় যে, রোগী জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়, অত্যন্ত দুর্বল এবং মুচ্ছিত পর্য্যন্তও হয়, শয্যায় শয়ন করিলে, বা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়, এবং অঙ্গ চালনা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্ পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা হয়, কিঞ্চিন্নাত্র স্পর্শ দ্বারা বৃদ্ধি হয় এবং মস্তকের মধ্যস্থানহইতে মস্তকের উভয় পার্শ্বে কিম্বা অঙ্গ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এবং অগ্নি দাহের ন্যায় বোধ হয় ও পীড়িত দিক্ চক্চকিয়া ফুস্কুড়ির দ্বারা আবৃত হয় ।

ঔষধ—স্পাইজিলিয়া, পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক ।

যদ্যপি এই পীড়া অজীর্ণ অর্থাৎ পকাশয়ের ভাবান্তর জন্য হয় তাহা হইলে, নক্স-বমিকা, পন্ডেসটিলা, ট্রায়োনিয়ার, মধ্যে যেকোন একটা ঔষধ পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর রোগের তরুণাবস্থায় ব্যবহার করিবেক এবং রোগের প্রাচীनावস্থায় প্রাতঃ-

কালে এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার দিবে, আরও এতাদৃশ লক্ষণে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, ইপিক্যাকুয়ানা, এবং লাইকোপোডিয়াম্ ও ঐ মতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ঐ রোগ ক্রমি জন্য হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, সিনা, পূর্ববৎ ।

এই উভয় ঔষধের অন্যতর একটি পূর্ণমাত্রায় প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিবেক ।

যদ্যপি রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইবার উপক্রম না দেখা যায় তাহা হইলে ।

ঔষধ--ফেরম্, সলফর, স্ক্যানম্, পূর্ববৎ ।

ঐ রোগ গর্ভ রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পলেসটিলা, বা প্ল্যাটিনা অর্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর তরুণাবস্থায়, এবং পরেতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া সেবন করিবে । চায়না, ইগুেশিয়া, এবং বেলাডোনা, ও এই প্রকার রোগে পূর্বোক্ত মতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ঐ রোগ গ্রন্থি বাতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, রস্-টক্কিকোডেন্ড্রন্, কলোসিস্টিস্, বা কটিকম্, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ রোগের তরুণাবস্থায় ছয় ঘণ্টা অন্তর পূর্ণ মাত্রায় এক এক বার এবং পরেতে বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

ঐ রোগ যদি অতিরিক্ত পারা ব্যবহার জন্য হইয়া থাকে, এবং কএসের দাঁতে নিয়ত দপ্ দপ্ করে ও অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, আহার করিলে, বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি বোধ হয়, কপালের শিরা ফুলিয়া উঠে ও রাত্রিতে অস্থিরতা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া সেবন করিবেক ।

উক্ত কারণে এই রোগ উৎপন্ন হইলে যদ্যপি দাঁত চাপিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় ও শয্যাতে কি উষ্ণ গৃহে গমন করিতে যাতনা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার, পূর্ববৎ ।

মুখের অস্থিতে, চোয়ালে, এবং সমস্ত দন্তে দপ্ দপ্ করা, টানিয়া ধরা বা দন্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ এবং ফোলা দেখায়, কর্ণে এবং কর্ণের পশ্চাত্তাগে কামড়ায়, রাত্রিতে অনিদ্রা, প্রাতঃকালে ঢুলানি, শীতল জলে, বা শীতল দ্রব্য প্রয়োগে, যাতনা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সফর, তরুণকালে পূর্ববৎ, এবং প্রাচীনাবস্থায়, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে, এক এক বার করিয়া সেবন করিবে ।

এই রোগে যদ্যপি পারা দ্বারা দন্ত শূল এবং মাটী ফুলিয়া থাকে, ও অতি উষ্ণ কি শীতল কি লবণ দ্রব্য মুখে দিলে বদনের অস্থিতে দপ্ দপ্ করা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি বাহ্য আঘাত জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, জ্বর লক্ষণ, অস্থিরতা, ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা জ্বর লক্ষণের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, যদি আঘাত, ছোঁচা ঘা কিম্বা কাটা, বা মাংস উড়িয়া যাওয়ার ন্যায় হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার চারি দিবস পর্য্যন্ত, তাহার চারি দিবস পরে যদি আবশ্যক হয় পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবে ।

পথ্যব্যবস্থা—যখন বাহ্যিক প্রদাহ প্রবল থাকে তৎকালে জ্বর কালীন বিহিত পথ্য বিধির অনুগামী হইবে । কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বা শোণিত উত্তেজক বা গরম মসলা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবেক না, যখন এই পীড়া দুর্বল শরীরে উপস্থিত হয় তৎকালে রোগীর বল রক্ষার নিমিত্ত সহজে পরিপাক হয় এবং বলকারক যে দ্রব্য তাহা পথ্য দেওয়া বিধেয় এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত স্থানে শীতল জল অথবা বরফ প্রয়োগ করিলে আরাম বোধ হয়, এবং কোন কোন অবস্থায় উষ্ণ জলে বস্ত্র ভিজাইয়া পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে যাতনার লাঘব হয়, উপরে তুলি দ্বারা ক্লোরোফরম্ লাগাইলে উপশম হইবে ।

ঘাড়ের বেদনা অর্থাৎ ফিক্ ।

এই বেদনা বাত হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঘাড়ের মাংস-পেশী সকলকে অত্যন্ত যাতনা বিশিষ্ট করে, ইহা প্রায় অত্যন্ত বায়ুতে ঘাড় অনারুত থাকিয়া বায়ু প্রবেশ জন্য এবং হঠাৎ ঘাড় ফিরাইতে উৎপন্ন হয় ।

ঔষধ—একোনাইট্, পরেতে বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা উপর্যুপরি সেবন করাইলে আরোগ্য হইবে ।

যদ্যপি ইহাতেও আরোগ্য না হয়, ককিউলস্, কিয়া ব্রায়োনিয়া, উক্ত রূপে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবহার করিবেক ।

গলার পীড়া।

লক্ষণ—গলার ভিতর প্রদাহ, গিলিতে কষ্ট, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত, স্বরের পরিবর্তন, এবং জ্বর লক্ষিত হয়, এই রোগের প্রথমাবস্থায় গলা চাপিয়া ধরা, ও গলায় ঘা থাকার ন্যায় বোধ হয়, এবং কখন কখন ঢোক গিলিতে বাধা হয়, যদিও ইহার আশু প্রতীকার করা না হয়, তবে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, গলার ভিতরে এবং জিহ্বার গুঠলি দ্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রা বর্ণ ফুসুড়ি হয়। রোগীর পিপাসা বৃদ্ধি, ও নাড়ী উন্নতা, কঠিনা এবং দ্রুতগামিনী হয়, কখন গণ্ডদেশ এবং চক্ষুঃ ও ফুলে, এই রোগের যদিও শীঘ্র দমন করা না হয় তাহা হইলে গলায় ঘা হইয়া পুঁজ নির্গত হয় তখন যাতনার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়। এই পীড়া যখন পচা ভাব ধারণ করে তখন ভয়ানক হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।

যখন জ্বর বিদ্যমান থাকে, পিপাসা, উষ্ণতা, ও পীড়িত স্থান রক্ত বর্ণ হয়, গিলিতে কষ্ট বোধ, কথা কহিতে যাতনার বৃদ্ধি হয় তৎকালে।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদিও গিলিবার সময় অতিশয় যাতনা বোধ হয় এবং সেই যাতনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, গলা চাপিয়া ধরে, পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয়, গলা শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, কিন্তু পানীয় জন্মের ভয় থাকে, আর পানীয় পান করিলে নাসিকার

দ্বার দিয়া নির্গত হয়, গলার ভিতর পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ শ্বেত বর্ণ
শ্লেষ্মা জড়িত থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জিহ্বার নিম্নের গুঠলিতে এবং গলাতে গিলিবার
সময় অত্যন্ত যাতনা বোধ হয় এবং কণের সন্মুখের গুঠলি
পর্যন্ত সেই যাতনার বিস্তার হয়, গলা জ্বালা করে, গলাতে কঠিন
শ্লেষ্মা একত্রিত হয়, ঘাড়ের মাংসপেশী এবং গুঠলী ফুলে পুনঃ
পুনঃ মাটি ফুলে, মুখ লালাতে পরিপূর্ণ হয় এই সকল যাতনা
রাত্রিতে, ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয় ও রাত্রিতে ঘর্ষ হয়, তৎপক্ষে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্ধ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর অথবা বেলাডো-
নার সহিত উপর্যুপরি ভাবে দিবেক ।

যদ্যপি সমুদয় লক্ষণ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে, কিম্বা
গলার বহির্ভাগে চাপিলে বৃদ্ধি হয় এবং পূর্বের উপরোক্ত
ঔষধ দ্বারা কিঞ্চিৎ লাঘব বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাকসিস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জিহ্বার নীচের গুঠলিতে শ্বেত বর্ণ কুক্ষুড়ি উঠে
এবং গলার ভিতর অত্যন্ত জ্বালা ও কাঁটা বিস্তার ন্যায় যাতনা
থাকে ও অতিরিক্ত পিপাসা হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস পূর্ববৎ ।

যদি গলার বাহিরে ঘা থাকে এবং শেষোক্ত ঔষধ প্রয়োগ
করায় উপশম বোধ না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—এসডম্ নাইট্রিকম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ পাকস্থলির বিকার জন্ম ঘটয়া থাকে
এবং গলার ভিতর ছড়িয়া যাওয়া ও ঢোক গিলিতে গলার

উপরিভাগ চাপিয়া ধরা বোধ হয় এবং আল্-জিহ্বা কুলে, শুষ্ক কাশী থাকে প্রাতঃকালে মাথা ধরে ও পঞ্জরের নিম্ন ভাগে কাশীবীর সময় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

গলার ভিতর এবং জিহ্বার নীচের গুঠলি ঘোরাল লাল বর্ণ এবং সেই সেই স্থান অত্যন্ত ফুলা বোধ হয়, গলা শুষ্ক অথচ পিপাসা থাকে না, গিলবার সময় ভিন্ন ও গলাতে অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, সন্ধ্যাকালে যাতনা বৃদ্ধির সহিত কম্প হয় এবং শ্লেষ্মা গলায় জড়াইয়া থাকে ।

ঔষধ—পচেসটিলা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ জ্বীলোকের বা শিশুর হয়, এবং তরল ভিন্ন কোন প্রকার আহাৰ্য্য দ্রব্য গিলিতে কষ্ট বোধ হয়, মুখ এবং গলা জ্বালা করে, গলা শুড়্ শুড়্ করে, স্বর ভঙ্গ থাকে, সন্ধ্যাকালে জ্বর বোধ হয়, মুখ বিশেষতঃ এক দিকের গণ্ড রক্ত বর্ণ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ ।

সর্বদা গলার ভিতর শিপি দেওয়ার ন্যায় বোধ হয়, তালু এবং জিহ্বামূলের গুঠলি ফুলিয়া থাকে, গলার ভিতর কোন বাধা দায়ক পদার্থ থাকার ন্যায় বোধ হয়, কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা জলীয় দ্রব্য গিলিতে কষ্ট বোধ হয় ।

ঔষধ—ইগ্নেশিয়া, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি বর্ষা বা অন্য কোন প্রকার শীতল সময় উপস্থিত হওয়াতে এই রোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, এক এক মাত্রা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে ।

যদ্যপি আল্-জিহ্বা বৃদ্ধি হইয়া শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত বোধ

হয়, পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয়, এবং অনিদ্রা, অত্যন্ত অস্থিরতা, রোদন করিতে ইচ্ছা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ববৎ ।

যদি পাকস্থলির বিকৃতি থাকে, জিহ্বা মলিন, হরিদ্রাক্ত পদার্থের দ্বারা আবৃত হয়, কোষ্ঠ বদ্ধ এবং কপালে, মাথা ধরা বোধ হয়, অনিদ্রা, গ্লা শুষ্ক, তালু রক্ত বর্ণ থাকে, গলায় ছড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হয়, মস্তক লাড়িতে অথবা গলার উপরে চাপন দিলে স্ফীতিবিকার ন্যায় বোধ হয়, একং কাশীলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদি উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় এবং সন্ধ্যাকালে অতিরিক্ত জ্বর বোধ হয়, গলার নীচে যাতনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-টক্কিকোডেন্ড্রিন্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি খাদ্য দ্রব্য, অম্ল, লবণ, বা ঝাল বোধ হয়, এবং গিলিবার সময়ে কোঁৎ কোঁৎ করিয়া শব্দ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ককিউসস্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

গলার ভিতর পাকা ।

গলার ভিতর ফুলিলে চিকিৎসিত না হইয়া যদ্যপি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া স্ফোটকের ন্যায় হয় ও যাতনাতে হাঁ করাও দুঃসাধ্য বোধ হয় মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এবং রোগীকে দুর্বল করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আমোনিয়াম্, অর্ধ মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায় এক এক বার করিয়া দিবেক ।

ফোড়া শীঘ্র পাকাইতে আবশ্যক হইলে ।

ঔষধ—হেপার, অর্ক্ণ মাত্রা দুই ঘণ্টা। অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধ অপেক্ষা শীঘ্র পাকাইরা কাটাইবার নিমিত্তে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, পূর্ববৎ ।

ফোড়া ফাটিলে ছয় ঘণ্টা পরে ক্ষত শুখাইবার নিমিত্তে,

ঔষধ—মার্ক উরিয়স্, সলফর্, অথবা হেপার, দ্বিগুণ মাত্রা প্রত্যহ
প্রাতঃকালে এক এক বার ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

জ্বর বিদ্যমান থাকি কালীন জ্বরের পথ্যানুসারে পথ্য
করিবেক, পরেতে সহজে পরিপাক হয় অথচ কোন প্রকার উগ্র
মসলাদির দ্বারা প্রস্তুত না হয়, এমত দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক
রোগী কোন প্রকার তীব্র দ্রব্য মিশ্রিত জল দ্বারা কুল্কুচা
করিবেনা প্রথম ফুলার সময়ে এক খানি ক্রমাল বা বস্ত্র খণ্ড
শীতল জলে ভিজাইয়া গলার উপরে লগ্ন করিয়া দিবে তাহার
উপর (ফ্ল্যানেল) বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া দিবে এবং তাহা যত বার
গরম হইবে ততবার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিয়া দিবে ।

ফোড়া পাকাইবার নিমিত্ত গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া রাখা
এবং গলার বাহিরে মশিনার পোল্টিস্ দেওয়া উপকারী হয় ।

ক্ষত বিশিষ্ট গলার বেদনা ।

এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক এবং আর্দ্র ও গ্রীষ্ম সময়ে
উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহাতে প্রথমতঃ শীত বোধ, কম্প, পরে

উষ্ণতা, দুর্বলতা, বমন, কখন কখন বিরেচনের সহিত বিদ্যমান থাকে, চক্ষুঃ প্রদাহ বিশিষ্ট ও জল পূর্ণ, গণ্ড দেশ রক্ত বর্ণ, নাসিকা ফুলিয়া পাতলা, কটু জল স্রাব হয়, নাড়ী অস্পষ্ট কিম্বা অতিদুর্বল এবং অসমান গতিবিশিষ্ট হয়, এবং যখন বাহ্য লক্ষণ অতি সামান্য থাকে তখন বিপদ জনক হয়, এবং বাহ্য লক্ষণ অতি তীব্র হইলেও যদি ছয়, সাত দিবস পরে ঘর্ম হয় তখন ক্রমশঃই আরোগ্য চিহ্ন উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।

যখন জ্বর অত্যন্ত প্রবল থাকে তাহার হ্রাস করিবার নিমিত্তে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

একোনাইট্, চারি মাত্রা প্রয়োগের পর যদি গলা শুষ্ক, গিলিতে বাধাজনক বোধ হয় এবং গলা ফোলা ও রক্ত বর্ণ দেখায় ।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্দ্ধ মাত্রা পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে ।

পূর্বেোক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর যদি গলা ভিজা বোধ হয়, ও শ্লেষ্মা উপস্থিত হয়, এবং রোগী পিত্ত বমন করে, তাহাইলে

ঔষধ—পেসেটিলা, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদি অতিরিক্ত শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং তাহাতে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ ।

গলার ভিতরে ছোট ছোট ঘা ক্ষত হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ণ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

উক্ত ঔষধ চারি বার প্রয়োগের পর, যদি আরোগ্য বোধ না হয়, তাহা হইলে শেষ মাত্রার চারি ঘণ্টা পরে ।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায়, বমন করে, এবং খা উজ্জ্বল দেখায়, বা মলিন হয়, দন্ত এবং জিহ্বা দিয়া কটাশিয়া বর্ণদ্রব্য নির্গত হয়, নাড়ী অসমান, ও নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, চর্ম উষ্ণ, অত্যন্ত পিপাসা, অথচ রোগী একবারে অধিক জল পান করিতে পারেনা, ও গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধ মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায় এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি অত্যন্ত ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ ঋপ মাত্রা ১০ । ১৫ । ২০ । মিনিট্ অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি বাহিরে কিঞ্চিৎ চাপিলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, এবং ঘাড় বিবর্ণ ও অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, আর ঘায়ের চামড়া উঠিয়া যায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস্, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর, অথবা (আর্সেনিকমের) সহিত উপর্যুপরি রূপে দিবেক ।

যদ্যপি ঘা গলিতে আরম্ভ হয় এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে ও দুর্বল কারক ঘর্ষ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের ছয় ঘণ্টা পরে অর্দ্ধ মাত্রা পরিমাণে চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

এই রোগী অন্য অতিসার নিবারিত হওয়ার পর যদি মুখে এবং গলাতে ছোট ছোট ঘা দেখা যায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—টরুল-বনিকা, পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ছয় ঘণ্টা পরে যদি জলবৎ
দুর্গন্ধ পুঁজ অতিরিক্ত পরিমাণে ঘা দিয়া নির্গত হয়, এবং রোগী
এমত দুর্বল হয় যে নাড়ী বোধ হওয়া দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, অর্দ্ধ মাত্র। প্রত্যেক ঘণ্টায় দিবেক।

যখন এই রোগের সহিত অতিসার বিদ্যমান থাকে তখন;

ঔষধ—সিকেল্, পূর্ণমাত্রা, প্রত্যেক ঘণ্টায় দুই বার করিয়া

দিবেক

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ ব্যবহারের পর রোগী ক্রিষ্ণিৎ
বলাধান হয় এবং ঘায়ের চর্ম পরিষ্কৃত হইয়া যায় অথচ শীঘ্র
শুখাইবার উপক্রম দেখা না যায় তাহা হইলে।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্, পূর্ণমাত্রা দিবসে তিন বার করিয়া

দিবেক।

উক্ত প্রকার অবস্থাতে থাকিয়া যদ্যপি মন্দ ধাতু বিশিষ্ট
রোগী হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফর, পূর্ণবৎ।

অপিচ পূর্বোক্ত উভয় ঔষধ অপেক্ষা, এসিডম্-সলফুরিকম্
এবং সিপিয়া, উক্ত ব্যবস্থা মতে অধিক উপকারক।

পথ্য ব্যবস্থা।

সাপ্তাহ্যনা, যব, তণ্ডুলের মণ্ড মাত্র দেওয়া উচিত কিন্তু যদি
রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে তাহাকে মাংসের ক্বাথ প্রভৃতি
বল কারক দ্রব্য দিবেক, রোগীকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছদে
এবং পরিষ্কৃত স্থানে রাখিবে।

স্বর ভঙ্গ ।

বায়ু-প্রবাহ-প্রণালীতে কোন প্রকার রোগ জন্য এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে ইহা প্রায় সামান্য কফ জন্য শ্লেষ্মা-বাহক-সূক্ষ্ম-ব্রক আশ্রয় করে, তজ্জন্য এই রোগ শ্লেষ্মার সহিত সম্বন্ধ রাখে ।

টিকিংস ।

যদ্যপি ঘন পীত বর্ণ বা তরল শ্লেষ্মা, নাসিকা ও মুখ হইতে নির্গত হয় এবং সম্পূর্ণ স্বর বসিয়া যায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেনেসিলা, পূর্ণমাত্রা স্বায়ং এবং প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ সেবন করিবেক ।

তাহাতে যদি আরোগ্য না হয় অথবা যদি কিঞ্চৎ উপশম হয়, নাসিকা দ্বারা জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয়, এবং গলার ভিতর শুড়্ শুড়্ বা জ্বালা করে এবং রাত্রিতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মকিউরিয়স্, অর্দ্ধ মাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি শুষ্ক কাশী থাকে এবং নাসিকা সুখাইয়া বন্ধ থাকে ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে, এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি বক্ষঃস্থলের ভিতর চিন্ চিন্ করে নিঃস্বাস ফেলিতে কষ্ট, পুনঃ পুনঃ অতিশয় হাঁচি হয় মস্তকে শ্লেষ্মা বোধ না থাকে কিন্তু নাসিকা দ্বারা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-টক্সিকোডেণ্ড্রন, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি গলায় শ্লেষ্মা একত্রিত হয়, রাত্রি এবং স্বায়ংকালে কাশী বৃদ্ধি ও সন্ধ্যাকালে জ্বর বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ণ মাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে তিন দিবস পর্য্যন্ত দিবেক । এই ঔষধ শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

অতি বৃহৎ গভীর স্বর হইলে ।

ঔষধ—ড্রোসেরা, পূর্ববৎ (যে পর্য্যন্ত লক্ষণের অন্তর না হয়)

যদি ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে এবং স্বর ভঙ্গের সহিত গলার ঘড়্ ঘড়ানি থাকে বা যদি শীঘ্র আরোগ্য হইবার উপক্রম বোধ না হয় ও স্বর প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, বিশেষতঃ শীত বা বর্ষা কালে এই রোগ উপস্থিত হইলে ।

ঔষধ—সলফর্, পূর্ণমাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে দুই দিবস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া এক দিবস পরে পুনর্বার ঐ রূপে ব্যবহার করিবেক ।

প্রাচীন স্বর ভঙ্গ ।

যদ্যপি স্বর ভঙ্গ বহু দিবসের হয় এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ও কথা কহিতে বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ণমাত্রা স্বায়ং ও প্রাতঃকালে এক এক বার দিবেক ।

যে রোগী অতিরিক্ত পরিমাণে পান্না সেবন করিয়াছে তাহার পক্ষে,

ঔষধ—হেপার্, ঐরূপ ।

এতৎসময়ে অন্য ঔষধ কষ্টিকম্, ক্যালেকেরিয়া, ল্যাক্সিস্ উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা—কোন প্রকার মাদক দ্রব্য, বা রক্ত উষ্ণ কারক দ্রব্য, ব্যবহার করিবেক না। দুগ্ধ, ও কাঁচা ঘৃত এবং দধি ইত্যাদিও বর্জন করিবে, বিশেষতঃ রাত্রিকালের বায়ু এবং হঠাৎ শীত হইতে গ্রীষ্ম বা গ্রীষ্ম হইতে শীতে প্রবেশ করা, ও চীৎকার করিয়া কথা বলা এবং চরণ আর্দ্র রাখা কর্তব্য নহে, গলাকে অগ্নি বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিবেক, যাহারা দাড়ি না কামায় তাহাদের প্রায় এরোগ হয় না।

কফ রোগ ।

এই রোগ সাধারণ লোকে বিজ্ঞাত আছেন অতএব ইহার বিশেষ লক্ষণ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

চিকিৎসা ।

এই রোগ প্রথমে উপস্থিত হইলে যদ্যপি তাহার সহিত কল্মা এবং মাথাধরা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কর্পূরের আরক, এক কোটা অঙ্ক তোলা চিনির মধ্যে দিয়া দশ মিনিট্ অন্তর এক এক বার সেবন করিবেক। এইরূপ তিন বারের পর এক ঘণ্টায় দুই বার এবং পরেতে চারি ঘণ্টার মধ্যে দুই বার সেবন করিবেক ।

যদি নাসিকার অন্তরস্থ, স্নায়ু-চর্ম ফোলে এবং তাহার মধ্যে উষ্ণতা এবং যাতনা বোধ হয় ও জ্বর বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অঙ্ক মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি রাত্রিতে নাসিকা শুষ্ক বোধ হয় এবং মাথা ভার ও সন্ধ্যাকালে মুখে উষ্ণ বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ ।

যদি রাত্রিতে নাক বন্ধ হইয়া নিদ্রাকালে মুখ দিয়া বায়ু সঞ্চালন জন্য শুষ্ক হইয়া পিপাসা হয় এবং কপালে জ্বালা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—লাইকোপোডিয়াম্, পূর্ববৎ । এই ঔষধ, সকল প্রকার কফেতেই উপকার জনক হয় ।

যদ্যপি এই রোগ দৈনিক দোষ জন্য হয় এবং নাসিকা দিয়া অতিরিক্ত শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া নাসিকা ফোলে, কিম্বা রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্ অর্জমাত্রা স্বায়ং এবং প্রাতঃকালে চারি দিবস পর্য্যন্ত ।

যখন নাসিকা দ্বার মাত্র কেবল আক্রান্ত হয়, এবং কিঞ্চিৎ চালিত হইলে মাথা ধরা বৃদ্ধি হয় কিম্বা প্রাপ্তোক্ত ঔষধে কিয়দংশ উপকার করে বা না করে, তখন উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ছয় ঘণ্টা পরে ।

ঔষধ—হেপার্, পূর্ণমাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবে ।

যদ্যপি নাসিকা দিয়া অতিরিক্ত স্রাব হয়, চক্ষুর পাতা এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, ও তদ্বারা অতিরিক্ত কটু জল স্রাব হয়, মস্তকে বিকৃতি বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইউক্লেসিয়া, পূর্ববৎ কিন্তু প্রাপ্তোক্ত ঔষধের ছয় ঘণ্টা পরে ।

যদ্যপি মাথা ধরা হ্রাস না হয় মস্তক ও চক্ষুতে উষ্ণতা বোধ হয়, ত্রাণেল্লিয়ার অল্পতা বা আধিক্যতা হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্জ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর

যদি এক দিনান্তর নাসিকা বন্ধ হয় এবং অতি-প্রবাহিত বায়ু জন্য এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্, পূর্ণ মাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃ-কালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

নাসিকা এবং নাসিকারন্ধ্র অত্যন্ত ফোলে, অতিরিক্ত জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয়, ও স্রাৱের অস্পতা হয় তৎ পক্ষে।

ঔষধ—ক্যাল্কি-বাইক্লোম্যাস্, পূর্ববৎ।

যদি নাক বন্ধ থাকে এবং জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং অগ্নির উত্তাপে যাতনার ক্রাস হয় পশ্চাত্তাগে বেদনা বোধ ও অত্যন্ত দুর্বলতা থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—আসেনিকম্, ইপিক্যাকুয়ানা, ডল্কেমেরা, ক্রমান্বয়ে অর্দ্ধ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক।

যদ্যপি গাঢ়, দুর্গন্ধ, সবুজ, হরিদ্রাক্ত, থানা থানা রক্তের সহিত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, আশ্বাদন এবং স্রাৱ বোধের অভাব, মাথা ধরা, হাঁচি, সন্ধ্যার সময়ে শীত বুদ্ধি, ও চক্ষুঃ দিয়া জল স্রাব হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—পেসেটীলা, প্রাতঃ এবং স্বায়ংকালে পূর্ণমাত্রা সেবন করিবেক।

বাহাদের পুনঃ পুনঃ কফরোগ উপস্থিত হয় তাহাদের পক্ষে।

ঔষধ—গ্র্যাফাইটিস্, ও সলফর্, উক্ত মতে ব্যবহার করিবেক।

মস্তকে কফ বদ্ধ হইলে মাথাধরা।

যদ্যপি মাথাধরা মস্তকের কফ বদ্ধ জন্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্, পেসেটীলা, এবং চায়না, প্রথমোক্ত ঔষধ অর্দ্ধ মাত্রায় ছয় ঘণ্টা অন্তর দুই বার দিয়া যদ্যপি কিছু উপশম না হয়

তাহার তিন ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঔষধ ঐরূপে ব্যবহার করিবে, তাহাতেও উপশম না হইলে শেষোক্ত ঔষধ ঐরূপে চারি দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবেক ।

নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ।

যদ্যপি মস্তকে কফ বদ্ধ জন্য নিঃশ্বাস প্রস্থাসে কষ্ট বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, ব্রায়োনিয়া, এবং সফর ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ঔষধ পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক, এইরূপে তিন মাত্রা শেষ হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে যদি আরোগ্য বোধ না হয়, আর দুই ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঔষধ ঐরূপে ব্যবহার করিবেক । তাহার দ্বিতীয় মাত্রার দুই ঘণ্টা মধ্যে উপশম বোধ না হইলে, তৃতীয় ঔষধ পূর্ববৎ তিন দিবস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবেক ।

মস্তকে কফ বদ্ধ থাকে ।

যাহার কফ হইলেই মস্তকে প্রায় বদ্ধ হয় তাহার পক্ষে এবং শিশুর দাঁত উঠার সময়ে মস্তকে কফ বদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস প্রস্থাসের কষ্ট বোধ হয় তৎ পক্ষে, আরও সামান্যতঃ সময়ের পরিবর্তন মাত্রে যাহার খাতুতে এই রোগ উপস্থিত হয় তাহার পক্ষে,

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, অর্জ মাত্রা শয়ন কালীন দুই দিবস যাবৎ সেবনান্তে চারি দিন পরে অবস্থা বিবেচনায় পুনর্বার ঐরূপে ব্যবহার করিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে উপশম বোধ না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, ঐরূপে ব্যবহার করিবেক ।

যদ্যপি এই প্রকার খাতু পাকস্থলির বিকৃতি জন্য হয়,
এবং রোগী নম্র ও মুছ স্বভাব বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে,

ঔষধ—পেসেটিল, প্রত্যহ পূর্ণ মাত্রা। শয়ন কালীন এক এক বার
দিবেক।

এতদ্ভিন্ন নিয়ত উক্ত নিয়ম মতে সল্ফুর্, সেবন করিলে
আরোগ্য হইবে।

পথ্য ব্যবস্থা—দুগ্ধ, ঘৃত, বা গরম ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি এক
কালীন বর্জন করিবে এবং পাকস্থলিকে ভারায়িত না করে
এমত লঘু পাক দ্রব্য ভোজন করিবে, হঠাৎ সময়ের পরিবর্তন
সময়ে বা শোঁতা অথবা প্রবল প্রবাহিত বায়ু মধ্যে বিচরণ
করিবে না, আর বায়ুর গমনাগমন পথ অবরুদ্ধ থাকে এমত
কুঠরিতে বাস করিবে না।

কাশ রোগ।

লক্ষণ—এই রোগে জ্বরের সহিত বা তদ্ব্যতিরেকে কাশ
বিদ্যমান থাকে, শ্লেষ্মা উৎপিত হয়, অথবা শুষ্ক কাশী হইয়া
থাকে। এই রোগ যদ্যপিও প্রথমতঃ বিশেষ অপকার-জনক
হয় না, কিন্তু ক্রমশঃ এতদ্বারা যন্ত্রণা উৎপন্ন হইতে পারে।

নিদান—শারীরিক বায়ু-প্রবাহক-প্রণালী মধ্যে অথবা
ফুস্-ফুস্ যন্ত্রের রোগ জন্য, কিম্বা সামান্য কফ ইত্যাদি হইতে
উদ্ভূত হয়।

সামান্য কাশীর চিকিৎসা ।

অত্যন্ত কাশী যদিও অল্প লক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে এবং প্রাশ্বাস টানিবার সময় কিম্বা কাশীর সময় বক্ষঃস্থলের ভিতর যাতনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

আর্দ্র শ্লেষ্মা উঠা, এবং কিঞ্চিৎ হিম লাগিলে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উঠা, অথবা নিঃশ্বাস প্রস্থাসের প্রণালীতে শ্লেষ্মা আগত হওয়া, স্বর ভঙ্গ এবং কখন কখন উজ্জ্বল রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা রাত্রিকালে উঠা, দীর্ঘশ্বাস টানিলে ঘৎ ঘৎ করিয়া কাশী হওয়ার পক্ষে ।

ঔষধ—ডল্ফেমেরা, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

রাত্রি কালে অল্প শুষ্ক কাশী এবং শরীর অল্প চালিত হইলে কাশী বৃদ্ধি হয়, দিবারাত্রি শুষ্ক কাশী হয়, গলার ভিতর শুড়্ শুড়্ করে, এবং সাদা গাঢ় শ্লেষ্মা উঠে, পেটে অত্যন্ত যাতনা হয়, স্বর ভঙ্গ হয়, মাথা ধরা থাকে, কাশীর পর হাঁচি হয়, এবং ঝাড়ের দুই দিকে বেদনা বোধ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্দ্ধ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর, ঐ রূপ চারি মাত্রা দেওয়ার পর কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে ।

যদ্যপি উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া রাত্রিতে শয়ন কালীন বৃদ্ধি বোধ হয় এবং বসিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ উপশম হয়, ও গলা শ্লেষ্মা জন্য ঘড়্ ঘড়্ করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়ো-সায়েরমস্, ঐ রূপ ।

যদ্যপি গলার ভিতর খুলা কিম্বা পাখা থাকার ন্যায় বোধ হইয়া অল্প বা গাঢ় কাশী হয়, মস্তকে শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকে

রাত্রিতে শয়ন কালীন, বা আহারের পর, বা প্রাতঃকালে
বৃদ্ধি বোধ হয়, এবং রোগী যদি কোমল স্বভাবাধিত হয়
তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেসিয়া, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ দিবসে তিন বার করিয়া
দিবেক ।

যদ্যপি শুষ্ক কাশী, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, এবং উক্ত ঔষধে
আরোগ্য না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কোনিয়ম্, পূর্ণ মাত্রা পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে দিবেক ।

যদ্যপি শ্লেষ্মা জন্য শুষ্ক, স্বর ভঙ্গ বিশিষ্ট কফ হইয়া
প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়, কিম্বা দিবসে উপস্থিত
হইয়া রাত্রিতে অগ্নি হয়, মুখ শুষ্ক এবং উষ্ণ বোধ হয়, কিঞ্চিৎ
শ্লেষ্মা অতি কষ্টে উঠে, গলা শুড়্ শুড়্ করে, এবং বিশেষতঃ
স্বর ভঙ্গ হয়, ও পাকস্থলির নীচে অর্থাৎ বাম পঞ্জরের নিম্ন
ভাগে বেদনা বোধ হয়, আহারের পর, ও পুস্তকাদি পাঠ
করিতে কিম্বা অনুধাবন করিবার সময় বৃদ্ধি হয়, এবং কখন
কখন বমন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর (উপশম হওয়া
কাল পর্য্যন্ত)

অতিশয় কম্পাধিত শ্লেষ্মা জন্য কাশী, সন্ধ্যার প্রাক্কালে
এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, এবং কাশিতে কাশিতে বমি হয়, গন্ধ-
কের ধূমার ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করে, প্রথমে শুষ্ক
থাকিয়া পরেতে, কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণ, ঈষৎ স্বেত বর্ণ শ্লেষ্মা উঠে
এবং তাহাতে লবণ কিম্বা তিক্ত আত্মদান বোধ হয়, কিম্বা
শ্লেষ্মার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, বক্ষঃস্থলের ভিতর শ্লেষ্মা জন্য
সাঁই সাঁই বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, কাশী উপস্থিত হইবার সময়

আঘাত লাগার ন্যায় উদরে যাতনা বোধ হয়, কাশিতে কাশিতে আপনিই প্রস্রাব হইয়া যায়, তৎপক্ষে ।

ঔষধ—পলেসটিলা, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

শুষ্ক কাশী কথা কহিতে বৃদ্ধি হয়, রাত্রিতে যাতনা দায়ক হয়, কিন্তু দিবসে, ও প্রাতঃকালে, বা সন্ধ্যাকালে, উপস্থিত হয়, শয়ন কালীন কাশী হয়, সময়ে সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে তিক্ত কাশ উঠে, অপিচ যদি বালকের উৎকাশী হইয়া স্বর ভঙ্গ, পিপাসা, গলা শুষ্ক ও সন্ধ্যার সময় অর বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ণ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি কাশী, শীত কালে, বা যখন পূর্ব দিক হইতে বায়ু বহে তজ্জন্য হয় এবং শুষ্ক কাশী, স্বরভঙ্গ হয়, বা না হয়, গলা শুড়্ শুড়্ করে কিঞ্চিৎ আহার বা পান করিলে ও দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে বৃদ্ধি বোধ হয়, বক্ষঃস্থলের ভিতর কণ্টক বিদ্ধের ন্যায় যাতনার সহিত মস্তকের উভয় পার্শ্বে অত্যন্ত মাথাধরা থাকে এবং দিবা রাত্রিতে কিঞ্চিৎ শুভ্র বা হরিদ্রা বর্ণ কাশ উঠে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

শুষ্ক অল্প কাশী, সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে বৃদ্ধি হয়, কাশী হইবার পূর্বে বক্ষঃস্থলের ভিতর শুড়্ শুড়্ করে, স্বরভঙ্গ থাকে, ঘনশ্বাস হয়, প্রাতঃকালে চেতন হইলে কিঞ্চিৎ কাশী ও মুখ তিক্ত হয়, কখন কখন বমন হয়, তলপেট বেদনা করে, উরু দেশে যাতনা বোধ হয়, কাশের

সহিত উজ্জল রক্ত মিশ্রিত থাকে এবং পার্শ্বে বেদনা হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—রস-টুকুসিকোডেন্ড্রন, পূর্ণমাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া দিবেক।

কফ জন্য কাশী, বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কাশিবার সময় মস্তকে এবং পক্কাশয়ে আঘাত বোধ হয়, কাশীর পর বমনেচ্ছা এবং বমিও হয়, শুষ্ক কাশী, কিম্বা অতিরিক্ত গাঢ় কাশী, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধের ন্যায় কষ্ট দায়ক হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

উক্ত ঔষধ শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উক্ত প্রকার লক্ষণ সকলের উক্ত ঔষধের দ্বারা বিক্ষিপ্ত লাঘব হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার নিমিত্ত।

ঔষধ—ক্যাম্ফেরিয়া, পূর্ববৎ।

যদ্যপি কফ জন্য কাশী হয় তাহার সহিত স্বরভঙ্গ, নাসিকা দিয়া জলস্রাব, কিম্বা অতিসার থাকে, অথবা শুষ্ক কাশী, গলায় বা বক্ষঃস্থলে উত্তেজনা হইয়া উদ্ভব হয়, কথা কহিতে বৃদ্ধি বোধ হয়, এবং শিশুর পক্ষে ঐ রূপ হইয়া যদি নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে, বমন হয়, ও মাথাধরা থাকে তাহ হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্ অর্দ্ধমাত্রা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া দিবেক।

শুষ্ক স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কফ, যাতনাতে প্রায় নিঃশ্বাস অবরোধ করে, এবং কাশিতে কাশিতে অবশেষে, চক্ষু দিয়া জল ঝরে, শরীরের কোন স্থান অনাবৃত থাকিলে কাশী আক্রমণ করে,

রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কথা কহিতে বা মস্তক ঘুরাইতে, অথবা শিঁড়ির উপর চড়িতে, কাশী আরম্ভ হয়, এবং স্বরভঙ্গ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার, পূর্ণমাত্রা দিবসে তিন বার করিয়া দিবেক ।

বায়ু-প্রবাহক-প্রণালিতে শ্লেষ্মা জড়িত ও তাহাতে জ্বালা বোধ হয়, সন্ধ্যার সময় অথবা শয়ন করিলে কাশী হয়, এবং গন্ধকের ধূমার ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করে, নাসিকা দিয়া কটু পাতলা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, হাঁচি এবং সামান্যতঃ সর্বক্ষে জ্বালা থাকে তাহা হইলে, এবং শ্লেষ্মার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের এই উপসর্গে গলা হইতে শ্লেষ্মা ছাড়া কঠিন বোধ হইলে কিম্বা ফুস্ ফুস্ স্বল্প শক্তিহীন বোধ হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর দশ মাত্রা দিয়া যদি কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় পরে (এন্টিমোনিয়ম্-টার্টেরিকম্) চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবেক ।

যদি প্রাচীন কাশীর সহিত স্বরভঙ্গ থাকে, গভীর কাশীর সময় পঞ্জরের মধ্যে এবং বক্ষঃস্থলের মধ্যে যাতনা বোধ হয় হাশিলে বৃদ্ধি হয়, তিত্ত শ্লেষ্মা উঠে, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, ভুক্ত দ্রব্য বমন হয়, নাসিকা বা মুখ দিয়া রক্ত পড়ে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ড্রোসেরা, পূর্ণমাত্রা সন্ধ্যার সময় এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবেক ।

শুদ্ধ কাশী দিবারাত্রি সমভাবে কষ্ট দায়ক থাকে, গাঢ় নিঃশ্বাস টানিলে বা আহার করিলে কাশী উঠে, বমন উদ্রেক হয়, আপনি প্রস্রাব হইয়া যায়, উদরে বক্ষঃস্থলে এবং মাজায় বেদনা বোধ হয় কিঞ্চিৎ শ্বেতবর্ণ বা ক্রিমি হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধ

যুক্ত মিষ্ট বা লবণবৎ শ্লেষ্মা উঠে কিঞ্চিৎ অর বোধ থাকে তৎ পক্ষে ।

ঔষধ—সত্কর পূর্ববৎ ।

গলার ভিতর পাখা থাকার ন্যায় শুড়্ শুড়্ করিয়া রাত্রিতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে কাশী উঠে এবং গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ কাশ নির্গত হয় তৎপক্ষে ।

ঔষধ—ক্যাম্বেরিয়া পূর্ববৎ ।

শুদ্ধ কাশী, গলার ভিতর শুড়্ শুড়্ করিয়া, হাসিতে, কথা কহিতে বা পান করিতে উদ্ভূত হয় এবং বক্ষঃস্থলের ভিতর ছড়িয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, স্বরভঙ্গ, অর ও মৃত্যু আশঙ্কা থাকে, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং যক্ষ্মার ন্যায় কাশ উঠে তৎ পক্ষে ।

ঔষধ—ফস্ফরস্ ।

আশু নিবারণের উপায় (মিসুরি বা বাবলার আঠা) মুখে রাখিয়া কাশীর সময় গলা ভিজাইবার নিমিত্তে চুসিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

যদ্যপি কাশীর সহিত অর বা অজীর্ণ রোগ থাকে তাহা হইলে তৎকালে অর কালীন পথ্যের ন্যায় পথ্য দিবে অর লক্ষণের ত্রাস হইলে সহজে পরিপাক হয় এমত দ্রব্য আহার করিবে, কোন উগ্র দ্রব্য, ছক্ক, ঘৃত, মাংসাদি, শাক, অম্ল, মাস-কলাইর দাইল প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেক না, স্নানে বা পানে, কেবল শীতল জল মাত্র ব্যবহার করিবে ।

শিশুর উৎকাশী ।

লক্ষণ—এই রোগ শিশু কালে প্রায় সকলকেই আক্রমণ করে, অনেকের পক্ষে ইহা অস্পেতেই আরোগ্য হয় কিন্তু বহুতর বিষয়ে ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হইয়া মারাত্মক হইয়া উঠে, শিশুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কালীন শাঁই শুঁই শব্দ হইয়া, বুকে শ্লেষ্মা একত্রিত হয়, পরেতে বমি হইয়া কিঞ্চিৎ কাল যাতনার লাঘব হয়।

প্রথম অবস্থার চিকিৎসা ।

যখন বালকের জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তৎকালে ।

ঔষধ—একোনাইট, দুইটা করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিয়া জ্বর লক্ষণের লাঘব হইলে ।

যদি তরল শ্লেষ্মা সহজে উঠে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, তিনটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে ছয় ঘণ্টা অন্তর এবং অতি শিশু হইলে এক একটি বটিকা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি সরল কাশী, অশ্রুপাত, চক্ষুর দুর্বলতা, হাঁচি, কিঞ্চিৎ স্বরভঙ্গ, বমন উদ্বেক, এবং রাত্রিতে অতিসার থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল্লেসটিলা, পূর্বদং ।

যদি শুষ্ক কাশী রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, আর যদি বালকের গলরোগ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, তিনটি ক্ষুদ্র বটিকা চারি ঘণ্টা অন্তর এবং অতি শিশুর প্রতি একটি ক্ষুদ্র বটিকা ঐ রূপ ।

ঐ রূপ. লক্ষণাক্রান্ত হইয়া অতি তরল কাশী থাকে এবং

রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় তৎ পক্ষে ।

ঔষধ—হেপার, পূর্ণমাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া ।

যদি কাশীর সহিত বমন হয় এবং অর্দ্ধ রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কাশী হয়, রোগীর মুখ নীলবর্ণ হয় এবং মুখ ও নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি শেবোক্ত লক্ষণ অর্থাৎ রক্ত পড়া অধিক হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধের ন্যায় হইয়া অত্যন্ত যাতনা বোধ হয় এবং রোগীর মুখ নীলবর্ণ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা পূর্ববৎ ।

দ্বিতীয় অবস্থার চিকিৎসা ।

যখন বালক অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় এবং কপালে শীতল ঘর্ষ হয়, অত্যন্ত পিপাসা, আপনিই প্রস্রাব হওয়া, বমন, কিঞ্চিৎ অর, নাড়ী ক্ষীণা, দুর্বলা, এবং দ্রুতগতি বিশিষ্ট থাকে তৎকালে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্ দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা প্রত্যেক বার কাশীর আক্রমণ হইবার পর, দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যখন পূর্বোক্ত ঔষধ দিয়া অন্যান্য উপসর্গ নিবারিত হইয়া কেবল বমনোদ্বেক মাত্র থাকে ।

ঔষধ—কার্বো-বেনজিটেবিলিস্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি কাশী ও বমন, অত্যন্ত যাতনা দায়ক হয় এবং পূর্বোক্ত ঔষধ দিয়া নিবারিত না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কোনিয়ম্ অর্দ্ধমাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

প্রত্যেক বার আক্রমণের পর রোগী জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়, বক্ষঃস্থলের ভিতর সদত শ্লেষ্মায় শাঁই শুঁই করিতে থাকে তৎ পক্ষে ।

ঔষধ—কুপ্রম্ অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি বালকের ক্রমি দোষ থাকে অথবা কাশীর সময় ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় শরীরে টান্ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিনা, পূর্ববৎ ।

যখন আহ্বারের পর কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া ভুক্ত দ্রব্য উঠিয়া যায় তৎকালে ।

ঔষধ—ফেরম্-মেটালিকম্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক বার বমনের পর এক এক বার ।

তৃতীয় অবস্থার চিকিৎসা ।

এই রোগ যদ্যপি প্রাচীন বা বহু দিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে, (সল্ফর) বা (সিপিয়া) উপর্যুপরি বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে পূর্ণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে খালিপেটে দিবেক ।

পঞ্চ ব্যবস্থা ।

যদ্যপি অর বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে পাতলা যবের মণ্ড, বা অন্নমণ্ড, ব্যবস্থা করিবেক, এবং অর লক্ষণ নিরাকৃত

হইলে, লঘু-পাক দ্রব্য পথ্য দিবেক । ক্রমশঃ বল বৃদ্ধি জন্য মাংসের কাথ ও দেওয়া যায় ।

বক্ষঃস্থলে রক্ত বদ্ধ ।

লক্ষণ—বক্ষঃস্থলে ভার বোধ কিম্বা চাপিয়া ধরা বোধ হয়, ও দপ্ দপ্ করে, হৃৎপিণ্ড থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, অস্থিরতা, এবং কিঞ্চিৎ দীর্ঘ শ্বাসের সহিত, কষ্টে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয় । এই রোগ প্রায় যৌবনাবস্থার পূর্বে বা তৎ কালের কিঞ্চিৎ পরকাল পর্য্যন্ত ও দেখা যায় ।

রোগের কারণ । পৈতৃক দোষ জন্য বা অত্যন্ত শীত বা উষ্ণতা শরীরে প্রবেশ, মাদক দ্রব্য ব্যবহার, তাম্রকূট সেবন, দৌড়ান বা নৃত্য করা, ইত্যাদি কারণ হইতে ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম উঠিঃস্বরে বাক্য কথন, বা গান করা, বা হঠাৎ ঘর্ষের অবরোধ জন্য, নিশ্চেষ্ট স্বভাব প্রযুক্ত, বা রক্তস্থলা কালীন বা অর্শঃ হইতে স্রাবের হঠাৎ নিবারণ জন্য হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যখন অতিরিক্ত পিপাসা উষ্ণতা হৃৎকম্প এবং অত্যন্ত কাশী থাকে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা আট ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধ প্রয়োগের দুই দিবস পরে, যদি অত্যন্ত উষ্ণতা, বক্ষঃস্থলে যাতনা, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ শ্বাস টানিতে ইচ্ছা থাকে, বা কাশের সহিত রক্ত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়ল্, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

অর লক্ষণের কিঞ্চিৎ শান্তি হইলে বক্ষঃস্থলে দপ্ দপ্ করা, কৃৎকম্প, রাত্রিতে কিঞ্চিৎ কাশী, আন্তরিক উষ্ণতা, এবং অতিরিক্ত পিপাসা থাকে তৎপক্ষে।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা আট ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি এই রোগ, নিশ্চেষ্টতা দোষ জন্য কিংবা আভ্যাসিক মদ্যপান জন্য বা হঠাৎ অর্শঃ নিবারণ করাতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন সময়ে এক এক বার করিয়া সেবন করিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে, সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ববৎ।

বক্ষঃস্থলে নিঃশ্বাস অবরোধের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, জ্ঞান শূন্যতা এবং রোগীর বর্ণ উজ্জ্বল হয়, হৃৎপিণ্ড থর্ থর্ করিয়া কম্পান্বিত হয়, তৎপক্ষে।

ঔষধ—অরম্-নেটালিকম্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি বক্ষঃস্থলে রক্ত বদ্ধ হইয়া বাহ্য উত্তাপ থাকে, প্রস্রাসে কষ্ট বোধ হয়, হৃদয় থর্ থর্ করে, সন্ধ্যার পূর্বে রোগের লক্ষণের বৃদ্ধি হয়, যদি স্ত্রী লোকের রজোবদ্ধ জন্য বা নাধারণতঃ অর্শঃ হইতে স্রাব বদ্ধ জন্য হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—পতেসটিলি, পূর্ণমাত্রা খালিপেটে প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক।

বক্ষঃস্থলের ভিতর গুরুতর তার বোধ ও চক্ষুপিয়া ধরা,

এবং কাশিলে বৃদ্ধি, শয়ন করিলে নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, আর যদি অর্শঃ নিবারণ জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং (নক্স-বমিকা কিম্বা পতেসটিলা,) দ্বারা আরোগ্য না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফার, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ খালিপেটে প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদি এই রোগ বহুকাল স্থায়ী হয়, এবং হাসিতে, কথা কহিতে, শীঘ্র হাঁটিতে, বক্ষঃস্থল যাতনা বোধ হয়, ও হৃদয় ধর্ধর্ করিয়া কাঁপে এবং বক্ষঃস্থল হইতে গলা পর্য্যন্ত উত্তাপ বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফস্ফস্, পুর্ণমাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

পথা ব্যবস্থা ।

যে প্রকার কফ, কাশীর বিষয়ে লিখিত হইয়াছে সেই রূপ, এবং যে কোন ক্রিয়া দ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি করায় তাহা বর্জন করিবেক, রোগী স্থির হইয়া সংযত ব্যবহারে চলিবে ।

রক্ত বমন রোগ ।

এই রোগে অধিক কিম্বা অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত রক্ত, কাশিবার সময়ে উঠে । এই রোগ নানা প্রকার হইয়া থাকে, প্রথমতঃ শারীরিক বায়ু-রক্তের আচ্ছাদক-সূক্ষ্ম-চর্ম্ম হইতে রক্ত উৎখিত হয় । দ্বিতীয়তঃ ফুস্ফুস যন্ত্রের বিকৃতি হইলে, এবং তৃতীয়তঃ ঐ যন্ত্রের গহ্বরের রক্তস্থলী কাটিয়া যক্ষার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে । যখন এই রোগ

বিজ্ঞাত কারণ হইতে উদ্ভূত জ্ঞানাবায় তৎ কালে রোগী উচ্চ কথা বলা, বা অধিক কাল ঐ রূপে বাক্য কথন, কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা, গান করা, ফুংকার দ্বারা যন্ত্র বাদ্য করা, বাহু দ্বারা অধিক পরিশ্রম করা, দৌড়ান, অথবা উপরে উঠা, অর্থাৎ যে কোন প্রকারে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অধিক্যতা হয় বা বক্ষঃস্থল ক্লান্ত হয় এতাদৃশ কর্ম এক কালীন বর্জন করিবেক ।

লক্ষণ—এই রোগ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বাধা দায়ক না হইয়া প্রকাশিত হয়, অথবা ইহার প্রকাশের পূর্বে শুষ্ক কাশী বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরা, কম্প, হস্ত পদাদির অগ্রভাগের শীতলতা, অত্যন্ত দৌর্বল্য, এবং নাড়ীর উচ্চ গতি, পরেতে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক কাশী, নাড়ী তীব্র গতি বিশিষ্টা, পরিষ্কৃত রক্ত বমন, এবং যক্ষ্মার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে বক্ষঃস্থলে বেদনা, ও প্রবল জ্বর উপস্থিত হয় ।

নিদান—তীব্র বীৰ্য্য মাদক দ্রব্য সেবন, অসাধারণ পরিশ্রমের দ্বারা শরীরকে উত্তাপিত করা, অত্যন্ত উষ্ণ সেবন, শুষ্ক যন্ত্র বাজান (অর্থাৎ ফুংকার দ্বারা যে যন্ত্র বাজাইতে হয়) কোন স্থান হইতে হঠাৎ পতন, ফুস্ ফুস্ যন্ত্রে আঘাত, নাসিকার দ্বারা কটু বাষ্পের স্রাব গ্রহণ করা, কফ কিম্বা কাশী, অত্যন্ত মনোবেগ, রক্তঃ বা অর্শঃ বা অন্য প্রকার স্রাবের অবরোধাদি ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি অত্যন্ত রক্ত উঠিতে থাকে তাহা হইলে বাহ্যর উপরিভাগে, (রোগী সস্থ করিতে পারে এমন করিয়া) এক খন্ডনিঃ কুমাল কষিয়া বাঁধিয়া দিবেক, এবং সেই দিগের উক্ত দেশেও

সেইরূপ বস্ত্র বাঁধিবেক, রক্ত বন্ধ হইলে, রোগীকে হেলান দিয়া বসাইবেক এবং ক্রমশঃ বন্ধন খুলিয়া দিবেক, কোন প্রকার মানসিক অত্যাচার করিবেক না, আহারের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া, এ রোগের পক্ষে উপকারক হয় ।

যদ্যপি স্ত্রীলোকেণ মাসিক রজঃস্রাব বা অর্শঃ দিয়া রক্তস্রাব বন্ধ জন্ম এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং সন্ধ্যার পূর্বে অথবা রাজিকালে কম্প বোধ হয়, ও গাঢ় থানা থানা রক্ত উঠে, বক্ষঃস্থলের নিম্নে যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পলেসটিলা, পূর্ণমাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবেক ।

তাহার চারি দিন পরে পুনর্বার উক্ত প্রকারে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলিবেক, উক্ত ঔষধের ঐ রূপ দুই সপ্তাহ সম্পূর্ণ হইলে তাহার চারি দিবস পরে ।

ঔষধ—ককিউলস্, সিপিয়া, বা সলফব্, ক্রমাগুয়ে ঐ রূপে দিবেক ।

যদ্যপি গলার ভিতর শুড়্ শুড়্ করিয়া থানা থানা রক্ত উঠে, এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ শ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অর্শঃ দ্বারা স্রাব বন্ধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করায় কিম্বা কোন প্রকার হঠাৎ রিপু প্রবল হওয়াতে হইয়া থাকে এবং শুষ্ককাশী, মাথাধরা, গলাতে অত্যন্ত শুড়্ শুড়্ করা ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে, পলেসটিলায় ব্যবস্থায়সারে দিবেক ।

যদ্যপি বাহ্য আঘাত দ্বারা কিম্বা বক্ষঃস্থলে অতিশয়

মুঁসা লাগিয়া বা কোন ভারি বোঝা তুলিতে বা শুষ্ক ষষ্ঠ বাদ্যাইতে এই রোগ উপস্থিত হয়, বক্ষঃস্থলের ভিতর জ্বালা, পশ্চাত্তাগে এবং ঘাড়তে ছেঁচা ঘায়ের ন্যায় বেদনা বোধ হয়, এবং গাঢ় বর্ণ রক্ত, কিম্বা রক্তের দলা অতি কষ্টে নির্গত হয়, উত্তাপ এবং অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, এবং এসিডম্-সল্ফুরিকম্, অর্দ্ধমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর । প্রথমে আর্গিকা ঐ মাত্রায় দিয়া পরেতে দ্বিতীয় ঔষধ ছয় ঘণ্টা পরে দিবেক ।

এরূপ অত্যন্ত কঠিন রোগের চিকিৎসা ।

যদ্যপি পুনঃ পুনঃ সময়ে সময়ে এই রোগ আক্রমণ করে এবং প্রত্যেক বার আক্রমণের পূর্বে কম্প, নাড়ীর তীব্র গতি, হৃদয় থর্ থর্ করিয়া কম্পন এবং বক্ষঃস্থলে জ্বালা বোধ হয়. মুখ রক্ত হীন দেখায়, শয়ন করিলে অস্থিরতা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্ অর্দ্ধমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যখন অস্থিরতা এবং হৃৎপিণ্ডের থর্ থরানি পূর্বোক্ত ঔষধ দ্বয় দেওয়াতেও বৃদ্ধি বোধ হয়, অত্যন্ত অস্থিরতা ও জ্বালা থাকে, তৎকালে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায় কিম্বা উপরোক্ত ঔষধের সহিত পূর্বোক্ত মতে উপর্যুপরি রূপে দিবেক ।

যদ্যপি রক্ত বমন এক বার হইয়া পুনর্বার উপস্থিত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সকর পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

রক্ত বমনের পরের চিকিৎসা।

এই রোগ উপস্থিত হইয়া পরেতে কোন প্রকার ভয়ানক রোগ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য।

ঔষধ—ফস্ফাস্ পূর্ণমাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিয়া তাহার চারি দিন পরে সল্ফার, দ্বিগুণ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার চারি দিবস পর্য্যন্ত।

পথ্য ব্যবস্থা—শারীরিক এবং মানসিক শৈথিল্য রক্ষা করিবে অধিক কথা কহবে না এবং নিরামিষ-ভোজী হইবেক কোন প্রকার উগ্র দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

হাঁফ অর্থাৎ শ্বাসকাশ।

নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, রোগ সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরে, কাশী হয়, এবং গলা শাঁই শুঁই করে ইত্যাদি। প্রকার ভেদ—প্রথমতঃ অল্প অথবা কিছুমাত্র শ্লেষ্মা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ অধিক শ্লেষ্মা উঠে।

চিকিৎসা।

যখন এই রোগ তীব্র রূপে তরুণাবস্থায় থাকে, আর যখন রোগী গাঢ় নিদ্রা হইতে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া জাগরিত হয়, অতি কষ্টে ঘন শ্বাস বহে এবং বক্ষঃস্থলের ভিতর শাঁই শুঁই করে এবং বদন শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় গলার ভিতর ধূলি থাকা বোধ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রা যদি আবশ্যক হয় তবে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর, এক এক বার কিম্বা অল্প কষ্ট দায়ক হইলে এক কিম্বা দুই ঘণ্টা

অন্তর, পরেতে ক্রমশঃ উপশম বোধ হইতে আরম্ভ হইলে সময়ের বৃদ্ধি করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দুই মাত্রায় কিছু মাত্র উপশম বোধ না হয়, এবং আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার ন্যায় যাতনা হয় অথবা কিঞ্চিৎমাত্র শরীর চালিত হইলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ যদি শয়ন করিলে এই রোগের আক্রমণ কাল উপস্থিত হয় এবং বক্ষঃস্থলের ভিতর শাঁই শুঁই করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্ রোগের তীব্রাবস্থায় অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অথবা কিঞ্চিৎ লাঘবাবস্থায় দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দুই তিন মাত্রার পর উপশম বোধ না হয় এবং রাত্রিতে অথবা প্রাতঃকালে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বাধা উপস্থিত হয় পঁজরের নীচে যাতনা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হেলন করিতে না পারা, পুনঃ পুনঃ কাশী, কথা কহিলে কিম্বা কিঞ্চিৎ চাপিলে রোগ বৃদ্ধি হয় ।

ঔষধ—ত্রায়োনিয়া, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দুই মাত্রায় উপশম বোধ না হয় এবং রাত্রিতে কঠাবরোধের উপক্রম ও বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে কঠিনতা বোধ হয় এবং তাহার পূর্বে অসুখকর স্বপ্ন দর্শন হয়, আর যখন রোগের আক্রমণ কাল প্রাতঃকালে অথবা আহাবেদের পর উপস্থিত হয়, পেট এবং পাকস্থলী কষিয়া ধরে, পেট ফাঁপে, হুৎপিণ্ড থর্ থর্ করে এবং হেলান দিয়া থাকিলে অথবা পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিলে কিছু আরাম বোধ হয় তাহা হইলে,

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, স্বতন্ত্র বা উপর্যুপরি রূপে পূর্ববৎ ।

যদি গলার ভিতর গন্ধকের ধূম লাগার ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মায়, বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং ফাম্‌ড়ায় ও

ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উঠে, রোগের আক্রমণ কাল সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিকালে উপস্থিত হয় তবে ।

ঔষধ—পেসেটিল, রোগের তীব্রাবস্থায় পূর্ণ মাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এবং লাঘবাবস্থায় দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদি রোগের আক্রমণ কাল রাত্রিতে হয়, গলার ভিতর শ্লেষ্মা একত্রিত হওয়া বোধ হইয়া রোগ উপস্থিত হয়, প্রশ্বাস টানিতে সাঁই সাঁই করে, স্বচ্ছ কাচের ন্যায় শ্লেষ্মা অতি কষ্টে উঠে, ঘাড়ে এবং মস্তকে বালিসের দ্বারা ঠেস্ না দিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অশক্ত হয় অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না অর্দ্ধ মাত্রা পূর্বোক্ত রূপে দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধের তিন মাত্রায় উপকার বোধ না হয়, এবং নাসিকা, কর্ণ, ও হস্ত পদের অগ্রভাগ শীতল হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম, পূর্ণ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি এই রোগ উগ্র স্বভাবান্বিত স্ত্রীলোকের হয় এবং রাত্রিতে শুষ্ক কাশী ও গোঙ্রানীর ন্যায় প্রশ্বাস, যাহা কখন কখন অতি গভীর বা ঘন অর্থাৎ শীঘ্র হয়, বায়ু-প্রবাহ-প্রণালীর উপরিভাগে ঠাসিয়া ধরা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা প্রয়োজন বশতঃ অর্দ্ধ মাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অথবা অবস্থানুসারে, দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

শীতলতা জন্য যদ্যপি রোগের আক্রমণ সময় উপস্থিত হয় এবং তরল শ্লেষ্মা উঠে, বক্ষঃস্থলের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ করে ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

প্রাচীন শ্বাস কাশ ।

এই রোগ প্রাচীন হইলে এবং যদ্যপি আর্দ্র কাশ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কস্করস্, পূর্ণমাত্রা রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ।

আরও সল্করস্, ক্যালেকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম্, ইহার অন্যতর যে কোন একটী ঔষধ উক্তরূপে, ক্রমাগুণে ব্যবহার করিবে ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

শ্বাস কাশের রোগী সর্বতোভাবে উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, দধি, দুগ্ধ, শাক, আম্রাদি এক কালে বর্জন করিবে, কেবল সহজে পরিপাক হয়, এবং সামান্য রূপে প্রস্তুত পাতলা দ্রব্য তাহাই ব্যবহার মাত্র করিবেক, একবারে অধিক ভোজন করিবেক না ।

সম্মা কাশ ।

এই রোগ নানাবিধ দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তির এই রোগ উপস্থিত হইলে সহজে লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারা যায়, এবং কাহারও কাহারও এমত লক্ষণ থাকে যে চিকিৎসকেও জানিতে পারেন না ।

ইহার প্রথমাবস্থায় গলার ভিতর শুড়্ শুড়্ করিয়া কিঞ্চিৎ কাশী হয়, দৌরল্য, কিঞ্চিৎ নিঃশ্বাসের অস্পতা এবং

আহারান্তে জ্বর বোধ, যদিও পিঞ্জরা উঠে তাহা স্বচ্ছ, এবং রক্ত মিশ্রিত, ও বক্ষঃস্থলের কোন স্থানে ও কক্ষ দেশে সদত বা কখন কখন ঘাতনা বোধ হয় ।

দ্বিতীয়াবস্থায়, পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত দুর্বল্য, রাত্রিতে ঘর্ষ, জ্বরের বৃদ্ধি, ও পুঁজ মিশ্রিত কাশ উঠে, সেই কাশ জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, এবং তাহার মধ্যে রক্ত মিশ্রিত থাকে, সময়ে সময়ে অধিক পরিমাণে রক্ত বমন হয় ।

তৃতীয়াবস্থায়, অতিরিক্ত ঘর্ষ জন্য ক্রমশই শরীর দুর্বল হইতে থাকে, অধিক পরিমাণে গোলাকৃতি, ছাইয়ের বর্ণ, কাশ উঠে তাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়। পা এবং গুল্ফ ফুলে, নিশ্বাসে এমত কষ্ট বোধ হয় যে, কণ্ঠাবরোধ হইবার উপক্রম হয় ।

চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ একোনাইট্, আর্সেনিকম্, কার্বো বেজিটেবিলিস্, সল্ফর, ডল্কেমেরা, প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় উপকার করিবেক । তৃতীয়াবস্থায়, ক্যালেকেরিয়া, কার্বো বেজিটেবিলিস্, চায়ুনা, হেপার, মর্কিউরিয়স্-বাইবস্, ফস্ফরস্, উপকার করিবে । উক্ত ঔষধ সকল পূর্ণ মাত্রায় ছয় কিম্বা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার সেবন করিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা

শ্বাস কাশের ন্যায়

হৃদ্রোগ, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড কম্পন ইত্যাদি।

নিদান—মনোরুত্তির উত্তেজনা, তীব্রমদ্য পানাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।

যখন হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত থর্ থর্ করে, বক্ষঃস্থলের তিতর অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, হস্ত পদাদি ভার জ্ঞান হয়, বাম পাশ্বে ছেঁচা ঘারের ন্যায় বেদনা বোধ হয়, শয়ন কালীন এবং শিঁড়িতে উঠিবার সময় বাম পাশ্বে অত্যন্ত যাতনা বোধ হয় তৎকালে।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি বক্ষঃস্থলে ফিতা দিয়া কষিয়া বাস্কার ন্যায় বোধ হয়, এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অসমান গতিতে চলে, শ্বাস প্রশ্বাস থক্স হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত এবং নাড়ী মোটা বা অতি সূক্ষ্ম হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণ মাত্রা।

যদ্যপি প্রাতঃকালে এই রোগ আক্রমণের কাল নির্দিষ্ট হয়, বমনেন্দ্ৰা থাকে, বক্ষঃস্থলে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ হয়, ও অনিদ্রা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণ মাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার চারি দিবস পর্য্যন্ত, তাহার চারি দিবস পরে পুনর্বার ঐ ঔষধ ঐ মতে চালাইবে।

পূর্বোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগের পর, সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য এবং যদ্যপি এই রোগ শিঁড়িতে উঠিলে বুদ্ধি হয়,

মনেতে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের উদয় হয়, অথবা যদি প্রাচীন বা
হঠাৎ আরোগ্য করাতে হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—নরফর, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে পূর্ণমাত্রা
প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক নপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদ্যপি বিরক্তি জনক কার্য হইতে হয় ... কামোন্মিতা ।

ভয় হইতে বা আনন্দ হইতে হইলে ... বেরাটম্, কফি ।

হঠাৎ ভয় জনা হইলে ওপিয়ম, কিম্বা কফি।

যদ্যপি দুঃশিষ্টা জন্ম হয় ... { ভিক্ত বাদাম রংড়াইয়া,
... { ভ্রাগ লইবে।

যদ্যপি পেট ফাঁপাতে হয় নক্ক-বমিক।

এই রোগ হঠাৎ উপস্থিত হইলে কর্পূরের আরক পাঁচ কোট। পরিমাণে অর্দ্ধ তোলা চিনির সহিত জলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচ মিনিট অন্তর এক এক বার সেবন করিবেক ।

যদি এই রোগের সহিত অজীর্ণ সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে, নক্স-বমিকা, পমেসটিলা, বা ত্রায়োনিয়ার, মধ্যে যে কোন একটা ঔষধ অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবে, যদি রক্ত ক্ষয় জন্য এই রোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না পূর্ণ মাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার
করিয়া দিবেক।

अथा वाचस्पति ।

যদি এই রোগ অজীর্ণ জন্য হয় তাহা হইলে সহজে পরি-
পাক হয় এমত দ্রব্যমাত্র পথ্য দিবেক, যাবতীয় মাদক দ্রব্যাদি
অথবা গুরুত্ব মসলা, যদ্বারা রক্তের উষ্ণতা জন্মায় তাহা বর্জন

করিবেক । এবং যে কোন শারীরিক বা মানসিক অনিয়ম জন্য এই রোগ উৎপন্ন করায়, তাহা ত্যাগ করিবে, মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিবে না ।

শ্লেহা রোগ ।

শ্লেহা বৃদ্ধি ।

লক্ষণ—বাম পাশ্বে পঞ্জরের নীচে তীক্ষ্ণ ব্যতনা বোধ, অত্যন্ত জ্বর, শ্লেহার বৃদ্ধি বা শ্লেহা কোলা । যখন এই রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় রক্ত বমন হইয়া থাকে, শারীরিক দৌর্বল্য পাণ্ডু বর্ণত্ব চক্ষুর শ্বেত ভাগে রক্ত হীনতা, হস্ত পদাদির অগ্রভাগের শীতলতা হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

প্রথমে জ্বর নিবারণের নিমিত্তে বা মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিবার জন্য ।

ঔষধ—একোনাইট, যদ্যপি জ্বর তীব্র থাকে তাহা হইলে, অর্দ্ধ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর অথবা লাঘবাবস্থায় পূর্ণ মাত্রা তিন বার প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি জ্বর ছাড়িয়া সময়ে সময়ে আইসে আর রোগী রক্ত বমন, বা অতিসার দ্বারা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে, আর যদি অতিরিক্ত কুইনাইন্ বা সীমুলফার সেবন জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়মা, পূর্ণ মাত্রা প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার দিবেক । রোগের তীব্রতা থাকিলে হয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

যদ্যপি রোগীর প্লীহার স্থানে, জ্বালার ন্যায় যাতনা বোধ হয় এবং নাভিমূল দপ্ দপ্ করে জলবৎ কিম্বা রক্ত মিশ্রিত মল নিঃসৃত হয়, মলদ্বারে জ্বালা বোধ হয়, অত্যন্ত দুর্বলতা এবং পায়ের পাতা, শোথঃ হইয়া ফোলে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্ পূর্ববৎ যদি পূর্বোক্ত ঔষধের সহিত এই ঔষধ উপর্যুপরি ব্যবস্থা করা হয় তাহাহইলে উপরোক্ত ঔষধ দুই মাত্রা ভদনস্তর এই ঔষধ দুই মাত্রা এই রূপে চলিবেক ।

যখন বাম পাশ্বে পঞ্জরের নিম্নে বেদনা বোধ হইয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত বমন হয় তৎকালে ।

ঔষধ—আর্নিকা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর, আর যদি আধিক্যতা হয়, তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি এই রোগের সহিত অজীর্ণতা, কোষ্ঠ বদ্ধতা, বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণ মাত্রা শয়ন কালীন এক এক বার দিবেক ।

যখন প্লীহার দিকে কামড়ায় বা খোঁচা দেওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয় ও সেই যাতনা কিঞ্চিৎ অঙ্গ চালনা করিলে বৃদ্ধি হয় কিম্বা পঞ্জরের নীচে, বাম পাশ্বে, নিয়ত কষিয়া ধরিয়া থাকে, এবং অজীর্ণতা ও কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া পূর্বোক্ত মতে সেবন করিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

জ্বরের প্রবলতাকালে যবের কুথ বা অন্নের কুথ মাত্র দেওয়া কর্তব্য পরেতে ক্রমশঃ জ্বরের লাঘব হইলে, অন্ন, কাঁচা

মুগ বা মসুরের দাইল, ডুমুর, মান্, বাভাঁকু বা পটোলের সামান্যমত প্রস্তুত করা। তরকারি মাত্র পথ্য করিবেক। ভ্রষ্ট দ্রব্যাদি অর্থাৎ মুড়ি প্রভৃতি এবং ঘৃত বা তৈলের দ্বারা ভর্জিত দ্রব্যাদি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, প্রভৃতি এককালীন বর্জন করিবেক। গরম মসলা পেঁয়াজ, আদা, হিঙ্গ, লঙ্কামরিচ ইত্যাদিও কোন মতে ব্যবহার করিবেক না, রোগীর প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে অল্প পরিমাণে পদ চালনাদি দ্বারা শ্রম করা উচিত কিন্তু তাহা কোন মতে অতিরিক্ত না হয়।

প্রাচীন প্লীহা বৃদ্ধি রোগ।

এই রোগ প্রাচীন হইলে, ক্যান্সেরিয়া, বা মল্ফর, প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিগুণ মাত্রা পরিমাণে সেবন করিবেক।

আরও এই রোগের প্রাচীনাবস্থায়, লাইকোপোডিয়ম্, কার্বো বেজিটেবিলিস, প্ল্যাটিনা, পূর্বোক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অঙ্গীর্ণ রোগ।

লক্ষণ—আহারে অনিচ্ছা, পেটে ভার বোধ, আহার করিলে ষাতনা বৃদ্ধি, বমন বা বমনেচ্ছা, তিক্ত, অম্ল, বা কটু, জলরৎ পদার্থ গলায় উঠা, ত্রিহ্বা আরক্তবর্ণ ও মধ্যস্থলে পশমের ন্যায় পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ এবং কখন অতিসার হয় ও কোষ্ঠ বদ্ধ কালীন, শুষ্ক কঠিন মল নিঃসৃত হয়, নাড়ী তীব্রগতি বিশিষ্টা, প্রস্রাব কটু এবং শুষ্ক কাশী ইত্যাদি।

নিদান—অধিক পরিমাণে বা পুনঃ পুনঃ ঔষধ দ্বারা বিরেচন অর্থাৎ জোলাপ লওয়া, আহারের সময় অতিক্রম করা, অতি উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য, কঠিন, তরল, ছুস্পাচ্য, অতি স্নেহযুক্ত অম্ল দ্রব্য, আহার বা পান করা।

চিকিৎসা।

যদি এই রোগের সহিত জ্বর এবং পিপাসা, পেট ভার, বমনেচ্ছা, পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন এবং পাকস্থলী টানিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্ আরক পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি জিহ্বা শুভ্র শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ক্ষুধা বোধ থাকেনা, কটু লালাবৎ পিত্ত বা শ্লেষ্মা বা চর্কিত দ্রব্য বমন হয়, ও পাকস্থলিতে কামড়ান বোধ হয়, তবে।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম্ আরক পূর্ববৎ।

যদ্যপি রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে এবং পাণ্ডুবর্ণ হয়, আহারে অনিচ্ছা এবং পিত্ত বা ভুক্ত দ্রব্য বমন করে, উদর চাপিলে ব্যতনা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—আসেনিকম্ পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ অথবা একোনাইটের সহিত উপর্যুপরিভাবে।

যদ্যপি এই রোগে, মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় রোগের সহিত জ্ঞান শূন্যতা অথবা প্রলাপ, থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা আরক তিন ঘণ্টা অন্তর পূর্ণমাত্রা স্বতন্ত্র বা একোনাইটের সহিত উপর্যুপরিভাবে দিবেক।

মুখ শুষ্ক, পিপাসা, জিহ্বা কটা বা শ্বেত বর্ণ, অম্ল ইচ্ছা, আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, ভুক্ত দ্রব্য ও পানীয় বমন, পকৃশয়ে যাতনা বোধ থাকে তবে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, আরক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর পূর্ণমাত্রা পরিমাণে দিবেক ।

যদ্যপি যকৃতের দক্ষিণ পাশ্বে এমত বেদনা থাকে যে রোগী তৎপাশ্বে শয়ন করিতে পারে না, গলাতে এবং মুখে তিক্ত বা অম্ল আন্বাদন বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ উদ্যার, পিত্ত বমন, চক্ষুঃ ও চর্ম্ম কামলা রোগ গ্রন্থের ন্যায় দেখা যায়, এবং পাকস্থলিতে অত্যন্ত যাতনা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্, গুঁড়া একগ্রেন্ করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদি পাকস্থলী দপ্ দপ্ করে, মুখে তিক্ত বা অম্ল রস বোধ হয়, নিয়ত পিপাসা, কপালে, বিশেষতঃ ক্রুর উপর মাথা ধরা বোধ হয়, আর ও উত্তাপ বিশিষ্ট শরীরে যদি শীতল জল পান জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, আরক (পূর্ণমাত্রা) তিন, চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যখন অপরিপক্ব ভুক্তদ্রব্য, বা পিত্ত, বমন আরম্ভ হয় এবং মুখ বিস্বাছু বোধ হয়, তৎকালে ।

ঔষধ—ইপিকাকুয়ানা, পূর্ববৎ ।

হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল, শক্তি হীনতা, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, শীতল পানীয় দ্রব্যে অত্যন্ত ইচ্ছা, পিপাসা, বমনেচ্ছা, উদ্যার, এবং সমুদয় শরীরে শীত বোধ হয়, কম্প হইয়া পরেতে মুছা হয় তৎপক্ষে ।

ঔষধ—বেরাট্রম, পূর্ণমাত্রা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ।

অজীর্ণ রোগের নৈদানিক চিকিৎসা ।

- যদ্যপি স্নাত্তাদি ভোজন জন্য হইয়া থাকে ... পতেসটিলা, সতফর ।
- মাংসাদি ভক্ষণ জন্য হইলে ... আসেনিকম্, কার্বো-বেজিটেবিলিস্ ।
- মৎস্য ভক্ষণ দ্বারা হইলে ... কার্বো-বেজিটেবিলিস্
- ব্রাহ্মী প্রভৃতি মদ্য সেবন দ্বারা হইলে ... { নক্স-বমিকা, আসেনিকম্,
এবং কার্বো-বেজিটেবিলিস্ ।
- পোট' আদি সুরা পান জন্য ... আসেনিকম্, কফি, নক্স-বমিকা ।
- যদি দুগ্ধ পান জন্য হয় ... { ব্রায়োনিয়া, আসেনিকম্, ক্যালেকেরিয়া,
ও নক্স-বমিকা ।
- যদি পেঁয়াজ ভক্ষণ জন্য হয় ... থুজা ।
- আলু ভক্ষণ জন্য হইলে ... এলমিনা ।
- নিশ্চেষ্ট স্বভাব জন্য হইলে ... { ব্রায়োনিয়া, ক্যালেকেরিয়া,
পতেসটিলা ও নক্স-বমিকা ।
- শোক বা দুঃখ হইতে হইলে ... ব্রায়োনিয়া, ক্যামোমিলা, নক্স-বমিকা
- রাত্রি জাগরণ জন্য হইলে বা অতিরিক্ত } আর্গিকা, ল্যাকিসিস্, নক্স-
(পুলকাদি) পাঠ জন্য হইলে ... } বমিকা বা সতফর ।

অমুপিত্ত রোগ ।

নাতিস্থলের মধ্যে কষিয়া ধরার ন্যায় বাতনা বোধ হইয়া পশ্চাত্তাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, শরীরকে সম্মুখ দিকে নত করার, উদার উঠে, বমনেন্দ্ৰা, বা জলবৎ পাতলা অধিক পরিমাণে বমন হয়, এবং তদ্বারা উপশম বোধ হয় । এই রোগ স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির যৌবনাবস্থায় ঘটিয়া থাকে ।

লক্ষণ—নাভিস্থলে এ প্রকার টানিয়া ধরা যাতনা হয় যে পাকস্থলী পশ্চাদ্ধিকে টানি লইতেছে বোধ হয়, দণ্ডায়মান হইলে যাতনা বৃদ্ধি এবং শরীর সম্মুখদিকে নোয়াইলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি উষ্ণিত জল ক্ষারবৎ হয় এবং পাকস্থলিতে এ প্রকার যাতনা হয় যে তাহার কোন কার্য্যই করিতেছে না বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—এলমিনা, পূর্ণ মাত্রা দিবসে তিন বার কয়িরা দিবেক ।

যদ্যপি উষ্ণিত জল কিঞ্চিৎ মিষ্ট স্বাদু যুক্ত হয়, পুনঃ পুনঃ বমনেচ্ছা থাকে কিন্তু ক্ষুধার কোন পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্, পূর্ববৎ ।

প্রকারান্তর অর্থাৎ শূল ব্যাধি ।

অতি অল্প পরিমাণে কটু জল গলায় উঠে এবং তাহাতে অপরিপক্ব-ভুক্ত-দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এবং ক্ষার-স্বাদু যুক্ত হয়, আর যখন ক্রমশঃ পাকস্থলিতে মোড়া দিয়া উদরস্থ দ্রব্য উঠাইবার চেষ্টা করে তখন ঐ জল অম্ল হয় । এই রোগ প্রায় আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে উপস্থিত হয় ।

নিদান—এই রোগ ভুক্ত-দ্রব্য-প্রবাহ-প্রণালীর কোন প্রকার পীড়া জন্য উপস্থিত হয় না, কেবল সামান্য কঁক, শ্লেষ্মাবমন, পাকস্থলী অম্পাটানা, এই কএক প্রকার পীড়া অধিককাল থাকিলে ইহা উৎপন্ন করায় ।

চিকিৎসা ।

যখন পাকস্থলিতে পাথর থাকার ন্যায় চাপিয়া ধরা যাতনা, অত্যন্ত কঠিন বেদনা বোধ হয়, উদ্বার উঠে, এবং মুখ দিয়া গলার ভিতর জ্বালার সহিত ঈষৎ-মিষ্ট জল উঠে, বমনেচ্ছা থাকে তৎকালে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি এই রোগ বহু দিন স্থায়ী হয় এবং পাকস্থলী হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠে, পুনঃ পুনঃ বমন করিতে ইচ্ছা হয়, মুখ দিয়া জল উঠে, আরও বিশেষতঃ যদি রাত্রি জাগরণ জন্য কোমলস্বভাবা স্ত্রীলোকের এই পীড়া হয় তবে ।

ঔষধ—কম্বিকম্, পূর্ব্ববৎ ।

যদি বক্ষঃস্থলের নীচে খুঁড়িয়া ফেলা এবং সূত্র দ্বারা জড়ানোর ন্যায় যাতনা বোধ হয়, মুখ বিষাদ্, তিক্ত হইয়া ঐক্লপ জল উঠে, ক্ষুধা হীনতা হয়, এবং আহার করিলেই বমনেচ্ছা হয়, বিশেষতঃ এই রোগ বলবতী স্ত্রীলোকের হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ তিন বার করিয়া দিবেক ।

যখন এই রোগে উদরে অত্যন্ত জ্বালা, চাপিলে অতিশয় বেদনা বোধ, মোড়া দেওয়া, টানিয়া ধরা, অত্যন্ত অস্থিরতা, হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল বোধ হয়, নাড়ী ক্ষুদ্রা, বেগবতী এবং অসমান গতিবিশিষ্ট হয় তৎকালে ।

ঔষধ—আসেনিকম্ পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

পেট কষিয়া ধরা, পাকস্থলিতে জ্বালা বোধ, তুচ্ছদ্রব্য বমন লক্ষিত হইলে ।

ঔষধ—ক্যাঙ্কেকরিয়া পূর্ব্ববৎ ।

যদ্যপি ষৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেই পাকস্থলীর মধ্যে ক্ষত থাকার ন্যায় আলা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মকিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্ পূর্ববৎ ।

গলার নীচে, বক্ষঃস্থলের মধ্যে, খুঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, মুখ দিয়া লাল উঠে, তাহার সহিত অম্ল ও তিক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এবং পাকস্থলিতে পার্থক্য দিয়া চাপার ন্যায় যাতনা বোধ হয় ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ । *

যখন বাম পার্শ্বের পশ্চাদ্ধিকে চাপিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, এবং পাকস্থলিতে আলা বোধ হইয়া মুখ দিয়া জল উঠে তৎকালে ।

ঔষধ—সলফস্ পূর্ববৎ ।

পথ্যব্যবস্থা ।

প্রথমতঃ গরম ছুঞ্চে থৈ দিয়া মিসুরির সহিত আহার করিবে আহারের অন্ত্যন এক ঘণ্টা পরে জল পান করিবেক । পানের পক্ষে হিম জলের পরিবর্তে ডাবের জল অধিক উপকারক । এবং এই ব্যবস্থামত তিন চারি দিবস চলিলে পরেতে ছুঞ্জের সহিত সাগুদান প্রভৃতি লঘু দ্রব্য মিসুরি মিশ্রিত করিয়া, আহার করিলে, যদি সহ্য হয়, ক্রমশঃ ঐ রূপে অন্ন পথ্য দিয়া পরেতে, স্বাভাবিক মতে লঘু আহার দিবেক । দাইল মাত্রেই এ রোগের পক্ষে প্রায় অপকারী, অতএব তাহা বর্জন করিবেক ।

* আমি এই ঔষধ দ্বারা অনেকের বহু দিমের খুল ব্যাধি অরোগ্য করিয়াছি ।

কোষ্ঠ বদ্ধ ।

ভুক্ত-দ্রব্য-প্রবাহক-প্রণালীর কোন স্থানে মল বদ্ধ হইলে তাহাকে কোষ্ঠ বদ্ধ কহে ।

নিদান—প্রথমতঃ ক্ষুদ্র-অন্ত্রের শক্তিহীনতা জন্য মল, বৃহদন্ত্রে নীত হয় না । দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্র-অন্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে নীত হইয়া তাহার দৌর্বল্য জন্য নির্গত হইতে না পারায় কোষ্ঠ বদ্ধ রোগ উৎপন্ন করায় ।

চিকিৎসা ।

পুনঃ পুনঃ জোলাপ দ্বারা বিরেচন করান নিতান্ত অবিধেয় কারণ কোন এক প্রকার ব্যবস্থায় বহু দিন পর্য্যন্ত এক মতে থাকিলে তাহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায় ।

যদ্যপি দক্ষিণ পাশ্বের কুঁচকিতে ভার বোধ হয়, পা কোলে, পেটে বেদনা বোধ হয়, এবং পেট ফাঁপা থাকে তাহাহইলে ।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করিবেক !

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধে আংশিক উপশম বোধ হয়, এবং এমত ভয়ানক লক্ষণ উপস্থিত হয় যে, পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠে বেগ হইয়া মল এককালীন নিঃসরণ না হইয়া কুঁচকিতে বেদনা বোধ হয় ও শীতল স্পর্শ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, পুষ্কবৎ ।

যদ্যপি কোষ্ঠ বদ্ধ স্বাভাবিক না হয়, কিম্বা অলস স্বভাব জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকের অতিসারের সহিত যদি এই রোগ উপর্য্যুপরি থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, পূর্ণ মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি এই রোগ বহুকাল স্থায়ী হয়, এবং পুনঃ পুনঃ বৃথা কোষ্ঠের উপরোধ হয় কিম্বা অতি কষ্টে মল নিঃসরণ হয় এবং পেট কামড়ায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—লাইকোপোডিয়ম্, পূর্ণ মাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যখন অত্যন্ত কোষ্ঠের বেগ হয় এবং অল্প পরিমাণে মল নিঃসরণ হয়, গৃহ্য দ্বার চুল্কার উপকার উঠাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা, এবং পাকস্থলিতে কষ্ট বোধ হইয়া তলপেটে দুর্বলতা বোধ হয় তৎকালে ।

ঔষধ—প্ল্যাটিনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অতি কষ্টে কঠিন শুষ্ক ভগ্ন মল, নির্গত হয়, এবং কখন কখন তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—এলমিনা, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যহ সন্ধ্যা বা শয়ন কালে এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি কোষ্ঠে বৃথা বেগ হয় এবং অতি কষ্টে কঠিন গুলির আকার মল নিঃসারিত হয়, এবং পেট কষিয়া ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্লম্বম্, পূর্ণ মাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ হয় বা অর্শঃরোগ থাকে এবং কঠিন গুলির ন্যায় মল নিঃসারিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠের বৃথা বেগ হয় তৎপক্ষে ।

ঔষধ—সলফর, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ।*

* আমি এই ঔষধ দ্বারা এমন এক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছি যে তাহার প্রত্যহ রাজি শেষে পেট ফাঁপিত, প্রাতঃকালে মলভ্যাগ জন্য চেষ্টিত হইয়া কোন মতেই মল হইত না, কিন্তু উঠিয়া আসিয়া বসিলে দুই তিন বার বাতকর্ষ হইয়া আপনাই বহু মধ্যে মল নিঃসৃত হইত কিন্তু বাতকর্ষের উপক্রম হইলে, যদ্যপি বহির্দেশে বাইত তাহা হইলেও বহু চেষ্টায় কিছুই হইত না ।

যদ্যপি কখন কোষ্ঠ বদ্ধ এবং কখন অতিসার হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্ এবং কস্-ফরস্ পূর্ণ মাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

এই রোগ যদ্যপি বৃদ্ধির হয় এবং পূর্ববৎ লক্ষণ সমুদয় বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বারায়্ টা, দ্বিগুণ-মাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

যে সকল দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক করা যায় এবং বলকারক হয়, এমত দ্রব্য, সম্ভবমত পরিমাণে প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে আহাৰ করিবেক । আহাৰ্য্য দ্রব্য সুন্দর রূপ চর্খিত না করিয়া গিলিবেক না, সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে পরিপূর্ণ এক গ্লাস করিয়া শীতল জল পান করিবেক । রাত্রি জাগরণ করিবেক না, এবং প্রত্যাষে গাত্রোপ্থান করিবেক ।

অৰ্শঃ ।

অৰ্শঃ দুই প্রকার, অন্তর এবং বাহ্য । মল নিঃসরণের প্রণালির অভ্যন্তরের যে বলি হয় তাহা, এবং বহির্ভাগে যাহা হয়, সেই বলি হইতে রক্ত স্রাব হয়, কখন কখন আমও নিঃসারিত হয়, অন্তরবলি হইতে প্রায় রক্ত স্রাব এবং বহির্বলি হইতেও রক্ত স্রাব হয় । সেই স্রাব অল্প কয়েক ফোটা হইতে অৰ্দ্ধ সের পর্য্যন্ত ও হইয়া থাকে ।

নিদান—এই রোগ পিত্তাধিক্য ধাতুতে প্রায় হইয়া থাকে এবং যাহারা, উত্তম রূপে আহার ব্যবহার করে, ও অলস (অর্থাৎ) কোন কর্মই করে না তাহাদের হয়, আর পৈতৃক দোষ ইহার একটা প্রধান কারণ, যদি মনে চিন্তা থাকে তাহাতে এবং পুনঃ পুনঃ ঔষধ দ্বারা বিরেচন করানতে, গুহা দ্বারে ক্রমি থাকাতে, অথবা কোষ্ঠ বন্ধ জন্য ও হইয়া থাকে। এই রোগ প্রায় মধ্যমাবস্থায় বা বৃদ্ধাবস্থায় হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এই রোগে অস্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদন করা, (নাইট্রিক এসিডের দ্বারা) দক্ষ করা অত্যন্ত বিপদজনক, কারণ উক্ত প্রকারে বলি নষ্ট করিলে যতবার নষ্ট হইবেক ততবার তাহা হইতে অধিক যাতনার সহিত উপস্থিত হইবেক।

যদ্যপি বলি ফুলিয়া থাকে ও তাহাতে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ হয় এবং রক্ত অথবা আম নির্গত হয়, আর গুহা দ্বার দিয়া উষ্ণ জল নিঃসৃত হওয়ার ন্যায় বোধ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—একো নাইট্ পূর্ণ মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

বলি ফুলিয়া যদি তাহাতে জ্বালা হয়, এবং দক্ষ শুল্কীর দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—আসেনিকম., (ত্রৈকুপ) পূর্ববৎ।

যদ্যপি ঐ রূপ হইয়া পেট কষিয়া ধরে, গুহা দ্বারের উপরে তার বোধ হয়, মাথা ধরা থাকে, ও গুহা দ্বারে জ্বালা থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি রোগী সবল হয়, গৃহ্যদ্বার হইতে বিনা বেগে থানা থানা রক্ত্র আব হয় এবং বলি থাকে, ও পশ্চাত্তাগে ছেঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সল্ফর, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি প্রত্যেক বার মল নিঃসরণের পর সামান্যতঃ কম্প বোধ হয়, অতি কষ্টে, অত্যুপ্প পরিমাণে মল নিঃসারিত হয়, এবং তৎকালে রক্ত্র ও আব হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্লাটিনা, পূর্ব মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি বলি দিয়া প্রত্যেক বার রক্ত্র এবং আম নিঃসারিত হয়, এবং তাহার পর অত্যন্ত কাম্‌ড়ানি, বলিতে যাতনা, বলি দপ্ দপ্ করে, চুল্‌কায়, এবং জ্বালা করে, নাসিকা দিয়া রক্ত্র আব হয়, পশ্চাত্তাগে কুঁচকিতে এবং হস্ত পদাদিতে, বাতের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্, পূর্ববৎ ।

পূর্বোক্ত ঔষধ দ্বারা, রক্ত্র বন্ধ হইলে, বলি নাশ করিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, * পূর্বোক্ত প্রকারে ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

এই রোগের চিকিৎসা কালীন কোন প্রকার মাদক দ্রব্য, বা গরম মসলাদি দ্বারা প্রস্তুত বা অত্যন্ত ঘৃতাদি সিক্ত দ্রব্য

* এই ঔষধ পিতৃ দোষ জন্য অর্শের বিশেষ উপকারক । এই ঔষধের সহিত সল্ফর, উপর্যুপরি রূপে বিশেষ উপকারক, আমি সম্প্রতি ইহা দ্বারা দুই ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে আরোগ্য করিয়াছি ।

এক কালীন বর্জিত করিবেক । নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি
অথবা অত্যন্ত কোমল আসন ব্যবহার করাতে রোগের বৃদ্ধি
হয়, অতএব তাহা কর্তব্য নহে ।

হারীষ ।

মল-দ্বারের ভিতরের সূক্ষ্ম-চর্ম কোষ্ঠের বেগের সময়-নির্গত
হয়, এবং তাহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তৈল দিয়া তদ্বারা অন্তরস্থ করিতে
হয় তাহাকে হারীষ কহে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি এই রোগ কোমল স্বভাবান্বিত ব্যক্তির হয় এবং
তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেসিয়া, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি এই রোগ উগ্র স্বভাবান্বিত ব্যক্তি যিনি সর্বদা উত্তম,
আহারাদি করেন তাহার হয়, এবং কোষ্ঠের বদ্ধতা থাকে তাহা
হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিক., পূর্ববৎ ।

যদি এই রোগ শিশুর হয়, এবং পেট ফুলা, ও কোষ্ঠের
অত্যন্ত বেগ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ এক এক বার করিয়া দিবেক ।

এই রোগ সর্বতোভাবে আরোগ্য করিতে অসাধারণ,

ঔষধ—সলফুর্, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া ।

আরও ক্যালেকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম্, সিপিয়া, প্লম্বম্,
আর্সেনিকম্, সলফুরের পর ঐ রূপে দিলে উপকার হয় ।

যক্ৰ৭ ।

যক্ৰতের জড়তা ।

লক্ষণ—কোষ্ঠবদ্ধতা, মলের সহিত অত্যপ্প মাত্র পিত্ত মিশ্রিত থাকে, উদরস্ফীততা প্রভৃতি অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, শরীরের উপর মাটিয়া বর্ণ দেখা যায়, প্রস্রাব ঘোলা এবং পরেতে জমিয়া যায়, প্রাতঃকালে মুখ তিস্ত হয়, পিপাসা থাকে কখন উত্তাপ ও কখন শীত বোধ হয়, নাড়ী কঠিনা, এবং যক্ৰতের দিকে পূর্ণতা বোধ হয় ।

চিকিৎসা ।

যখন যক্ৰতের উপর স্পর্শ করিলে যাতনা বোধ হয় রোগীর জিহ্বার উপর আচ্ছাদিত এবং মলিন দেখা যায়, উদ্বার উঠে, উদর স্ফীত হয়, পাণ্ডুবর্ণ বা কৰ্দমের ন্যায় মল নির্গত হয় তৎকালে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ তিন বার করিয়া ।

অজীর্ণতা, উদারাদুর্মান, কোষ্ঠবদ্ধ, বমনেচ্ছা এবং বমি হয়, কিম্বা দক্ষিণ পাশ্বে টানিয়া ধরা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ট্যারেক্লেকম্, পূর্ণমাত্রা দিবসে তিন, চারি, বার করিয়া ।

এই রোগের পরমোপকারক ।

ঔষধ—পডোকাইলম্-অমিশ্র আরক, পূর্ববৎ ।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগী প্রত্যহ অশ্বারোহণে বা পদ ত্রজে বা নৌকা যানে ভ্রমণ ও শারীরিক পরিশ্রম করিবেক ।

ভরণ যকৃৎ বৃদ্ধি ।

লক্ষণ—দক্ষিণ দিকের পঞ্জরের নীচে কষিয়া ধরে, বা জ্বালার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, এবং সেই যাতনা বক্ষঃস্থলের অস্থি, দক্ষিণ দিকের ঘাড়ের পাশ্বে, এবং দক্ষিণ চরণ পর্য্যন্ত ও ব্যাপ্ত হয়, দক্ষিণ দিকের হস্তের জড়তা বোধ হয়, এবং সেই যাতনা নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসের সহিত বৃদ্ধি হয় ও শুষ্ক-কাশী এবং জ্বর বিদ্যমান থাকে, কোষ্ঠ বদ্ধ, এবং মলের অস্বাভাবিক বর্ণ হয়, এইরূপ হইলে রোগী কেবল বাম পাশ্বে ভিন্ন শয়ন করিতে পারে না। যদিপি যকৃৎের অভ্যন্তর দিকে ফোলে, তাহা হইলে অনেক যাতনার অস্পতা হয়, এবং কেবল কষিয়া ধরা বোধ হয়, চক্ষুঃ হরিদ্রা বর্ণ হয়, এবং কখন কখন সম্পূর্ণ কামলা উপস্থিত হয়, প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়, মল কঠিন অথবা শুভ্র বা কটা বর্ণ হয়, মুখে তিক্ত রস বোধ হয় ।

চিকিৎসা ।

যখন এই রোগে অত্যন্ত জ্বর প্রবল থাকে এবং যকৃৎের দিকে অসহ্য যাতনা বোধ হয়, রোগীকে অস্থির করে তৎকালে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদিপি অতিশয় পিপাসা থাকে রাত্রিতে অনিদ্রা এবং অস্থিরতা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা অর্দ্ধমাত্রা পূর্ববৎ ।

যদিপি উক্ত ঔষধের দ্বারা উপশম বোধ না হয়, তাহা হইলে তাহার ছয় ঘণ্টার পর ঔষধ, মর্কিউরিয়স, এবং যদিপি যকৃৎ ফুলিয়া তাহাতে অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, ও জ্বর লক্ষণ

থাকে চর্ম্ম পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ ল্যাকিসিস নামক ঔষধের সহিত উপর্য্যুপরি রূপে পূৰ্ব্বোক্ত মতে দিবে।

যদ্যপি যকৃতের সামান্য প্রদাহ মাত্র উপস্থিত হয়, পাক-স্থলী টানিয়া ধরে, পঞ্জরের নিম্নে রজ্জু দ্বারা কষিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয়, চর্ম্ম পীতবর্ণ, মুখে তিক্ত স্বাদ থাকে, বিশেষতঃ যদি উক্ত লক্ষণ সকল, রাগ দ্বেষাদি জনা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—কামোমিলা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি যকৃতের দিকে বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয় এবং দপ্ দপ্ করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অস্পত্তা এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে ও যকৃত বৃদ্ধি ও কঠিন হয়, এবং রোগী যদি পিত্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার কন্ঠিয়া দিবেক।

পূৰ্ব্বোক্ত ঔষধের দ্বারা কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত।

ঔষধ—সলফর, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার। এই রূপে চারি দিন দিলেও যথেষ্ট উপকার বোধ হয়।

যকৃতের স্ফোটক।

যদ্যপি যকৃতে স্ফোটক হইয়া পাকে, এবং পুঁজ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, অথবা সলফর, পূর্ণমাত্রা তিন, বা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

এবং যদ্যপি পাকিয়া উদরের ভিতরে পাকস্থলীর দিকে, মুখ হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে, কোন বিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসাবিৎ ডাক্তারের দ্বারা কাটাইবে ।

প্রাচীন যকৃৎ রোগ ।

লক্ষণ—এই রোগ প্রাচীন হইলে, পূর্বেকৃত তরুণাবস্থায় যে সকল লক্ষণ থাকে সেই সমস্ত লক্ষণ কিঞ্চিৎ সামান্যভাবে বিদ্যমান থাকে, বিশেষতঃ শীর্ণতা, এবং বল ক্ষয় হয়, ও কাশী হইয়া প্লেয়্যা উঠে, এবং কখন কখন যকৃৎ নিয়ত বা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হয়, প্রস্রাব রক্তবর্ণ, চৰ্ম্ম, এবং চক্ষুঃ কিঞ্চিৎ হরিদ্রাস্ত, এবং জ্বর বোধ থাকে, নাড়ী দ্রুতও অসমান গতি বিশিষ্ট হয়,

এই রোগে নক্স-বমিকা, ব্রায়োনিয়া, আর্সেনিকম্, সল্ফুর সিপিয়া, এবং বিশেষতঃ ক্যালেকেরিয়া, ইহার অন্যতর একটা ঔষধ পূর্ণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে, এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিবে । কিছু উপশম বোধ হইলে, শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে, পুনর্ব্বার ঐ রূপে আরম্ভ করিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—প্রাচীন জ্বরের ন্যায় ।

কামলা রোগ ।

এই রোগেতে চৰ্ম্মাদি হরিদ্রা বা ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়া থাকে, প্রথমতঃ চক্ষুতে দেখা যায়, এবং পরেতে সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত হয়, কঠিন এবং ঈষৎ শ্বেতবর্ণ মল নিঃসারিত হয়, প্রস্রাব জ্বরক্তবর্ণ হয়, অজীর্ণ এবং কখন কখন যকৃৎতের দিকে বেদনা বোধ হয়, এই রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে ঘৰ্ম্মাদিও হরিদ্রাবর্ণ হয় ।

নিদান—ইহার প্রধান কারণ যকৃতের পীড়া, অপাচ্য বিষয়ং দ্রব্য ব্যবহার, কক লাগা, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম, বলবান্ বিরেচক ঔষধ সেবন, অথবা কোষ্ঠাবরোধ বলা ঘাইতে পারে, আরও বহু দিন পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা মদ্যাদি পানে আশক্তি এবং পুনঃ পুনঃ ভেদক ঔষধ ব্যবহার করা ও ইহার প্রধান কারণ ।

চিকিৎসা ।

এই রোগের চিকিৎসাতে যদ্যপি রোগী পূর্বে অধিক পারা ব্যবহার না করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষ উপকারক,

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এবং অমিশ্র আরক পডোফাইলম্, ঐ রূপে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দায়ক হয় ।

যদ্যপি রোগী অধিক পরিমাণে পারা সেবন করিয়া থাকে অথবা কোন প্রকার অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম জন্য বা অজীর্ণ জন্য এই রোগ উৎপন্ন লক্ষিত হয়, এবং কখন রোগের লক্ষণ দেখা যায় ও কখন থাকে না বা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, এমত হইলে ।

ঔষধ—চায়না, পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রথমতঃ এক এক বার, এই রূপ চারি, পাঁচ বার প্রয়োগের পর দুই ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপ কোন 'রিপ্লুর প্রবলতা' জন্য বা অতিরিক্ত মনো-বেগ জন্য হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ছয়মাত্রা দিয়া পরেতে আট ঘণ্টা অন্তর দিবে ।

যদ্যপি কেবল মনোবেগ জন্য হয় এবং কখন কোষ্ঠাবরোধ ও কখন অতিসার হয় অথবা নিশ্চেষ্টতা বা অতিরিক্ত পাঠ বা মদ্যপান জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, পূর্ববৎ ।

এই রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে সলফুর্, হেপার্, এসিডম্-নাইট্রিকম্, বা ল্যাকিসিস্ দ্বিগুণমাত্রা সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে ব্যবহার করিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—প্রাচীন আর চিকিৎসার ন্যায় ।

আমশূল ।

লক্ষণ—শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের মধ্যে বিশেষতঃ নাভি-স্থলে অভ্যন্ত কামড়ায়, পেট কষিয়া ধরে, কখন কখন বমি, এবং কোষ্ঠাবরোধ বা অতিসার হয় । এই যাতনা চাপিলে বৃদ্ধি হয়, ইহা অধিক কাল স্থায়ী হইলে ইহাতে অন্য প্রকার মহৎ রোগ উৎপন্ন করাইবার সম্ভব অতএব ইহাকে শীঘ্র দমন করা কর্তব্য

নিদান—অম্ল, গুরুপাক দ্রব্য, গুড় ইত্যাদি মিষ্ট দ্রব্য, অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা, চরণ আর্দ্র থাকাতে কফ লাগা, শীতল পাণীয় উষ্ণ করিয়া পান করা কোষ্ঠাবরোধ, ক্রমি ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি মার্জার উপর দিকে কষিয়া ধরে আর এমত অভ্যন্ত ভীত কঠিন যাতনা পেটে বোধ হয় যে, রোগীকে সমস্ত

শরীর নোওয়াইতে হয়, পেট ফাঁপা, মাথা ধরা এবং কোষ্ঠ বন্ধ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, দ্বিগুণমাত্রা তীব্র যাতনায়, এবং সামান্য যাতনায় পূর্ণমাত্রা এক এক বার দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদি এই রোগ স্ত্রীলোকের রজস্বলা কালীন হয়, এবং মাজার উপরে ও পেট কষিয়া ধরে আর নাভিস্থল দিপ্ দিপ্ করে, বমিয়া থাকিলে এবং সন্ধ্যাকালে বুদ্ধি বোধ হয়, ও গমনাগমন করিলে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ হয়, পেট ফাঁপা ও অতিসার থাকে, ও মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—পমেসটিলা, পূৰ্ণবৎ ।

যদ্যপি এই রোগের সহিত জ্বর বোধ থাকে এবং মুত্র স্থলিতে কামড়ানের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পেটের মধ্যে ছুরি বিদ্ধার ন্যায় যাতনা বোধ কখন কখন, উদর শূন্য বোধ হয়, অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে বিশেষতঃ রাগ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে ।

ঔষধ—কলোসিস্টিস্, অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যখন নাভির উপরে গদি থাকার ন্যায় বোধ হয়, কামড়ানির যাতনা এমত থাকে যে সেই স্থান চাপিলে কিছু উপশম বোধ হয়, গমনাগমনে বুদ্ধি হয়, উদরস্থ সমুদয় বস্ত্র টানিয়া নিম্নে নামান বোধ হয়, পশ্চাত্তাগে জ্বালায় ন্যায় যাতনা হয়, অস্ত্রের নীচে, (কতকগুলিন শূচির উপর অস্ত্র নিহিত থাকার

ন্যায়) ষাতনা বোধ হয়, আরও জলবৎ কিম্বা পুঁজের ন্যায় মল নিঃসারিত হয় তৎপক্ষে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর, এবং কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধে যদিপি আংশিক উপশম বোধ হইয়া থাকে, এবং পেট টিপিলে কঠিন বোধ হয়, আন্তরিক/মোড়া দেওয়া ষাতনা, অত্যন্ত মাথা ধরা, বমন এবং রোদনাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েমস্, পূর্ববৎ ।

যদিপি এই রোগ পাকস্থলীর বিকার জন্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিত বমনেচ্ছা, বমন এবং অতিসার, অত্যন্ত কামড়ানি, মাথা ধরা, মুখ পাণ্ডু বর্ণ ও চক্ষুর চতুষ্পাশ্বে নীল-বর্ণ চিহ্ন থাকে, এবং সবুজ বর্ণ বা হরিদ্রাস্ত মল নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এবং কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

এই রোগে অজীর্ণ রোগের পথ্যব্যবস্থানুসারে পথ্য করিবেক যদিপি দুগ্ধ, কিম্বা শীতল দ্রব্য, ষাতনা বৃদ্ধি করে, তাহা এককালীন বর্জিত করিবেক ।

অতিসার ।

লক্ষণ—অন্ত্র হইতে জলবৎ মল অধিক পরিমাণে নিঃসারিত হইলে তাহাকে অতিসার কহে ।

নিদান—অল্প, অপাচ্য দ্রব্য ভোজন, ঘর্ম্মের হঠাৎ অবরোধ, গময়ের হঠাৎ পরিবর্তন, অধিক কাল পর্য্যন্ত বিরেচক-ঔষধ ব্যবহার করণ, অতিভোজন, বা কুভোজন, এবং ভোজনের অতিরিক্ত কালে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি।

চিকিৎসা।

যদ্যপি অতিসারের সহিত পেট কামড়ানি থাকে, বিশেষতঃ নাভিতে তাদৃশ যাতনা বোধ হয়, এবং জলবৎ পিচ্ছিল, ও হরিদ্রা বা জ্ষৎ সবুজ বর্ণ মল, অধিক পরিমাণে রাস্মিতে নিঃসারিত হয়, ক্ষুধা হীনতা এবং অতিশয় পিপাসা, পাণ্ডুবর্ণত্ব ও দৌর্ব্বল্য থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যেক বার নিঃসরণের পর এক এক বার করিয়া।

যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে এবং উক্ত ঔষধে কোন উপকার বোধ না হয়, ও কিঞ্চিং আহার বা পানের পর অতিশয় বৃদ্ধি হয়, মল আপনি নিঃসৃত হয়, ও তাহাতে ভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, কিম্বা দুগ্ধ পানেতে এই রোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ব্ববৎ।

এই রোগের তরুণাবস্থায় যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ঔষধের দ্বারা ছয় ঘণ্টার পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য বোধ না হয়, কিম্বা কিঞ্চিং উপশম বোধ হয়, আরও যদ্যপি পাকস্থলীর দোষ জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, ক্ষুধা শূন্যতা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ পদার্থে

আচ্ছাদিত, বমনেচ্ছা, উদ্যার বা, কখন কোষ্ঠাবরোধ কখন অতিসার হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি অজীর্ণ জন্য, বিশেষতঃ ফল, বা মূল ভক্ষণে অতি-সার হয়, অধিক পরিমাণে মল নিঃসৃত হয়, কিঞ্চিৎ যাতনা থাকে, বা কিঞ্চিৎ মাত্র আহার করিলেই পুনর্বার হয়, জলবৎ অপকৃভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত কটাবর্ণ, (বিশেষতঃ রাত্রিতে) অধিক অপরিমাণে মল নির্গত হয়, পিপাসা, এবং অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, প্রত্যেক বার বিরেচনের পর অর্দ্ধ মাত্রা পরিমাণে দিবেক ।

যদ্যপি মল নিঃসরণ কালীন যাতনা না থাকে, কিম্বা পশ্চাত্তাগে যাতনা বোধ হয়, রাত্রিতে কিম্বা আহার বা পানের পর, উদর ভঙ্গ হয়, ক্ষুধা না থাকে, কখন বা অতিরিক্ত ক্ষুধা হয়, পেট কঁাপে, এবং কামড়ায়, চক্ষুর দৃষ্টির হ্রাস হয়, আর যদ্যপি মলের সহিত, অপকৃ-ভুক্ত-দ্রব্য নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফেরম্, স্বতন্ত্র বা পুরোক্ত ঔষধের সহিত উপর্যুপরি রূপে পূর্ববৎ দিবেক ।

যদ্যপি মল জলবৎ পিত্ত মিশ্রিত, সবুজ বা পীতবর্ণ বা পিচ্ছিল হয়, এবং পাকস্থলী তার বোধ হয়, পেট কামড়ায় এবং কঠিন বোধ হয়, মুখে তিক্ত আন্বাদন থাকেও পিত্ত বমন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যেক বার বিরেচনের পর ।

যদ্যপি ভুক্ত দ্রব্য সূচকিত না হওয়াতে এই রোগ উপ-

স্থিত হইয়া থাকে, এবং বমননেচ্ছা, বমন, দুৰ্বলতা থাকে, ও বমন পাণ্ডুবর্ণ হয়, বিশেষতঃ এই রোগ শিশুর হইলে।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক বার বিরচনের পর।

পূৰ্বোক্ত ঔষধে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে, যদিপি আহারের দোষে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে অন্ন, ফল, বা গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন করিলে হইয়া থাকে বিশেষতঃ যদিপি প্রত্যেক বারের মল, বর্ণে বিভিন্ন হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—পডেসটিলা, পূর্ববৎ।

যদিপি জলবৎ পিচ্ছিল, ফোঁপড়া বিশিষ্ট পিত্ত মিশ্রিত বা ঈষৎ সবুজবর্ণ, বা রক্ত মিশ্রিত মল নির্গত হয়, এবং বিরচন কালীন জ্বালা বোধ হয়, ও হারীষ নির্গত হয়, শীত বোধ, কম্প, শীতল ঘর্ম, দৌর্বল্য থাকে, এবং মলের সহিত অপকু-ভুক্ত-দ্রব্য মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-করোসাইবস্, অর্দ্ধমাত্রা পূর্ববৎ।

প্রত্যেক বার অল্প পরিমাণে পিচ্ছিল এবং রক্ত মিশ্রিত মল অত্যন্ত বেগের সহিত নির্গত হয়, অতিশয় দৌর্বল্য থাকে, নাতিস্থলে অত্যন্ত কামড়ায়, কোষ্ঠাবরোধ, এবং অতিসার উপর্যুপরি হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা, চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক।

অতিশয় পেট কামড়ানির সহিত, যদি হাত পা কামড়ায়, এবং পূৰ্বোক্ত মত অতিসার হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—লোসিহিস্ পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায় (যে পর্য্যন্ত পেট কামড়ানি থাকে) এক এক বার করিয়া এবং পরেতে তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক।

আহারের দোষে অর্থাৎ অম্ল, কল, শীতল পানীয়, ইত্যাদি ব্যবহারে যদি উৎপন্ন হয়, এবং অত্যন্ত পেট কামড়ানির সহিত জলবৎ পিচ্ছিল ঝেঁষৎ সবুজ বর্ণ দুর্গন্ধ যুক্ত মল, জ্বালার সহিত নির্গত হয়, অতিশয় পিপাসা দৌর্বল্য ও ক্ষীণতা থাকে, রাত্রিতে বা আহারের পর রোগ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যেক অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর ।

এই ঔষধ শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

যদ্যপি পূর্কোক্ত ঔষধের, তিন, চারি, মাত্রা সেবনের পর, কিছু উপশম বোধ না হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি, সাময়িক দোষে হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাটম্, পূর্ববৎ স্বতন্ত্র রূপে অথবা পূর্কোক্ত ঔষধের সহিত উপর্যুপরি প্রকারে দিবেক ।

যদ্যপি এই রোগ ভয় হইতে, বা উত্তাপ কালীন শীত জন্ম হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যেক বার বিরেচনের পর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি অতিসার বহুকাল স্থায়ী হয়, এবং বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, আরও যদ্যপি, দুগ্ধ অসহ্য হয় তাহা হইলে, এবং যুবকদিগের অর্শঃ থাকিলে, বা শিশুর পক্ষে ।

ঔষধ—সলফর, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি পূর্কোক্ত ঔষধে, আরোগ্য বোধ না হয়, এবং কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ বহুকাল অবস্থিত হয়, এবং মলের

সহিত, অপকৃ-ভুক্ত-দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে, এবং যদ্যপি সময়ে সময়ে আপনি বিরেচন হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—এসিডম্ ফসফরিকম্, পূর্ণমাত্রা আট ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি এই রোগ পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবন জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—হেপাটিক্, এসিডম্-নাইট্রিকম্, কারো'-বেজিটেবিলিস্, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত, সেবন করিয়া পুনর্বার ছয় দিন পরে ঐ রূপ, ক্রমশঃ এই ব্যবস্থায়সারে চালাইবেক। মর্করি সেবনের দোষ জন্য হইলে, এই ঔষধ বিশেষ বিধেয়।

যদ্যপি ম্যাগ্নেশিয়া, (সল্ট) অধিক পরিমাণে ব্যবহার করাতে অতিসার হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—পল্লেসটিলা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি (ক্লোরাইড) অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করাতে, এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—পল্লেসটিলা, ক্যালোমিলা, ক্যালোসিষ্টিস্, নক্স-বমিকা, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ উক্ত প্রকারে সেবন করিবেক।

পথ্যব্যবস্থা।

যখন এই রোগের প্রবলতা থাকে, তৎকালে সহজে পরিপাক হয়, এমত পেষ্য দ্রব্য পথ্য করিবেক, যদ্যপি রোগীর দুৰ্দ্ধ সহ্য হয়, তাহা হইলে কক্ষিৎ পরিমাণে, দেওয়া যাইতে পারে, সাগুদানা, অরোরুট বা আতপ চাউলের মণ্ড, এবং ব্যবহার্য্য হইলে, মাংসের কাথ এক এক বারে অল্প পরি-

মাণে ব্যবহার করিবেক । রোগের তীব্রতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, অর চিকিৎসার ন্যায় ক্রমশঃ এক বেলা করিয়া অন্ত পর্য্য দিবেক, উদ্ভিজ্জ পদার্থ, বিশেষতঃ গোল আলু, প্রভৃতি এক কালীন নিষেধ, কাঁচা ফল বা অম্ল, বা কটুদ্রব্য মাত্র সর্ব্বতো ভাবে বর্জন করিবেক, মাংস, বা মৎস্যের ঝোলের সহিত অন্ত বিধেয়, বায়ু পরিবর্তন করা এরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

আমাশয় ।

লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠের বেগ, প্রত্যেক বার মল ত্যাগ কালীন মোচড়ানি, উদরে যাতনা, অম্প বা অধিক পরিমাণে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর বোধ, এবং কেবল আম, বা কেবল রক্ত, অথবা উভয় মিশ্রিত বিরেচন হয় । এই আমাশয় শ্বেত ও রক্ত ভেদেতে দুই প্রকার । অর্থাৎ প্রথমতঃ ক্ষুধা বিহীনতা কোষ্ঠাবরোধ, পেট ফাঁপা, বমনেচ্ছা, ইত্যাদি থাকিয়া পরেতে চর্ম্মের উষ্ণতা, নাড়ীর তীব্রগতি, পেটে বেদনা, এবং বিরেচনের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, পরেতে কেবল আম মাত্র নির্গত হয়, তখন তাহাকে শ্বেত আমাশয় কহে । এবং পরেতে তৎ পরিবর্তে রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে রক্তামাশয় কহে । যখন অর বিদ্যমান থাকে, তখন পুনঃ পুনঃ বিরেচন হয় । যদিপি এই রোগকে উপযুক্ত সময়ে দমন করা না হয়, তাহা হইলে অন্ত্র-নালের মধ্যে ঘা হইয়া বা স্ফুল্জক্ গলিয়া ক্রমশঃ রোগীকে অবসন্ন করে । যদিপি যাতনা সকল হঠাৎ নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল হয়, ও নাড়ী অতি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে অসাধ্য লক্ষণ বিবেচনা করিবেক ।

নিদান—ভিজা বা শোঁতা মূর্ত্তিকাতে শয়ন করা, পোলাও প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করা, অতিরিক্ত পানদোষ, (মদ্য পানাদি) জলীয় ফল, তরবুজ, লেবু, শশা, প্রভৃতি এবং অপকু অম্ল ফল, ভক্ষণ করা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা কৃমি দোষ, অন্যায্যরূপে অর্শঃ দমন করা ইহার কারণ বলা যাইতে পারে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি রোগের প্রারম্ভ কালে অতিরিক্ত জ্বর বোধ থাকে, এবং নাড়ী দ্রুত গতি বিশিষ্টা, চর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ থাকে, পেট কামড়ায়, মোচড়ানির সহিত পুনঃ পুনঃ অত্যম্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়, এবং ঘাড়ে ও মাথায় রাতের বেদনার ন্যায় বোধ হয়, পিপাসা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায় দুই বা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে, ক্লম্ববর্ণ রক্ত মিলিত দুর্গন্ধ মল নির্গত হয়, তলপেটে অত্যন্ত জ্বালায় ন্যায় যাতনা থাকে, প্রস্রাব অবরোধ বা আপনি প্রস্রাব নিঃসরণ হওয়া, মল দ্বারে এবং অত্যন্তরে জ্বালা করে, জিহ্বা ফাটা, শুষ্ক, ও ক্লম্ববর্ণ, ফিঙ্কা, অত্যন্ত পিপাসা, পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন, বা উকি, অত্যন্ত দুশ্চিন্তা, এবং অস্থিরতা, প্রলাপ বা বোধ শূন্যতা, পাণ্ডুবর্ণত্ব, নাড়ী অতি ক্ষীণ হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, দ্বিগুণ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর ত্রিগুণ উপশম বোধ হওয়া পর্য্যন্ত, এবং পরেতে ক্রমশঃ অধিক কাল অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি মুখ রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ হয়, রোগ আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রবল রূপ ধারণ করে, জিহ্বা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, ও তাহার পার্শ্ব শুষ্কবৎ, পেটের মধ্যে কামড়ানির ন্যায় যাতনা, পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠের বেগ, এবং বুখা উদ্বেগ, অত্যুপ পরিমাণে আমরক্ত নিঃসরণ হওয়া, গুল্ম দ্বারে অত্যন্ত বেগ, অতিশয় পিত্ত বমন, সন্ধ্যাকালে জ্বর বোধ, অতিশয় পিপাসা এবং নিদ্রা শূন্যতা থাকিলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণ মাত্রা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি উদরের মধ্যে এমত টানিয়া ধরা যাতনা বোধ হয় যে রোগী হেঁট হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, অত্যন্ত অস্থিরতা, পুনঃ পুনঃ বিরেচন, প্রথমতঃ ঈষৎ পীতবর্ণ, পরেতে রক্ত মিশ্রিত জলবৎ আম নির্গত হয়, প্রত্যেক বার বিরেচনের পর যাতনা থাকে না, এবং কিঞ্চিৎ আহার করিবামাত্র পুনর্বার যাতনা উপস্থিত হয়, তলপেটে ভার থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কলোমিহিস্, পূর্ণমাত্রা রোগের তীব্রাবস্থায় প্রত্যেক ঘণ্টায় এবং পরেতে অবস্থান্তর হইলে ক্রমশঃ অধিক কাল অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি কেবল রক্ত বা আম মিশ্রিত রক্ত নিঃসারিত হয় ও তাহার সহিত সূক্ষ্ম চর্ম্মের ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত থাকে, অধিক পরিমাণে আম এবং অল্প ভাগ রক্ত, বা রক্তের ভাগ অধিক, আমের ভাগ অল্প, কিম্বা কেবল সূক্ষ্ম আম নির্গত হয়, তলপেটে টানিয়া ধরে, বেগের সহিত হারীষ নির্গত হয়, এবং শূলবৎ বেদনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কল্‌চকম্, পূর্ববৎ

যদ্যপি মূত্র-স্থলীতে বেগ বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, অত্যুপ মাত্র অতি কষ্টে প্রস্রাব হয়, রক্ত বা আম

মিশ্রিত রক্ত নিঃসরণ কালীন উদরে জ্বালাবৎ যাতনা বোধ হয়, অত্যন্ত প্রবল জ্বর থাকে, মুখ শুষ্ক, পিপাসা, অস্থিরতা ও নাড়ী কঠিনা এবং ক্ষুদ্রা হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাস্‌সারাইডিস্, পূর্ববৎ ।

রক্ত মিশ্রিত আম, বা কেবল আম, পুনঃ পুনঃ অতিশয় বেগের সহিত এক বারে অত্যাঙ্গ মাত্র নিঃসৃত হয়, কিম্বা যৎ কালীন শূলবৎ যাতনা নিবারিত হইয়া, কেবল চাপিয়া ধরার ন্যায় যাতনা অবশিষ্ট থাকে, সায়ং কালীন জ্বর বোধ, পিপাসা, মুত্রস্থলী কষিয়া ধরা, তলপেটে টানিয়া ধরা, মানসিক উদ্বেজন্য থাকিলে,

ঔষধ—ক্যাপ্সিকম্, পূর্ববৎ ।

ছূর্ণজ যুক্ত বিরেচন, অত্যন্ত দৌর্বল্য, আর যদ্যপি গুহ্ব-
দ্বারে মল ত্যাগের পর জ্বালা বোধ হয়, আন্তরিক জ্বালার ন্যায়
রোগীর যাতনা থাকে এবং শরীরের উপরে শীতল বোধ হয়,
তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ এবং ইহাতে আরোগ্য বোধ
না হইলে, চায়না, উক্ত রূপে দিবেক ।

যদ্যপি আহারে নিতান্ত অনিচ্ছা থাকে, বমন, এবং বম-
নেচ্ছা হয়, কপালে মাথা ধরা বোধ হয়, অত্যন্ত মল ত্যাগের
বেগ বোধ হয়, এবং যদ্যপি হস্ত পদাদির, কাম্‌ডানি থাকে
ও রোগের কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে দৌর্বল্য থাকে তাহা
হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পুনঃ পুনঃ রক্ত মিশ্রিত আম, অঙ্গ পরিমাণে
নিঃসৃত হয়, কিম্বা ঈষৎ সবুজবর্ণ, দলারক্ত মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত

পেট কাম্‌ড়ানির সহিত ও অসহ্য বেগের সহিত আম নির্গত অথবা কেবল রক্তস্রাব হয়, আরও যদি অতিশয় দুর্গন্ধ পিষ্ট মিশ্রিত আম নিঃসৃত হয়, পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ হইয়া পুনঃ পুনঃ বমন হয় এবং পেটের ভিতর অতিরিক্ত রূপে শূলবৎ বেদনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-করোসাইবস্, পূর্ণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায়, এক ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে কিঞ্চিৎ উপশম হইলে দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পেটের ভিতর ছিন্ন করার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ মাত্র, অত্যন্ত কোষ্ঠের বেগ, জ্বালা, এবং কাঁচা মাংস খণ্ডের ন্যায় রক্ত মিশ্রিত আম নির্গত হয়, কখন কখন নিবিড় সবুজবর্ণ আম, রক্ত মিশ্রিত থাকে, প্রত্যেক বার বিরেচনের পর এবং পূর্বে বেগ থাকে, অথবা বিরেচনের পর অধিক বেগ হয়, নিশ্চেষ্ট থাকিলে কিঞ্চিৎ শান্তি এবং গমনাগমনে বৃদ্ধি বোধ হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্, পূর্ববৎ ।

কঠিন মল খণ্ডের সহিত রক্ত মিশ্রিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে আম নির্গত হয়, অত্যন্ত কোষ্ঠে বেগ থাকে, নাভিস্থলের চতুষ্পাশ্বে কাটিয়া ফেলার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, অত্যন্ত উত্তাপ, অতিশয় পিপাসা এবং বিরেচনের পর গুহ্বারের অভ্যন্তরে টানিয়া ধরার ন্যায় যাতনা, প্রস্রাব বন্ধ এবং বৃথা প্রস্রাবের বেগ ও রাত্রি শেষে এবং প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, দ্বিগুণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায় এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর এবং ত্রালাবস্থায় পূর্ণ মাত্রা ঐ রূপে ।

পীতবর্ণ আম, রক্ত মিশ্রিত হইয়া তলপেটে যাতনার সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে, নির্গত হয়, নাভিস্থলে জড়া-ইয়া ধরা এবং ছিন্ন করার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ শীত বোধ, এবং রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি হইলে ।

ঔষধ—পেট্রোস্টিলা, পূর্ণ মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায় বা দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

অত্যন্ত দৌর্বল্য এবং বেগের সহিত রক্ত মিশ্রিত আম, অথবা রক্তের ন্যায় আম কিঞ্চিৎ পরিমাণে, নির্গত হয়, এবং পুনর্বার নির্গত হইবে এমনত বোধ হয়, অসাধারণ জ্বর বোধ, রাত্রিতে ঘর্ম ও শরীরে কম্প হইলে ।

ঔষধ—পিট্রোলিয়ম্, পূর্ণমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি মল দ্বারে অত্যন্ত বেগ থাকে অথচ কিছুই নির্গত হয় না বা কিঞ্চিৎ মাত্র রক্ত মিশ্রিত আম নির্গত হয়, এবং অধিক কাল বেগ দিয়া যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আম নির্গত হয়, বা কিছুই নির্গত হয় না, নিয়ত পিপাসা, অতিশয় উত্তাপ, এবং নাড়ীর গতি অসমান থাকিলে ।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্, পূর্ণমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর পূর্ববৎ ।

যদ্যপি কেবল রক্ত মাত্র নির্গত হয়, অন্ত্র মধ্যে এবং পাকস্থলীতে নিয়ত ছেদন করার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, উদ্বার উঠে, জ্বর বোধ থাকে, মল ত্যাগ কালীন গুহদ্বার জ্বালা করে এবং পরেতে শূলবৎ যাতনা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্লুম্বম্, পূর্ববৎ ।

যখন আমাশয় কালীন যন্ত্র কার্যের ত্রাস অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিকার চিহ্ন লক্ষিত হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়,

রাত্রিকালে আপনিই (কোন যাতনা ব্যতিরেকে) আম নিগত হইয়া যায়, প্রস্রাবের অধারণতা, নাসিকা দ্বার দিয়া রক্ত স্রাব, সন্ধ্যাকালে শীত বোধের পর উষ্ণতা, অতিশয় পিপাসা থাকিলে ।

ঔষধ—রস-টক্সিকোডেন্ড্রন, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অন্যান্য ঔষধে কিঞ্চিদ্মাত্র উপশম বোধ হইয়া তদবস্থায় থাকে, এবং রোগ প্রাচীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অত্যন্ত শূলবৎ যাতনা থাকে, অতিরিক্ত বেগের সহিত রক্ত মিশ্রিত আম নিগত হয়, কিম্বা কেবল আম নিগত হইবার পূর্বে তলপেটে ছেদনের যাতনা হয়, বিশেষতঃ যে রোগীর অর্শঃ থাকে তৎপক্ষে ।

ঔষধ—সলফর দশটাক্সুদ্র বটিকা অর্ধ ছটাক জলের সহিত এক কালীন সেবন করিবেক ।

যদ্যপি জলবৎ মলের অংশ, আমের সহিত নিগত হয়, বমন ও অসাধারণ দুর্বলতা, পা কামড়ায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, শীতল ঘর্ম্ম নিগত হয়, দিন অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক বার বিরেচন হয়, এবং প্রত্যেক বার বিরেচনের পর শূলবৎ যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, অর্ধমাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টায়, কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে ক্রমশঃ অধিক কাল অন্তর দিবেক ।

আমাশয় রোগ হঠাৎ অন্যায়া উপায় দ্বারা দমন করা হইলে তাহার ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি কোন ঔষধ দ্বারা হঠাৎ আমাশয় নিবারিত হইয়া অত্যন্ত যাতনা, নিঃশ্বাস প্রস্বাসে কষ্ট, বমনেচ্ছা, উকি, পেট

কষিয়া ধরা, মল এবং মুত্রের অবরোধ, মুখ, জিহ্বা, হস্ত, পদাদির অগ্রভাগ শীতল, শরীরের নানা স্থানে খেঁচনি, ও তাহা বাক্য বা কোন প্রকার ক্রিয়া দ্বারা বৃদ্ধি হয়, এবং যদ্যপি প্রদাহ বিশিষ্ট কোন প্রকার লক্ষণ উপস্থিত থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর, এবং দ্বিধিৎ উপশম হইলে তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি অঙ্গগ্রহ বা শীতল ঘর্ম্ম প্রবল হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কুশুম্, অর্দ্ধমাত্রা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অস্ত্র মধ্যে কোন প্রকার প্রদাহ বিশিষ্ট শূলবৎ যাতনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেল্‌ডোনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি শূলবৎ অত্যন্ত যাতনা থাকিয়া পেট কষিয়া ধরে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কলোসিস্টিস্, পূর্ববৎ প্রত্যেক ঘণ্টায় ।

যদ্যপি হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল হয় এবং উকি হয় ও না হয়, অথবা শীতল নিঃশ্বাস বহে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

ষবের কাথ বা ষবের মণ্ড এবং সহজে পরিপাক হয় এমন দ্রব্য ব্যবস্থা করিবেক, বিশেষতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায় মাংসের কাথ এক এক বারে অল্প পরিমাণে দিবেক । এতদ্ভিন্ন উদ্ভিজ্জ কল মুলাদি, কষ্টেতে পরিপাক হয়, এমন দ্রব্য, অম্ল, শাক প্রভৃতি এবং মাদক দ্রব্যাদি এক কালীন বর্জন করিবেক । এই

রোগ শিশুর হইলে পেটের উপরে এক খানি অল্প পরিসর ক্লানেল জড়াইয়া দিবেক ।

ভেদ বনি অর্থাৎ ওলাউঠা ।

লক্ষণ—বমনেচ্ছা, বমন, তণ্ডুল' ধোওয়া জলের ন্যায় বিরচন । প্রথমতঃ হঠাৎ বমনেচ্ছা, পেট কঁষিয়া ধরা আরম্ভ হইয়া পরেতে অতিসার এবং বমন আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ শরীর, বিশেষতঃ হস্ত পদাদির অগ্রভাগ, শীতল হয়, ঘনশ্বাস, অত্যন্ত তৃষ্ণা, পা কামড়ান এবং কখন কখন হাতও কামড়ায়, উদরের মাংসপেশী টানিয়া ধরা, চক্ষুঃ বসিয়া যায়, নাড়ী ক্ষীণা, কখন কখন কদাচিৎ বোধ হয়, পাতলা জলবৎ দুর্গন্ধ বা পিত্ত বিশিষ্ট বিরচন, কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত বমন, অস্থিরতা ইত্যাদি ।

নিদান—কুমি, অখাদ্য, অপরিপাচ্য দ্রব্য, ফল, বা অপকৃ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ভক্ষণ, সময়ের পরিবর্তন, জলীয় প্রদেশে বাস বা জলীয় সময়, হঠাৎ শীতল-স্পর্শ দ্বারা ঘর্ষের অবরোধ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, এবং অতিরিক্ত শ্রান্তি, অত্যন্ত উত্তাপিত সময়ে অতি শীতল পানীয় দ্রব্য ব্যবহার, এবং বালকের দন্ত উঠিবার সময়, বা স্ত্রীলোকের গর্ভ সময়ের জন্য ও হইয়া থাকে ।

আভিসারিক ভেদ ।

লক্ষণ—প্রথমতঃ অপকৃ-ভুক্ত-দ্রব্য, 'নির্গত' হয়, কিঞ্চিৎ পরে হরিদ্রাক্ত কটাশিয়া বর্ণ, বা জলবৎ ভেদ' হয়, এবং অল্প ঘটিকা বা কিয়দ্বিষস পরে, যব বা চাউলের কাঁথের ন্যায় নির্গত হয়, চরণে দুর্বলতা বোধ, মোচ্‌ডানি, জিহ্বা পরিষ্কৃত, বা

ঈষৎ আচ্ছাদিত, এবং কখন কখন, এমত আঠাল বোধ হয়। যৌতাহার উপর অঙ্গুলি দিলে বদ্ধ হয়, প্রত্যেক বার, ভেদের পূর্বে, পেট ডাকিয়া এবং চালিত হইয়া ভেদ হয়, সেই ডাক কখন কখন, বায়ু নিঃসরণের শব্দের ন্যায়, বা কখন কখন জলের গতির শব্দের ন্যায় বোধ হয়, রোগীর মুখ নীলবর্ণ দেখায়। হস্ত, জিহ্বা শীতল স্পর্শ হয়, শিরার বল হ্রাস হয়, এবং নাড়ী দুর্বল হয়, আরও কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত চিকিৎসিত না হইলে পরেতে বমি হয়, এবং অন্যান্য লক্ষণ সকল বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ বিকার প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হয়।

আতিসারিক ভেদের চিকিৎসা।

প্রথমতঃ পরিস্কৃত কপূরের আরক পাঁচ ফোটা করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণ চিনির সহিত প্রত্যেক বার ভেদের পর এক এক বার (তিন বা চারি মাত্রা, পর্য্যন্ত) দিবেক এবং রোগীকে কয়ল প্রভৃতি মোটা পশমের বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবেক। যদিপি জ্বর আসিয়া ঘণ্টা হয়, শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

আর যদিপি উক্ত প্রকারে শীঘ্র উপশম বোধ না হয়, জিহ্বার উপর আঠার ন্যায় বোধ হয়, এবং বাহুর উর্দ্ধ বা অধঃ বা কজায়, বা হস্তে খেঁচনি আরম্ভ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—এসিডম্-ফস্ফরিকম্, ৩০ পূর্ণ মাত্রা প্রত্যেক বার বমন বা বিরেচনের পর দিবে।

ভেদ বা বমনের পর ।

যদ্যপি ভেদ কালীন, বমনেচ্ছা, এবং শূলবৎ যাতনা থাকে, এবং জিহ্বার উপর, শ্বেত বা কটাবর্ণ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফস্ফরস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জিহ্বার উপর, হরিদ্রাবর্ণ হয়, এবং কণ্ঠের সহিত অতিসার হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, ১২ পুর্ণমাত্রা প্রত্যেক বার ভেদের পর, এক এক বার করিয়া দিবেক ।

উক্ত সমস্ত ঔষধ, রোগের তীব্রতা সময়ে, উক্ত প্রকারে, দিবেক এবং কিঞ্চিৎ সাম্য হইলে, দ্বিতীয় বার বমন বা বিরেচনের পর দিবেক ।

রসাপ্রিত ভেদ ।

লক্ষণ—এই প্রকার ভেদে, পুনঃ পুনঃ বা নিয়তই, বমন হয়, এবং অন্যান্য প্রকার ভেদের লক্ষণ ও থাকে, প্রথমতঃ পাকস্থলীর মধ্যে যে ভুক্ত দ্রব্য বা পীত দ্রব্য থাকে, তাহা উঠিয়া পড়ে, উঠিবার পূর্বে, উকি না হইয়া এক কালীন হঠাৎ ঝাঁকের সহিত উঠে, কখন কখন বমনের পূর্বে বমনেচ্ছা হয়, রোগ আরম্ভ কালীন প্রায় অতিসার থাকে না, অথবা এক কি দুই বার ভেদ হয়, ও প্রস্রাবের অস্পত্তা হয়, এই প্রকার ভেদ প্রায়, অতিশয় ভয়ানক হয় না, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য বা গুরুপাক দ্রব্য, ভোজন জন্য পেট কাঁপিয়া ইহা উপস্থিত হয় ।

রসাপ্রিত ভেদের চিকিৎসা ।

এই রোগ প্রথমতঃ আরম্ভ হইলে ।

ঔষধ—কপূরের আরক, এক কোটা করিয়া, কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত চিনির সহিত পাঁচ মিনিট অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি শীঘ্র উপশম বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, ১২ পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক বার বমনের পর দিবেক এবং পরেতে, আবশ্যক হইলে, (ইপিক্যাকুয়ানা) ঐ মতে দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত দুই ঔষধ প্রয়োগের পর, বমন বন্ধ হইয়া অন্যান্য লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে, এবং পাকস্থলীতে ভার বোধ, ও অস্ত্র মধ্যে এবং মস্তকে যাতনা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, ৩০ উক্ত প্রকারে দিবেক ।

যদ্যপি এই রোগ রাগ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, ১২ ঐ রূপে ।

পূর্কোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগের পরেতেও যদি আরোগ্য বোধ না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার (বেরাট্রম্ বা লক্ষণানুসারে অন্যান্য ঔষধ দিবেক ।)

অঙ্গগ্রহ দিশিক ভেদ ।

লক্ষণ—এই ভেদঅঙ্গ গ্রহ, বা খেঁচনি দ্বারা লক্ষিত হয়, তাহার বিশেষ লক্ষণ এই যে হস্তের এবং চরণের অঙ্গুলিতে, খেঁচনি, বা খিল ধরে, পা কামড়ায়, চরণে এবং হস্তের মাংসপেশী সকল টানিতে থাকে, এবং ঐ রূপ খেঁচনি, বাছতে, উরুদেশে, এবং কখন কখন কেবল বক্ষঃস্থলে, ঘাড়ে চোয়ালে, হয়, এই লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার পূর্বে বমন হয়, সাধারণতঃ

অতিসার বা বমন কিছুমাত্র থাকে না, পেট কঠিন হইয়া ফুলিয়া উঠে, দন্ত চাপিয়া থাকে, ও কড়্ মড়্ করে, শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়, অতি কষ্টে গিলিতে পারে, এবং এই সকল লক্ষণ হঠাৎ অন্তর্হিত হয় তৎকালে, রোগী কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে কিন্তু পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ আসিয়া উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ কপূরের আরক পূর্ব্বের ন্যায় কিঞ্চিৎ চিনির সহিত এক ফোটা করিয়া পাঁচ মিনিট অন্তর দিবেক, অথবা তীব্র হইলে দুই ফোটা করিয়া দুই বা তিন মিনিট অন্তর, উক্ত ঔষধ দ্বারা অঙ্গ গ্রহ নিবারণের পর পুনর্ব্বার না হয়, অথবা প্রথমতঃ নিবারণ জন্য।

ঔষধ—কুপ্রম্, পূর্ণমাত্রা অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক, আবশ্যক হইলে (বেরাট্রম্,) ১২ ঐ রূপে দিবেক।

শুষ্ক ভেদ।

লক্ষণ—এই প্রকার রোগে বমন বা অতিসার কিছুই থাকে না, শরীরের বলের সামান্যতঃ হ্রাস না করিয়া ইহার প্রথম উদ্যমে, শরীরের কোন স্থান বিশেষে, অঙ্গুলির অগ্র ভাগে ক্লম্বর্ণ লক্ষিত হয় এই রোগের প্রবলাবস্থা উপস্থিত হইলে হঠাৎ শরীরের শক্তি নাশ হইয়া যায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, জিহ্বা নীল বা ঈষৎ ক্লম্বর্ণ হয়, চক্ষুঃ, শিবনেত্রবৎ অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া, স্থির হইয়া থাকে, সমুদয় শরীর শীতল, আঠাল, ঘর্মে আবৃত হয়, জ্বর এবং নাড়ী, বোধ থাকে না।

চিকিৎসা ।

অন্যান্য প্রকারের ন্যায় এ প্রকারেও প্রথমতঃ

ঔষধ—কপূরের আরক দিবেক কিন্তু ইহা এক বা দুই ফোটা করিয়া প্রত্যেক বার পাঁচ মিনিট্ অন্তর দেওয়া কর্তব্য এবং পরেতে ঔষধ বেরাট্রম্, অর্ক বা এক বা দেড় ঘণ্টা অন্তর পূর্ণমাত্রায় দিবেক ।

যদ্যপি অঙ্গ গ্রহ এবং বমন সম্পূর্ণরূপে নিবারিত থাকিয়া, রোগী শীতল, নীলবর্ণ, ও নাড়ী শূন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঘোরতর বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ণ মাত্রায় পূর্ক রূপে দিবেক ।

এই ঔষধ প্রয়োগে যদ্যপি নাড়ী বোধ হয়, এবং পুনর্বার অঙ্গগ্রহ, বমন, বা ভেদ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পরেতে লক্ষণানুসারে বেরাট্রম্, কুপ্রম্, বা অন্যতর ঔষধ দিবেক ।

প্রথম ভেদ ।

লক্ষণ—এই প্রকারে পূর্বোক্ত প্রকার সকলের চিহ্নিত লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং নিবারিত না হইলে, ঘোরতর বিকার গ্রস্ত হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয় । এই রোগে রোগী মস্তকে ভার বোধ করে, বা মূর্ছিত হয়, বক্ষঃস্থলে ক্লেশ থাকে হস্ত পদাদি বল হীন হইয়া যায়, এবং পরেতে শরীরের উত্তাপ, নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী হয়, বমনেচ্ছা উকি বা বমন হয়, জলবৎ বা পিত্ত ভেদ হয়, প্রস্রাব অবরোধ, জিহ্বা শীতল, স্বরের বিকৃতি, বদন হরিদ্রাক্তবর্ণ, চক্ষুর চতুষ্পাশ্ব নীলবর্ণ রেখার দ্বারা ঘেরা, শক্তিহীনতা, অঙ্গগ্রহ, প্রথমতঃ চরণে পরে হস্তে, এবং ক্রমশঃ বাহু ও উরুতে বোধ হয়, চরণাদি

শীতল হয়, চক্ষুঃ বসিয়া যায়, পরেতে আঁতসার ও অঙ্গগ্রহাদি কিছুই থাকে না, ঘোরতর বিকার প্রাপ্ত হয়, শীতল ঘর্ম হয়, নাড়ী বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদি রোগী বলবান্ হয়, তাহা হইলে, প্রথমতঃ ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, ১২ পূর্ণ মাত্রা পূর্ণ প্রকারে তিন বার দিয়া বেরাট্রম্, ৩০ ঐ রূপে দিবেক ।

যদ্যপি এই প্রকার বা অন্য প্রকার ভেদ রোগে অল্প মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও শূলবৎ বেদনা, অতিশয় দৌর্বল্য, বা অস্থিরতা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, উক্ত রূপে উক্ত প্রকারে সময়ান্তরে দিবেক ।

আত্মিক রসাপ্রিত ভেদ রোগ ।

লক্ষণ—এই রোগে প্রথমতঃ ভুক্ত-দ্রব্য বমন হয়, এবং মল নিঃসারিত হয়, পরেতে ক্রমশঃ পাতলা হইয়া জলবৎ ও শেষে চাউল খেওয়া জলের ন্যায় নির্গত হয়, যদ্যপিও এই প্রকারে উর্দ্ধ বমন, এবং অধো-নিঃসারণ বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু পরেতে অঙ্গগ্রহ, শরীর, অতিশয় শীতল, নীলবর্ণত্ব, নাড়ী হীন হইয়া সম্পূর্ণ বিকার প্রাপ্ত্যানন্তর অত্যপ্স সময়ের মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হয় ।

চিকিৎসা।

এই প্রকারের প্রথমে, কপূরের আরক, এক ফোটা করিয়া পাঁচ মিনিট অন্তর দিলে প্রায় আরোগ্য হয়।

যদ্যপি অতিরিক্ত পরিমাণে জলবৎ ভেদ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—বেরাট্রম্ ১: প্রথমতঃ পূর্ণমাত্রা তিন চারি বার এক ঘণ্টা অন্তর দিয়া পরেতে বেরাট্রম্ ৩০ ঐরূপে দিবেক।

আমাশয়াশ্রিত ভেদ রোগ।

লক্ষণ—এই প্রকারে প্রথমতঃ তলপেটে বেদনার সহিত ভেদ আরম্ভ হয়, অধিক পরিমাণে জলবৎ বিরেচন, পরেতে তণ্ডুল ধৌত জলের ন্যায় হইয়া থাকে, কিছু কাল পরে, পরিমাণে অম্প হয় এবং ভেদের সহিত আম মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়, পরেতে তাহা রক্ত যুক্ত হয়, এই রোগ যদি কিছু দিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে, তণ্ডুল ধৌত জলের পরিবর্তে রক্ত মিশ্রিত আম বা কেবল রক্ত নির্গত হয়, ইহার দ্বিতীয়াবস্থায় বা রোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে পাকামড়ানি থাকে।

চিকিৎসা।

এই রোগে বিশেষতঃ বালকের ভেদ হইলে, কদাচই কপূরের আরক ব্যবস্থা করিবেক না, যদি কর্তব্য হয় তাহা হইলে এক ফোটার চতুর্থাংশ মাত্র পোনের মিনিট্ বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবেক।

পরেতে বেরাট্রম্, ১২ বা ৩০ পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক বার ভেদের পর এক এক বার করিয়া দিয়া ক্রমশঃ ভেদের অস্পত্তা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-বাইবস্, ১২ প্রথমতঃ পূর্ণমাত্রায় এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর দিয়া পরেতে মর্কিউরিয়স্-বাইবস্, ৩০ ঐ রূপে দিবেক, পরেতে আম চিক্ দূর হইলে। ঔষধ সন্ধ্যা ৩০ ঐ রূপ।

যদ্যপি তৎকালে প্রদাহ বিশিষ্ট জ্বর বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে উক্ত ঔষধ দেওয়ার পূর্বে দুই তিন মাত্রা একো-নাইট্ দিবেক।

ভেদ রোগের অবস্থান্তরের বিশেষ চিকিৎসা।

এই রোগে চারি অবস্থা ঘটিয়া থাকে প্রথমতঃ আক্রমণ, দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ প্রকাশ, তৃতীয়তঃ বিকার, চতুর্থতঃ প্রতিকৃতি।

প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যে সময়ে জলবৎ জৈবৎ শ্বেতবর্ণ ভেদ হয়, কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে হয় না, কখন কখন বমনেচ্ছা থাকে, পাতলা মল সংযুক্ত বিরেচন হয়, কিম্বা অল্প পরিমাণে অতিসার বা দুই এক বার বমন হয়, তৎকালে, প্রধান ঔষধ কপূরের আরক, ফস্ফরস্, এসিডম্-ফস্ফরিকম্, এবং বেরাট্রম্।

দ্বিতীয় অবস্থায় যখন পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে চাউল ধোওয়া জলের ন্যায় ভেদ হয়, কিম্বা ঐ প্রকার বমন হয়, বা হস্ত পদাদিতে খেঁচনি থাকে বা জিহ্বা শীতল বা শরীরের কোন কোন অংশ কৃষ্ণবর্ণ হয়, অথবা চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ হয়, বমন অথবা উদরে মোচ্ড়ানি এবং জলবৎ ভেদ হয়, অথবা

বমন ও বিরেচন তুল্যভাবে থাকে জলবৎ ভেদ হয়, আমের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, এবং এই অবস্থার শেষে আরোগ্য বা বিকার প্রাপ্ত হয়, এমত সময়ে প্রধান ঔষধ কপূরের আরক বেরাট্রম্, কুপ্রম, ফস্-ফরস্, এসিডম্-ফস্ফরিকম্ এবং আর্সেনিকম্ ।

তৃতীয় অবস্থায় নাড়ী বোধ হয় না, চৰ্ম্ম, শীতল, নীলবর্ণ এবং জড় জড় হয়, স্বর বসিয়া যায়, প্রস্রাব এবং অন্যান্য মলাদি এক কালীন বন্ধ, চক্ষুঃ, বসিয়া যাওয়া ও উপরে তোলা, অথবা স্থির হইয়া এক দৃষ্টে থাকা, এই অবস্থা দুই ঘণ্টা হইতে দুই দিবস পর্য্যন্ত থাকে, ইহার পরিশেষে মৃত্যু বা আরোগ্য বা কোন প্রকার প্রদাহ বিশিষ্ট বা অন্যতর রোগ উৎপন্ন হয়, যদিপি এই অবস্থার পর কিঞ্চিৎ নাড়ীর বোধ, উষ্ণতা এবং বমন ও বিরেচন পুনর্বার আরম্ভ হয় তাহা হইলে শুভ চিহ্ন জানা যায়, কিন্তু ইহার পরেও পুনর্বার মৃত্যুর আশঙ্কা হইতে পারে, এই অবস্থার প্রধান ঔষধ, কুপ্রম্, আর্সেনিকম্, কার্বো-বেজিটেবিলিস্, এবং সিকেল্ । আর যদিপি বিকারকাল কেবল আংশিক মাত্র হয়, অর্থাৎ বিকারের চিহ্নের পর পুনর্বার ভেদ বমনাদি আরম্ভ হয়, তৎকালে ঔষধ, কপূরের আরক এবং বেরাট্রম্, এই সকল ঔষধ ব্যবহারের পক্ষে ওলাউঠার চিকিৎসা বিষয়ে যেকপ মাত্রা এবং সময় পূর্বে কথিত হইয়াছে তদনুসারে দিতে হইবেক ।

চতুর্থ অবস্থার প্রদাহ বা জ্বর উপস্থিত হয়, এই সময়ে সদৃশ-ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসিত হইলে, অন্য কোন উপসর্গ থাকে না, কেবল কখন কখন প্রস্রাব বন্ধ থাকে; এই কালে দ্বিতীয় অবস্থার ন্যায় লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে সেই অবস্থার ঔষধ

সকলের দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবেক, আর যদ্যপি প্রস্তাব করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা হইলে ঔষধ ক্যাষ্টারিস্ ৩০ পূর্ণমাত্রায় এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

অরু থাকা অবস্থার বা আন্তরিক অন্য কোন প্রকার প্রদাহের অবস্থার, ঔষধ, একোনাইট্, এক ঘণ্টা অন্তর পূর্ণমাত্রায় দিয়া পরেতে উপস্থিত লক্ষণানুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করিবেক ।

যদ্যপি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ... বেলোডোনা ।

ফুস্-ফুস্ যন্ত্র আক্রান্ত হইলে ... { ট্রায়োনিয়া, এবং অবস্থা
বিবেচনায় রস্-রেডিক্যান্স ।

পাকস্থলী অথবা আন্ত্রিক যন্ত্র আক্রান্ত হইলে ... { নক্স-বমিকা, এবং
ট্রায়োনিয়া ।

মূত্রস্থলী আক্রান্ত } ক্যাষ্টারিস্, আর ইহা অন্তের শেষ ভাগে
হইলে ... { খেঁচনি, এবং জ্বালা থাকিলেও ব্যবহার করা যায় ।

চতুর্থ অবস্থার প্রধান ঔষধ সর্কোথ্রুই রস্-রেডিক্যান্স ।

যদি অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকে, তাহা হইলে চায়না ।

সর্বতোভাবে রোগীকে আরোগ্য করিতে শেষ ঔষধ সলফুর্ পূর্ণমাত্রা দীর্ঘ কাল অর্থাৎ আট বা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া প্রত্যহ সেবন করিবেক ।

ভেদ রোগের লক্ষণানুসারে চিকিৎসা ।

প্রস্তাব ।

প্রস্তাব এককালীন বদ্ধ হইলে ... { কপূরের আরক, ক্যাষ্টারিস্,
বেরাট্রম্ ।

প্রস্তাব বদ্ধ হইয়া রুধা বেগ থাকিলে ... ক্যাষ্টারিস্ ।

প্রশ্রাব অল্প পরিমাণে হইলে... { কার্বো-বেজিটেবিলিস্, কুপ্রম্,
সিকেল্ ।

প্রশ্রাবের অল্পতা হইলে ... কুপ্রম্, বেরাট্রম্ ।

স্বর ।

স্বর কর্ণে হইলে ... মকার্বো-বেজিটেবিলিস্, কুপ্রম্, বেরাট্রম্ ।

সম্পূর্ণ স্বর বন্ধ হইলে ... কার্বো-বেজিটেবিলিস্, কুপ্রম্ ।

বক্ষঃস্থল ।

বক্ষঃস্থলে যাতনা থাকিলে ... আসেনিকম্, বেরাট্রম্ ।

নিঃশ্বাস শীতল বহিলে ... কার্বো-বেজিটেবিলিস্, আসেনিকম্ ।

বক্ষঃস্থল চাপিয়া থাকিলে ... কুপ্রম্, এবং বেরাট্রম্ ।

বক্ষঃস্থলে কামড়ানী থাকিলে ... { সাইকিউটা, কুপ্রম্, সিকেল্,
বেরাট্রম্ ।

বক্ষঃস্থলের মাংসপেশিতে খেঁচনি
থাকিয়া নিয়ত বমন হয় ও চক্ষুঃ
উপরে তোলা থাকে ।... { কপূরের আরক, সাইকিউটা,
বেরাট্রম্ ।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বোধ হইলে .. { কার্বো-বেজিটেবিলিস্,
কুপ্রম্, আসেনিকম্ ।

খেচনি বা খিল লাগা ।

যদি বাহ্যতে খেঁচনি থাকে এসিডম্-ফস্ফরিকম্, সিকেল্ ।

হস্তে হইলে এসিডম্-ফস্ফরিকম্, সিকেল্ ।

কঁবজায় হইলে এসিডম্-ফস্ফরিকম্ ।

অঙ্গুলিতে হইলে সিকেল্, বেরাট্রম্, আর্গিকা ।
 চরণ শীতল হইলে একোনাইট্, ফস্ ফরস্, বেরাট্রম্ ।
 উরুদেশে হইলে কপূ'রের আরক, বেরাট্রম্ ।
 মাজায় হইলে কলোসিস্, ফস্ ফরস্ ।
 পায়ের ডিমে হইলে কপূ'রের আরক, কুপ্রম্, বেরাট্রম্ ।
 যদি তাহার সহিত পাকস্থলীতে } আর্সেনিকম্, ফস্ ফরস্,
 জ্বালা থাকে } কপূ'রের আরক ।
 পায়ের পাতায় থাকিলে কপূ'রের আরক, সত্ফর ।
 গুল্ফে থাকিলে কাল্কেরিয়া, সত্ফর ।
 পায়ের অঙ্গুলিতে থাকিলে ... সিকেল্, সত্ফর, কাল্কেরিয়া ।

নাড়ী ।

যদ্যপি নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী হয় { কার্বো-বেজিটেবিলিস্, নক্স-
 বমিকা, রস-রেডিক্যান্স ।
 নাড়ী ক্ষীণ এবং মৃদু হয় কপূ'রের আরক, বেরাট্রম্ ।
 নাড়ী কদাচিৎ পাওয়া যায় { রস-রেডিক্যান্স, বেরাট্রম্, সিকেল্,
 এসিডম্-ফস্ ফরিকম্ ।

নানাবিধ মিশ্র লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা ।

আন্তরিক জ্বালা, শিরো-লুঠন, মূত্ৰ্যর } আর্সেনিকম্ ।
 আশঙ্ক থাকিলে }
 পক্কাশয়ে ও তলপেটে জ্বালা ... আর্সেনিকম্, কপূ'রের আরক ।
 মস্তিষ্ক এবং তলপেটের পীড়া ... বেলুডোনা ।
 বিকার কলীন অভিসারাদি } আর্সেনিকম্, কার্বো-বেজিটেবিলিস্,
 কিছু থাকে না ... } কুপ্রম্ ।

ভেদ না হইতেই প্রথমে বিকার ... কপূরের আরক বেরাট্রম্ ।
সামান্যতঃ সর্বত্র খেঁচনি ... কপূরের আরক, কুপ্রম্, বেরাট্রম্

পথ্য ব্যবস্থা।

এই রোগ অতি জ্ঞানক, অতএব ইহার প্রবলতা সময়ে কেবল অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে এক এক বারে শীতল জল মাত্র দিবেক, এবং পরেতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, যবের কাথ বা আতপ চাউলের কাথ, উপযুক্ত বোধ হইলে, বল রক্ষার জন্য তাহাতে মাংসের কাথ মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিবেক। কোন প্রকারে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পাকস্থলীকে ভারাক্রান্ত করিবে না, রোগের বিরতি হইলে উত্তম স্তূপক অন্ত্র কেবল মৎস্যের ঝোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ পথ্য দিবেক। পরেতে ক্রমে ক্রমে আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক, অর্থাৎ ক্রমশঃ দেশীয় প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে প্রস্তুত তরকারি আদি ব্যবস্থা করিবেক। উত্তম রূপে আরোগ্য হওয়ার পরে অন্ততঃ আট দশ দিন অপেক্ষা করিয়া কাঁচা ডাল ব্যবহার করিবেক, দাইলের আবশ্যক হইলে প্রথমতঃ মসুর, অরহর, বা মাস-কলাইয়ের পরিষ্কৃত কাঁচা দাইল ব্যবহার করিবেক। এই পীড়াতে কোন প্রকারে বাহ্যিক কপূরাদি ব্যবহার করিবেক না, অর্থাৎ কপূরের সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কোন মতেই অঙ্গের কোন স্থানে প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।

ভেদবমির পরেতে যে উপসর্গ উপস্থিত হয় তাহার ব্যবস্থা

৩
চিকিৎসা

যদ্যপি, ভেদ বমন উপশম হওয়ার পর, উদর মধ্যে, ফাঁপিয়া মোড়া দেয়, শূলবৎ যাতনা থাকে, এবং অতিসার, বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলস্, পূর্ণমাত্রা একশা ছই ঘণ্টা অন্তর, এবং পরেতে কিছু উপশম বোধ হইলে, ছয় বা আট ঘণ্টা অন্তর ।

রোগের প্রথর অবস্থার কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, যদ্যপি জলবৎ বিরেচন হয়, এবং অন্ত্র মধ্যে যাতনা বোধ হয়, নাভি স্থলে ভার বোধ হয়, পেট ডাকে, এবং জল পান করার কিঞ্চিৎ পরে বমনের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফস্ ফরস্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি জিহ্বা আঠাল থাকে, এবং মুখ বিবর্ণ হয়, ও জলবৎ বা আঠাল মল নির্গত হয়, অথবা তাহার বর্ণ ঈষৎ সবুজ হয়, এবং প্রস্রাব সমভাবে না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—এসিডম্-ফস্ ফরিকম্, অর্দ্ধমাত্রা ছই ঘণ্টা অন্তর ।

ভুক্ত-দ্রব্য-প্রবাহ-প্রণালী মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে, এবং নিয়ত তরল মল অথবা যাহাদিগের অর্শঃ, বা কোন প্রকার চর্ম রোগ থাকে, এমত অবস্থায় সর্বতোভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—সফর, পূর্ণমাত্রা প্রথমতঃ ছয় ঘণ্টা অন্তর, এবং কিছু উপশম হইলে পরেতে দ্বিগুণমাত্রা, প্রত্যহ প্রাতঃকালে দিবেক ।

যদ্যপি মুত্র স্থলীতে, অত্যন্ত জ্বালা থাকে, এবং বেগের, সহিত অত্যুষ্ণ পরিমাণে পাতলা মল বিরেচিত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাথ্যারাইডিস্, পূর্ণমাত্রা ছই ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি বিকার লক্ষণবোধ হয় এবং প্রলাপাদি থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-টক্লি কোডেন্ড্রন, এবং ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর উপর্যুপরি রূপে দিবেক ।

যদ্যপি রোগী নিষ্পন্দভাবে থাকে, এবং প্রলাপ বাক্য কহিতে থাকে ও মুখ রক্তবর্ণ দেখায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েরিস, ওপিয়ম, এবং ল্যাকসিস পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর, ক্রমশঃ অর্থাৎ প্রথমোক্ত ঔষধের দুই তিন মাত্রায় কিছু উপশম বোধ না হইলে, পরেতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঔষধ ঐ রূপে দিবেক ।

যদ্যপি এই অবস্থায় চর্ম্মের উষ্ণতা, মাথা ধরা, নাড়ীর তীব্র গতি, কর্ণেতে অতিরিক্ত শব্দ বোধ, জিহ্বা শুষ্ক, এবং প্রস্রাব অত্যন্ত কটু হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

পথা ব্যবস্থা ।

আহার্য্য দ্রব্য পূর্ব্ববৎ বিশেষতঃ রোগীকে, পশম বা তুলার দ্বারা নির্ম্মিত শয্যায়, (শয্যা উত্তাপ দ্বারা গরম করিয়া, তাহার উপর) শয়ন করাইবে, গরম জল বোতলে পুরিয়া সেই বোতল পায়ের তলে ধরা এবং তপ্ত ফ্ল্যানেল শরীরের অন্যান্য অংশে দেওয়া বিশেষ উপকারক, অপিচ একখানি চাদর, গরম জলে ভিজাইয়া তাহার দ্বারা রোগীকে আচ্ছাদন করিয়া পরেতে কব্বলের দ্বারা জড়াইয়া রাখিলেও বিশেষ উপকার বোধ হইবে । শরীরের যে স্থানে, অঙ্গগ্রহ থাকে সেই সেই স্থানে পশম নির্ম্মিত, বস্ত্র দ্বারা ডলা কখন কখন কর্তব্য ।

যখন এই রোগ, কোন স্থান বিশেষে, সময় বিশেষে প্রবল রূপে সকলকে আক্রমণ করিতে থাকে, তখন ইহা উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য প্রত্যহ পাঁচ ফোটা করিয়া কপূরের আরক চিকিৎসা চিনির সহিত সেবন করিবেক ।

শোথঃ ।

শারীরিক কোন আবৃত গহ্বর মধ্যে বা কোন যন্ত্রাবয়ব-মুগ্ধ-চর্ম মধ্যে জল একত্রিত হইলে তাহাকে শোথঃ কহে, এই রোগ প্রায়, অতিসার বা অন্য প্রকার রোগাদির আনুসঙ্গিক, হইয়া থাকে অতএব যে রোগেতে এই রোগ উৎপন্ন করায়, তদনুযায়ী ইহার চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

বক্ষঃস্থলের শোথঃ ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি, নিঃশ্বাস প্রস্থাসে কষ্ট হয়, এবং ঘনঃশ্বাস হয় ও হাসিতে, বা চলিতে, বা উপরে উঠিতে, অত্যন্ত পীড়া বোধ হয়, এবং রাত্রিতে, শ্বাস রোধ হওয়ার ন্যায় যাতনা উপস্থিত হয়, ও অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকন্, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক সপ্তাহ যাবৎ দিবেক ।

যদি ফোলায় সহিত হাঁপানি বোধ হয়, নিঃশ্বাস প্রস্থাসের সময় বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে, কথন কহিবার সময় ঘনঃশ্বাস হয়, এবং বক্ষঃস্থলে চাপন ও দুর্বলতা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্, পূর্ণমাত্রা, আক্রমণ কালীন দুই ঘণ্টা অন্তর, এবং সামান্যতঃ চিকিৎসার জন্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার কণ্ট্রিয়া দিবেক ।

যদ্যপি রাত্রিতে অথবা প্রাতঃকালের সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে অশস্ত হয়, এবং সমস্ত বক্ষঃস্থলে, চাপিয়া ধরে ও কোন প্রকার কষ্ট করিতে বা কথা কহিতে, বা রাত্রিকালে শয়ন সময়ে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কেবম্, পূর্ণমাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে, প্রত্যহ এক এক বার এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিয়া শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে ঐ রূপে পুনর্য্যার চালাইবে ।

যদ্যপি এই রোগ, কোন প্রকার প্রথর রোগ জন্য হয়, এবং যদ্যপি ইহা দুর্ব্বল অবস্থায় ক্রমশঃ প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফর, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া ।

উদরীয় শোথঃ বা জলোদরী ।

এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে রাত্রিতে অস্থিরতা, নিয়ত পিপাসা, পরিপাকশক্তি এবং ক্ষুধার অপ্পতা, জিহ্বা মলিন, ন্যূনাধিক জ্বর বোধ, নিয়ত বমনেচ্ছা, বা কখন কখন বমন, প্রস্রাবের অপ্পতা, কোষ্ঠাবরোধ, বা উদরের জড়তা, যকৃতের দিকে, এবং পশ্চাত্তাগে ও কটিতে যাতনা বোধ থাকে, অনন্তর, ক্রমশঃ উদর বৃদ্ধি হইতে থাকে । উদরী পরীক্ষা কালীন উদরের এক পার্শ্বে হস্ত রাখিয়া অপর পার্শ্বে কর দ্বারা আঘাত করিলে, জলের ধাক্কার ন্যায় বোধ হয়, এই রোগে রোগী, যখন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যায়, প্রস্রাবের অপ্পতা হয়, এবং যদ্যপি নাড়ী ক্ষীণ ও অসমান গতি বিশিষ্টা হই ও শরীরের স্থানে স্থানে রক্তের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায় জ্বর, বিদ্যমান থাকে,

কাশী ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, রক্তপ্রাব এবং অত্যপ্প পরিমাণে দুর্গন্ধ প্রস্রাব হয় তাহা হইলে অসাধ্য লক্ষণ জানা যায় ।

চিকিৎসা ।

যখন এই রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকে এবং হঠাৎ শোথঃ বৃদ্ধির তরুণাবস্থা উপস্থিত হয়, তৎকালে অন্য চিকিৎসার পূর্বে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা আবশ্যক হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

এই রোগে বা অন্য কোন প্রকার শোথে পূর্বোক্ত ঔষধের পর বিশেষ উপকারী, এবং যদ্যপি অত্যন্ত জ্বর, অতিশয় দুর্বলতা নিশ্চেষ্টতা, প্রস্রাব, এক কালীন বন্ধ, বা অত্যপ্প পরিমাণে হয়, এবং আঠাল ও পাতলা মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ও অতিশয় পিপাসা থাকিলে ।

ঔষধ—হিলেবোরস্, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর, রোগের প্রবল অবস্থায় এবং পরেতে ক্রমশঃ অধিক কাল পরে দিবেক ।

যদি উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ছয় ঘণ্টা পরে উপশম বোধ না হয়, কিম্বা কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে, এবং যখন রোগ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ রোগীকে দুর্বল করিতে থাকে কিম্বা চিকিৎসা আরম্ভের পূর্বে যদি রোগ, অধিক কাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধ মাত্রা রোগের তীব্রাবস্থায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর বা অতিশয় প্রয়োজন হইলে ৫। ১০। ১৫ বা ২০ মিনিট্ অন্তর দিবেক, পরেতে আরোগ্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ অধিক কাল অন্তর করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি যকৃৎ, প্লীহা, বা শারীরিক অন্য কোন যন্ত্রের পীড়া জন্য এই রোগ উপস্থিত হয়, এবং অত্যন্ত দৌর্বল্য ও কিঞ্চিৎ উৎকাশী থাকে. আরও যদ্যপি শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ, এবং প্রবল পিপাসা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ, অতিরিক্ত শোণিত ক্ষয় জন্য, অথবা যকৃৎ, প্লীহাদির দোষ জন্য হয়, এবং অস্পষ্টজনক শুষ্ক কাশী থাকে, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ হয়, নাড়ী সূক্ষ্মা দুর্বল্য এবং মৃদুগতি বিশিষ্ট হয়, পুনঃ পুনঃ বৃথা প্রস্রাবের বেগ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, রোগের প্রথর অবস্থায় পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর এবং কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে, পরেতে প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া ।

উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ছয় ঘণ্টা পরে যদ্যপি তদ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র লাঘব বোধ হয়, বা, না হয় এবং রোগীর চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ হয়, ও শোথঃ বিশিষ্ট স্থান সকলে বিদ্ধ করার ন্যায় যাতনা বোধ হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফেরম্, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর, এই রূপ তিন বারের পর ক্রমশঃ ছয় বা আট ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

পুরাতন গমের কুটী, শুষ্ক মানখণ্ড পিণিয়া অর্ধেক জল এবং অর্ধেক চুন্ধে মিশ্রিত করিয়া পাক করতঃ কিঞ্চিৎ মিস্টির সহিত পথ্য করিবে এবং শশক, সেজারু, বা হরিণ, মাংস

ও জিওল (শিকি) ও মাগুর মৎস্য। উদ্ভিজ্জ দ্রব্য মধ্যে করলা, মূলা, সজিনার ডাঁটা, পিড়িংশাক, এতদ্ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার করিবেক না। আরও কুকুট, ভাড়ুই ও ময়ূর, কচ্ছপ মাংসও কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেওয়া বাইতে পারে।

বাত রোগ ই
গ্রহি-বাত।

লক্ষণ—এই রোগে গ্রহি সমুদয়ে বেদনা বোধ হয়, প্রদাহ বিশিষ্ট, তরুণ বা প্রাচীন শীতল-স্পর্শ ফোলা থাকে, এবং অগ্নি মান্দ্য হয়। এই রোগের পূর্বে অগ্নি মান্দ্য হইয়া কিঞ্চিৎজ্বর বোধ হয়, পায়ের শিরা সকল ফোলে এবং গ্রহি সকলে জড়তা বা কামড়ানি থাকে। যখন প্রথম আক্রমণ কাল উপস্থিত হয়, (প্রায় রাত্রিকালেই) তখন পায়ের, হাতের, ঘোড় ছাড়িয়া যাওয়া, এবং জ্বালা বা অতিশয় দন্ধের ন্যায় “অাক্রান্ত স্থানে” যাতনা বোধ হয়। তাহার কিছু কাল পরে, সেই সকল যাতনা অন্তর্হিত হয়, এবং অাক্রান্ত স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া থাকে।

নিদান—এই রোগ কোন কোন ব্যক্তির পৈতৃক দোষ জন্য হয়, তন্নিম্ন নিম্ন লিখিত কারণ হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্টতা, মদ্যাদি পান, বিশেষতঃ পোর্টওয়াইন্ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার, মনোবেগ, অত্যন্ত পাঠাদিতে নিমগ্নতা, পরিষ্কৃত বায়ু সেবনার্থে বহির্গমন না করা এবং বলকারক ঔষধ ও পুনঃ পুনঃ জোলাপাদি ব্যবহার করা।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি রোগী বিলক্ষণ মোটা হয় এবং প্রদাহ বিশিষ্ট জ্বর থাকে, নাড়ী কঠিনা ও বেগবতী হয়, এবং যদ্যপি বাহ্যিক উত্তাপ থাকে, ও ফুলিয়া লাল হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর রোগের প্রথর অবস্থায়, এবং জ্বর-লক্ষণের ক্রিষ্ণে হ্রাস হইলে, পরেতে চারি, ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি যাতনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বোধ হয়, এবং সন্ধ্যার সময় বা শয়ন কালীন বৃদ্ধি হয়, ও আক্রান্ত স্থান জড়বৎ বোধ হয়, এবং বিশেষতঃ যদি অগ্নি মান্দ্য থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেটসেটিলা, রোগের তীব্রাবস্থায় পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এবং হ্রাসাবস্থা হইলে রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ।

যদ্যপি পীড়িত স্থান খোলা থাকিলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, এবং বস্ত্রাবরণের দ্বারা উষ্ণ থাকিলে যাতনার লাঘব বোধ হয়, ও রোগী যদি দুর্বল, মগ্ন এবং ক্লান্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে পূর্ব-বৎ ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি যাতনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং অস্থিরতার সহিত পুনঃ পুনঃ হস্ত পদাদির অগ্রভাগ রাখিবার স্থান পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা হয়, পাণ্ডুবর্ণ, এবং অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত অবয়ব দেখা যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফেরম্, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর । এই ঔষধ, রুম্-টক্লি-ফোডেনড্রেনের সহিত উপর্য্যাপরি দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত প্রকার ঔষধদ্বয় প্রয়োগের পর উপকার বোধ না হয়, এবং স্পর্শ করিলে, বা চাপিলে, যাতনাবোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, কেরমের ব্যবস্থায়সারে দিবেক ।

যদ্যপি প্রাতঃকালে যাতনা বৃদ্ধি হয়, এবং মাংসপেশীতে দপ্ দপ্ করা ও কামড়ান এবং জড়তা বোধ হয়, পাকস্থলীর বিকৃতি থাকে, আরও যদি কোষ্ঠাবরোধ এবং অর্শঃ থাকে, কিম্বা আতিসারিক ধাতু হয়, ও যদ্যপি মদ্যাদিতে রোগী আশঙ্ক হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, রোগের প্রবলতা সময়ে পূর্ণমাত্রা তিনঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে লাঘবাবস্থায় ছয়ঘণ্টা অন্তর । এই ঔষধ একোনাই-টের সহিত উপর্যুপরি দিলে বিশেষ উপকার বোধ হয় ।

যদি কিঞ্চিৎমাত্র গতিতে, এবং রাত্রিতে যাতনা বৃদ্ধি হয়, শীতবোধ ও কম্প, ঘর্ম কিম্বা জ্বর বিদ্যমান থাকে, অথবা অজীর্ণতা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, নক্ল-বমিকার ন্যায় দিবেক ।

প্রাচীন গ্রন্থিবাতের চিকিৎসা ।

যদ্যপি এই রোগ প্রাচীন হয় ও মধ্যে মধ্যে প্রথর রূপ ধারণ করে তাহা হইলে এবং সর্বতোভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্তে ।

ঔষধ—আর্গিকা, স্যাবাইনা, এই উভয়ের অন্যতর একটি ঔষধ পূর্ণ মাত্রায় চারি ঘণ্টা অন্তর “রোগের প্রথরাবস্থায়” দিবেক, পরেতে দুই দিবস অন্তর ।

যদ্যপি সর্বতোভাবে আরোগ্য করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফর্, ক্যালেকেরিয়া, হেপার্-ইহার মধ্যে যে কোন একটি ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিগুণ মাত্রায় দশ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া তাহার এক সপ্তাহের পরে অপর ঔষধ উক্ত মতে ব্যবহার করিবেক।

গ্রন্থিবাত, সদত এক স্থান হইতে যদ্যপি অন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা হইলে :

ঔষধ—পারেসিটলা, সলফর্, আর্গিকা, প্লুম্বগ, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ পূর্ণ মাত্রায় প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া তাহার চারি দিন পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার পূর্ববৎ ব্যবহার করিবেক, অথবা উক্ত ঔষধের মধ্যে অন্যতর একটি ঔষধ উক্ত মতে ব্যবহার আরম্ভ করিবেক।

গ্রন্থি-বাত্রে গ্রন্থি বৃদ্ধির চিকিৎসা।

যদ্যপি গ্রন্থিবাত হইয়া গ্রন্থি বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, সিপিয়া, লাইকোপোডিয়ম্, গ্র্যাফাইটিস্, অরম্ ক্যাকিসেগ্রিয়া, ইহার মধ্যে অন্যতর একটি ঔষধ দ্বিগুণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে, অথবা পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে, এক এক বার করিয়া, সেবন করিবেক।

হস্ত পদাদির গ্রন্থি, বাত রোগ জন্য ছোট হইলে।

ঔষধ—সলফর্, কফিকম্, ব্রায়োনিয়া, রস-টক্সিকোডেণ্ড্রন, বা সাইলিশিয়া, ইহার অন্যতর একটি ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিগুণ-মাত্রায় সেবন করিবেক।

চরণের গ্রন্থি বাত ।

গ্রন্থি বাত যদি কেবল চরণে ধরে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, স্যাবাইনা, ব্রায়োনিয়া, ককিউলস্, লাইকো-পোডিয়ম্, এবং সলফর্ ইহার অন্যতর একটি ঔষধ পূর্বোক্ত মতে ব্যবহার করিবেক ।

উক্ত কোন একটি ঔষধের দ্বারা কিছু উপশম বোধ হইলে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—সলফর্, পূর্ববৎ ব্যবহার করিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

এই রোগে লঘু দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় এমত পথ্য করিবেক, এবং তাহাও সহজ অবস্থা অপেক্ষা এক এক বারে অল্প পরিমাণে আহাৰ করিবেক । কিন্তু যদি রোগীর উত্তম রূপে আহাৰ করা বহুকালের অভ্যাস থাকে তাহা হইলে হঠাৎ এক কালীন তাহার ভ্রাস করিবেনা, প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণে, নিয়মিত রূপে শারীরিক পরিশ্রম করা এবং এক সময়ে আহাৰ নিব্রাদি করা বিধেয় । যদ্যপি এই রোগ প্রাচীন হয়, তাহা হইলে এক কালীন আমিষ দ্রব্য বর্জন করিয়া কেবল উদ্ভিজ্জ দ্রব্য মাত্র ব্যবহার করিবেক ।

বাত রোগ ।

এই রোগ দুই প্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তরুণ বা তীব্র, এবং প্রাচীন ।

সামান্য লক্ষণ—শারীরিক-স্বচ্ছত্বকে বা মাংস পেশীতে যাতনা বোধ হয় ও তন্নিবৃত্তি স্থান ফুলিয়া কিঞ্চিৎ লাল এবং উত্তাপ বিশিষ্ট হয় ।

তীব্র বাত রোগের লক্ষণ ।

প্রথমতঃ অস্থিরতার পর অর বোধ হয়, কখন শীত ও কখন উত্তাপ, পিপাসা, হস্ত পদাদি শীতল, কোষ্ঠাবরোধ, নাড়ী বেগবতী হয়, তদন্তর বৃহৎ-গ্রন্থি সকলে যাতনা হইয়া, এক স্থান ত্যাগ করিয়া, অন্য স্থানে যাতনা বোধ হয়, ও পূর্বের স্থানে, রক্তবর্ণ ফুলা, এবং কোমলতা থাকে, ও দুর্বলতা হয় ।

প্রাচীন বাতের লক্ষণ ।

যে স্থানে যাতনা হয়, সেখানে প্রায় ফুলা দেখা যায় না, কখন কখন আক্রান্ত স্থান জড়বৎ বোধ হয়, কিঞ্চিৎ অর বোধ হয়, কিম্বা এক কালীন অর থাকে না ।

নিদান—অত্যন্ত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে, বা সোঁতা বা শীতল স্থানে, সদত বাস ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

যদি অত্যন্ত অর, উত্তাপ, পিপাসা, গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, এবং আক্রান্ত স্থান সকলে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, আক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ বা ফুলিয়া চিক্ চিক্ করে, স্পর্শ করিলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর । এই ঔষধ অন্যান্য ঔষধের সহিত উপর্যুপরি দিলেও বিশেষ উপকার হয় ।

উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে বা পরে, যদিও পদাদির গ্রন্থি সকলের কিঞ্চিৎ ফুলা থাকে, এবং টামরা ছেঁড়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, আক্রান্ত স্থানের উপর কোন প্রকারে, উত্তাপ দিলে ভাল থাকে, শীতল বস্তু লাগিলে এবং বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি, চলিলে শাস্তি বোধ হয়, জ্বর থাকে, অতিরিক্ত মাথাধরা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, অক্ষুধা, অথবা অম্নে রুচি, অতিশয় পিপাসা, এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সরফর, সর্ববিধায় পূর্ববৎ ।

যদ্যপি রাত্রিতে এবং গমনাগমনে অতিরিক্ত জ্বালার ন্যায় বা শূলবৎ যাতনা হয়, আক্রান্ত স্থান অতিশয় ফুলিয়া লাল হয়, এবং চিক্ চিক্ করে, জ্বর বিদ্যমান থাকে, মস্তকে রক্তবদ্ধ হইয়া শিরা সকল দপ্ দপ্ করে, মুখ রক্তবর্ণ হয়, চর্ম উষ্ণ, পিপাসা, বেগবতী নাড়ী এবং অনিদ্রা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, তীব্রাবস্থায় পূর্ণমাত্রা এবং তন্মিন্ন অবস্থায় অর্দ্ধমাত্রা সর্বতোভাবে পূর্ববৎ ।

যদ্যপি আক্রান্ত স্থানে, ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা থাকিয়া সেই স্থান জড়বৎ বোধ হয়, কিঞ্চিৎ জ্বর থাকে, অত্যন্ত অস্থিরতা, মস্তকে ঘর্ষ হয়, রাত্রিতে যাতনা বৃদ্ধি, স্থান পরিবর্তনে বা শয্যায় বসিয়া থাকিলে, কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, মাটিতে বা হস্ত পদাদিতে, বাতের যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি আক্রান্ত স্থানে জড়তা, বা টানিয়া ধরা, ও মাংস পেশী সকলে কামড়ানের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, গ্রন্থিতে, মূল-শরীরের পশ্চাত্তাগে, বক্ষস্থলে, এবং কটিদেশে, অত্যন্ত যাতনা

বোধ হয়, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, ঘাড়ের মাংসপেশীতে টান্ বোধ হয় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা দিবা এবং রাত্রিতে এক এক বার, এই ঔষধের পরে ক্রমেতে ককিউলস্, এবং ইগ্লেশিয়া উক্ত প্রকারে দিবেক।

যদ্যপি হস্ত পদাদিতে ফুলা থাকে বা জ্বালার সহিত লাল হয়, কিম্বা পায়ের বুজাঙ্গুষ্ঠ ফুলিয়া লাল হয়, চর্ম শুষ্ক থাকে, বা অতিশয় ঘর্ম হয়, রাত্রিতে শয়ন করিলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, এবং হস্ত পদাদি শীতল, বা জড়বৎ দুর্বল হইয়া যায়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, অর্দ্ধমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

উক্ত ঔষধের চারি মাত্রার পর যদ্যপি উপশম বোধ না হয় এবং প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি বোধ হয়, ও আক্রান্ত স্থান কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে, বিশেষতঃ যদি হাড়ের ভিতর বা গ্রন্থিতে, যাতনা বোধ হয় ও অতিশয় ঘর্ম হইয়াও যাতনার লাঘব না হয়, পুনঃ পুনঃ শীত ও আন্তরিক উত্তাপ বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—মার্কিউরিয়স্, পূর্ববৎ।

উক্ত ঔষধে উপকার বোধ না হইলে পরেতে।

ঔষধ—ল্যাক্সিস্, উক্ত প্রকারে দিবেক।

যদ্যপি আক্রান্ত স্থান জড়বৎ বোধ হয়, এবং শীতল বায়ু লাগিলে কিঞ্চিৎ শান্তি হয়, ও সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, অর বোধ থাকে, অত্যন্ত শীত বোধ, এবং অস্থিতে যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পমেসটীলা, অর্দ্ধমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর।

এই রূপ চারি দিবসের পর যদ্যপি কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ

হয় এবং অস্থি হইতে মাংস ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা, বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি, এবং শরীর সঞ্চালনে শাস্তি বোধ হয়, আক্রান্ত গ্রন্থি ফুলিয়া রক্ত বর্ণ হইয়া চিক্ চিক্ করে, ও সঞ্চালিত করিতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধি হয়, এবং সঞ্চালন করিতে ক্ষান্ত না হইলে কিঞ্চিৎ শাস্তি হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি এই রোগ সংক্রান্ত অর অত্যন্ত প্রবল হয়, ও যদি জলে ভিজাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-টক্কিকোডেগুন, পূর্ববৎ স্বতন্ত্র বা পেস্‌মটিলার সহিত উপর্যুপরি রূপে দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধদ্বয় প্রয়োগের পর কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে, তাহার শেষ মাত্রার চক্ষিশ ঘণ্টার পরে যদ্যপি বাতের যাতনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, এবং সেই খান হইতেও অন্যত্র গমন করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাম্‌ফর, (পরিষ্কৃত আরক) এক ফোটা পরিমাণে পরিষ্কৃত চিনির সহিত ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা করিয়া সেবন করিবেক ।

যদ্যপি ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বা ছেদন করার ন্যায় বা জ্বালাবৎ যাতনা হয়, এবং অতিশয় অস্থিরতা, অনিদ্রতা, ও পিপাসা থাকে, হস্ত পদাদির অগ্রভাগে যাতনা বোধ ও বেদনা চালিয়া বেড়ায়, বিশেষতঃ যদ্যপি বক্ষঃস্থলে আক্রমণ করে ও ঘর্ম হইলে যাতনার নিরুত্তি হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, অর্দ্ধ মাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগে রোগের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া এক ভাবে থাকে, অথবা যে ধাতুতে এই রোগ

পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে তাহা সম্পূর্ণ রূপে নিবারণ করিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—সরফর, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে, এক এক বার করিয়া দশ দিবস পর্য্যন্ত । এই অম্বুসারে চলিয়া এক সপ্তাহ পরে পুনর্বার ঐ রূপে চলিবেক ।

যখন বেলাডোনা, ব্রায়োনিয়া, এবং রস্ টক্সিকোডেন্-ড্রুন্ দিয়া কোন প্রকার উপকার বোধ না হয় তৎকালে ।

ঔষধ—হেপার এবং ল্যাকিসিস্ পূর্ণমাত্রা করিয়া ক্রমাগুয়ে ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধদ্বয় প্রয়োগের পর গ্রন্থিতে যদিও কিছু জড়তা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কলোমিহ্, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদিও উক্ত প্রকারে সর্বতোভাবে আরোগ্য না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, ককিউলস্, এবং ইংলিশিয়ার মধ্যে যে কোন একটি ঔষধ উক্ত প্রকারে দিবেক ।

প্রাচীন বাত রোগ ।

যদিও বাত রোগ বহুকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে, প্রথমতঃ ঔষধ সরফর, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দশ দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিয়া তাহার এক সপ্তাহ পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার ঐ রূপে ব্যবহার করিবেক ।

* আমি এই ঔষধদ্বয়ের দ্বারা তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলৎশক্তিবিহীন, এক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছি ।

উক্ত ঔষধ উক্ত ব্যবস্থা মতে দুই বার চালাইয়া পরেতে এবং যদ্যপি সময়ের পরিবর্তন জন্য পুনর্বার রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ববৎ ।

অথবা কার্বো-বেজিটেবিলিস্, হেপার্, লাইকোপোডিয়ম্ বা ল্যাকিসিস্ উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিব ।

পথ্যব্যবস্থা ।

এই রোগে যখন অর বিদ্যমান থাকে, তৎকালে অর-চিকিৎসার পথ্যের ন্যায়, পথ্য ব্যবস্থা করিবেক, বিশেষতঃ অর হউক বা, না হউক, যে রোগী এই রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহার পক্ষে পরিমিত আহার করা কর্তব্য । শাক, অম্ল, কলাইর ডাল, দধি ইত্যাদি শ্লেষ্মা বৃদ্ধি কারক দ্রব্য এককালীন বর্জন করিবে । আরও এই রোগের স্বহিত প্রায় অজীর্ণতা সহচর থাকে, অতএব অজীর্ণ রোগের ব্যবস্থানুযায়ী চলা নিতান্ত বিধেয় ।

মাজার বেদনা ।

লক্ষণ—এই পীড়াতে মাজায় সময়ে সময়ে, বা নিয়ত বাতের ন্যায় বেদনা থাকে, এবং অতিশয় প্রবল অর ও বিদ্যমান থাকে ।

অর যদ্যপি অত্যন্ত প্রবল থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

অর লক্ষণের বিরতি হইলে, যদিপি পশ্চাত্তাগে কাম্‌ড়ান বা খেঁচনির ন্যায় এমত যাতনা বোধ হয়, যে রোগীকে হেট হইয়া চলিতে হয়, ও যৎকিঞ্চিৎ গতি বা শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়, এবং যদিপি শীত বোধ থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর দুই দিবস দিয়া যদিপি তাহাতে উপশম বোধ না হয়, তাহার এক দিবস পরে, পুনরায় ঐ রূপে দুই দিবস দিবেক।

যদিপি উক্ত ঔষধে শান্তি বোধ না হয়, কিম্বা ছেঁচা ঘায়ের বা অতিরিক্ত পরিভ্রমের ন্যায়, মাজাতে যাতনা বোধ হয়, ও গতিতে, রাত্রিকালে, শয়ন সময়ে, পান্থ-পরিবর্তনে, অত্যন্ত যাতনা বৃদ্ধি হয়, এবং অতিশয় দুর্বলতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, পূর্ণমাত্রায় রোগের তীব্র অবস্থায় ছয় ঘণ্টা অন্তর, নতুবা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদিপি বসিয়া থাকার সময় যাতনা বৃদ্ধি হয়, এবং পশ্চাত্তাগে ও মাজাতে টানিয়া ধরার ন্যায়, বা কাম্‌ড়ান, বা ছেঁচা ঘা, বা মোচ্‌ড়ানের ন্যায়, যাতনা বোধ হয়, কিম্বা যদি রোগ অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—রস-টক্লিকোডেগ্‌ন্‌, পূর্ববৎ।

যদিপি কিঞ্চিৎ প্রদাহ থাকে, ও যাতনা মাজাতে গাঢ় রূপে নিবিষ্ট থাকে, এবং মাজায় চিবানের ন্যায় যাতনা, বা জড়তা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদিপি যাতনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, এবং রোগীকে অস্থির করে তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্‌, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর।

আমি স্বয়ং অনেকের মাজার বেদনা (যাহাতে বহু কাল হইতে উঠিতে, বসিতে, কষ্ট বোধ হইত) কেবল সলফুর, ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি ।

পঞ্চা ব্যবস্থা ।

বাত রোগের ন্যায় ।

পক্ষাঘাত ।

এই রোগ, নাড়ীর এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতির বিষমতা করিয়া বা, না করিয়া হঠাৎ বা ক্রমশঃ জ্ঞানের, বোধের এবং গতিশক্তির লোপ করে ।

লক্ষণ—এই রোগে, রোগী হঠাৎ মূর্ত্তিক্রমে পতিত হয় ও তৎক্ষণাৎ তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি এবং গতিশক্তি অন্তর্হিত হয় । হস্তপদাদি নিশ্চল কিম্বা শরীরের এক দিক্ সঙ্কোচিত এবং অপর দিক্ শক্তিহীন হয় । কোন কোন প্রকারে, একটী হস্ত-বা একটী পদমাত্র পড়িয়া যায়, বাক্-শক্তি থাকে না, কিম্বা অত্যুৎপন্ন অঙ্গ মুছ বাক্য কহে, মুখে ফেণা উঠে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মুছ হইয়া নাক্ ডাকিতে আরম্ভ হয় । অন্য প্রকারে রোগীর এক দিক্ মাত্র পতিত হইয়া যায়, এবং পাণ্ডুবর্ণ দেখায়, অঙ্গ ক্ষণ পরে চেতন হয়, আন্তরিক জ্ঞান থাকে কিন্তু কথা বলিতে পারে না । যদিপি আরোগ্য লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা হইলে রোগী ক্রমশঃ চেতন প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ লোককে চিনিতে পারে এবং কথা কহিতে, উত্তর দিতে, কিম্বা কথা কহিবার শক্তি না থাকিলে ইসারা দ্বারা জানাইতে ইচ্ছা করে । কিন্তু যদিপি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ক্রমশঃই অধিক

কষ্ট হইতে থাকে মুখ নীলবর্ণ হইয়া শীতল ভ্রুতে ঘর্ম্ম নির্গত ও গিলিতে মংগাকষ্ট বোধ হয়, চক্ষুঃ আচ্ছন্ন হইয়া আইসে, এবং অজ্ঞানতঃ মল নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে অসাধ্য লক্ষণ জানা যায় ।

নিদান—এই রোগ, প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় ঘটিয়া থাকে এবং অজীর্ণ বা হৃদয়ের কোন রোগ হইতে অথবা অতি ভোজন, বা পান, মনোবেগ, রক্তের গতির অবরোধ, বহুকাল পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইয়া থাকা, গাঢ় রূপে পুস্তক পাঠ, মস্তকে আঘাত, সিদ্ধি, গাঁজা, প্রভৃতি ব্যবহার করা, অতিরিক্ত বমন বা অতিশয় সূর্য্যের কিরণ লাগা, হঠাৎ রক্তক্ষয়, ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি মস্তকে রক্ত সঞ্চয় জন্য হয়, নাড়ী দ্রুতগামিনী, মুখ রক্তবর্ণ, ঘাড়ের এবং স্কন্ধের ধমনী সকল দপ্ দপ্ করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায় ছই বা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে, মস্তকে রোগ সঞ্চয়ের লক্ষণ দূর না করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, ঐরূপ ।

যদ্যপি রোগী, নিশ্চেষ্ট হয় অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করে অথবা অত্যন্ত মদ্যপায়ী বা উত্তম আহারে নিয়ত রত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিনা, পূর্ণমাত্রা চারি বা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি রোগী কোমল স্বভাবাশ্রিত অথবা স্ত্রী লোক হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল্লেসটিলা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি মস্তকে ভার বোধ হয় এবং মাথা ঘুরে ও কপালে অত্যন্ত চাপিরা ধরা বোধ হয়, কর্ণের ভিতর নানাবিধ শব্দ হয়, অনিদ্রা থাকে, আর দিবসে পুনঃ পুনঃ ঢুলানি-আইসে, মুখ রক্তবর্ণ হয়, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, নাড়ী পূর্ণ কিন্তু মৃদুগতি বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়াম্, অর্দ্ধমাত্রা, দুই ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি মস্তিষ্কে গাঢ় যাতনা থাকে বা মস্তকের বামপাশ্বে কামড়ানোর ন্যায় যাতনা থাকে, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, গ্রন্থি সকল জড়বৎ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ কোন বাহ্য আঘাত জন্য বা মাংস-পেশীর অতিরিক্ত উদ্যম জন্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, এবং একোনাইট্, ও বেলাডোনা, ক্রমশঃ বা উপর্যুপরি রূপে পূর্ববৎ ব্যবহার করিবেক ।

যদ্যপি এই রোগ শীঘ্র আহার করার জন্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, এবং পল্লেসটিলা, পূর্ববৎ উপর্যুপরি রূপে ব্যবহার করিবেক ।

পথাব্যবস্থা ।

যখন রোগী পিপাসা থাকা জানায়, তখন তাহাকে শীতল জল বা যব বা চাউলের ক্বাথ এক এক বারে অর্দ্ধ ছটাক পরি-

মাগে দিবে । পরে ক্রমশঃ আরোগ্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে, লঘু আহার সহ্য করাইবে । যখন রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয় তখন তাহাকে একটী শীতল কুঠরিতে রক্ষা করিবে, রোগীর মস্তক উঠাইয়া এমত অবস্থায় রাখিবে, যে কোনমতে মস্তকে রক্ত সঞ্চয় হইতে না পারে । পরিধেয় বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দিবে, পা ঝুলাইয়া রাখিবে । পায়ের পাতা দলিয়া এবং গরম জল, বোতলে পুরিয়া, বা তন্দ্বারা ক্ল্যানেল্ ভিজাইয়া গাত্রের উপর দিয়া গরম করিবেক ।

নানাবিধ রোগের চিকিৎসা ।

মনোবেগ, ও উন্মাদ লক্ষণ ।

এই রোগ, ভয়, কামাদি রিপু, বা রাগ, এবং অতিশয় দুঃখ, ইত্যাদি কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি হঠাৎ চম্কিয়া উঠিয়া, বা সামান্য ভয়, বা অতিশয় ভয়ানক ব্যাপার হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জন্য মুচ্ছা, অতিনিদ্রা, ও আপনিই মল নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

এই ঔষধ, একোনাইট্, নামক ঔষধের সহিত উক্ত মাত্রায় এবং সময় অন্তরে উপর্যুপরি রূপে দিলে বিশেষ উপকার হয়, (বিশেষতঃ যদ্যপি তৎকালে জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে) ।

যদ্যপি কোন কারণবশতঃ চম্কিয়া, মনের মধ্যে নানা-

প্রকার আনন্দ জনক ভাবের উদয় হয়, অত্যন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কল্প ও মুচ্ছা পর্য্যন্তও হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ণমাত্রা প্রয়োজন বশতঃ এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি প্রথমতঃ ভয় হইয়া পরেতে বিরক্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ব্ববৎ ।

যদ্যপি ভয়ের পর বিষণ্ণতা, বা অত্যন্ত দুঃখ বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেশিয়া, পূর্ব্ববৎ ।

যদ্যপি শিশু ভয় পাইয়া, সময়ে সময়ে, চীৎকার করিয়া উঠে ও কম্পান্বিত হয়, বা হস্তপদাদি সঙ্কোচিত করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়াম্, অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে, প্রত্যেক ঘণ্টায় দিবেক ।

যদ্যপি মনের মধ্যে আন্তরিক দুঃখের সহিত ঘৃণা থাকে, অর্থাৎ প্রণয় বিচ্ছেদ জন্য বা অর্থ ক্ষয় জন্য সর্ব্বদা মনো মধ্যে দুঃখ বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেশিয়া ।

যদ্যপি কোন ব্যক্তির প্রতি মনঃ সমর্পণ করিয়া, তাহার প্রণয় হইতে নৈরাশ জন্য দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেশিয়া, প্রথমতঃ পূর্ণমাত্রা বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিয়া পরেতে আবশ্যক হইলে, এসিডম্ ফস্ফ-রিকন্, উক্ত রূপে । বিশেষতঃ যদি রোগী স্থির ও মৌনী হয়, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ জ্বর বোধ থাকে তাহা হইলে শেষোক্ত ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

যদ্যপি রোগী ঈর্ষা বা ঘেঘযুক্ত হয়, সর্বদা বিবাদ, করে বা প্রলাপ বাক্য কহে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েনস্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ।

যদ্যপি রোগী অতিরিক্ত অসংলগ্ন বাক্য কহে, এবং এক বিষয় বলিতে বলিতে অন্য বিষয় উপস্থিত করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাকসিস্, পূর্ণমাত্রা, ছয় ঘণ্টা অন্তর । *

পথ্যব্যবস্থা ।

যদ্যপি মনোবেগ উপস্থিত হইয়া, তাহার সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জ্বর নিবারণ কাল পর্য্যন্ত, জ্বর কালীন পথ্যের ন্যায় পথ্য ব্যবস্থা করিবেক, আর যদ্যপি এই রোগের সহিত অজীর্ণতা থাকে তাহা হইলে, অজীর্ণ রোগের ন্যায় পথ্য ব্যবস্থা করিবেক ।

ক্ষিপ্ত জন্তু দংশন ।

কুকুর, বা শৃগাল, বা অন্য কোন ক্ষিপ্ত-জন্তু-দংশন জন্য প্রথমতঃ এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, যথা সামান্যতঃ অসুখ বোধ, দুশ্চিন্তা, নিদ্রার অপ্পতা, চক্ষুঃ ফুলিয়া আলোক অসহ্য কর্ণের ভিতর নানাবিধ শব্দ বোধ পাণ্ডুবর্ণত্ব ও মধ্যে মধ্যে শীত বোধ ঘণ্ণাস, নাড়ী, বেগবতী, সূক্ষ্মা, এবং বিষম গতি বিশিষ্টা, ক্ষুধার হানি, ইত্যাদি লক্ষণ, আঘাত-প্রাপ্ত স্থান শুষ্ক হইয়া যাওয়ার পর হয় । দ্বিতীয়াবস্থায়, সেই ঘা

* আমি এই ঔষধের দ্বারা একটি উদ্ভক্তা স্ত্রীলোককে আরোগ্য করিয়াছি ।

“যাহা পূর্বে আরাম হওয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা” ফুলিয়া উঠে, ক্লিষ্ট বেদনা ও উত্তাপ বোধ হয়, কখন কখন চুন্সায়, এবং পরেতে, পাশ্চাত্য পিয়া মাংস উচ্চ হইয়া যা, প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে দুর্গন্ধ রস নির্গত হইতে থাকে, অপিচ, দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, রোগী সময়ে সময়ে চমকিয়া উঠে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, এবং একাকী থাকিতে ভাল বাসে, নাড়ী বিষম গতি বিশিষ্টা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, চন্দ্র শীতল এবং শুষ্ক হয়, তদনন্তর হিক্কা, শূলবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। রোগী, ইতস্ততঃ চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া দৃষ্টি করিতে থাকে, গিলিতে গলায় কষ্ট বোধ হয়, বিশেষতঃ কোন প্রকার দ্রব-দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে, নিতান্ত বাধা দায়ক হয়। তৃতীয়া-বস্থায়, অল্প দিন পরে, এক বিন্দুমাত্র দ্রব-দ্রব্য গলাধঃকরণে শক্তি থাকে না, এবং অতিশয় পিপাসা সত্ত্বেও কোন প্রকার দ্রব-দ্রব্য বিশেষতঃ জল, ওষ্ঠের নিকটে লইয়া যাইতেই রোগী চমকিয়া উঠে, এমন কি জল দৃষ্টিমাত্রেই, বা এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিবার সময় তাহার শব্দ শুনিবা মাত্রেই দুশ্চিন্তা, ও অসুখ বোধ, হইয়া পাগলের ন্যায় হয়, ইহার কিয়ৎকাল পরে পিত্ত বমন উপস্থিত হয়, অনন্তর অতিশয় জ্বর, অতি পিপাসা, জিহ্বার শুষ্কতা, স্বরভঙ্গ এবং প্রলাপ বা পাগলামি উপস্থিত হইয়া নিকটস্থ যাহা পায় তাহাই কামড়াইতে ইচ্ছা করে, এইরূপ সময়ে সময়ে, পুনঃ পুনঃ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া পরি-শেষে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা ।

কোন ব্যক্তিকে ক্লিষ্ট জন্তুতে কামড়াইলে, তৎক্ষণাৎ দুইটা লোহার মোটা শিক বা তাদৃশ কোন পদার্থ, প্রজ্বলিত

অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ঘায়ের উপর তৈল, বা থুথু দিয়া তাহার উপর ছই, তিন, অঙ্গুলি উপর হইতে একটী লোহার শিকের তাৎ দিবেক ও সেটী শীতল হইতে২, অপরটী উঠাইয়া সেই রূপে উত্তাপ দিবেক, কিন্তু ঘা হইতে তাপ দেওয়ার কালীন যাহা কিছু নির্গত হয়, তৎক্ষণাৎ মুছিয়া দিবেক । এইরূপ ব্যবস্থা ঘা শুষ্ক হওয়া কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ চালাইবে । যদিপি ইহার সাত দিন পরে কিঞ্চিৎ অর বোধ হইয়া রোগীর জিহ্বার নীচে একটী কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই স্থানে অস্ত্র করিতে হইবেক, কিন্তু তৎকালে রোগী কোন মতে চিকিৎসকের হস্ত কামড়াইতে না পারে এমন বিশেষ উপায় স্থির করিবেক, কারণ তাহা হইলে চিকিৎসক ঐ রোগে আক্রান্ত হইবেক । অস্ত্র কার্যের পর জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া রোগীর মুখ ধোওয়াইবে । এই রোগে আক্রান্ত কালীন রোগী, নিয়োজিত স্বীয় কার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিবেক, কোন মতে রোগের কারণ ঘাহাতে মনে উদয় না হয়, এমন চেষ্টা করিবেক, এবং নিম্ন লিখিত মতে ঔষধ সেবন করিবেক ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ বার ঘণ্টা । অন্তর ছই দিবস পর্য্যন্ত, তাহার তিন দিবস পরে, পুনর্বার ঐরূপে পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদিপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর রোগের লক্ষণ, প্রথম যে রূপে উক্ত হইয়াছে সেই ভাবে থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ তিন বার করিয়া, আরও এই ঔষধ রোগের প্রারম্ভের কালীন পূর্ণমাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদিপি উক্ত ঔষধে উপকার বোধ না হয় এবং রোগী সর্বদা নিদ্রিত থাকিতে ইচ্ছা করে, গলার ভিতর শুষ্ক ও জ্বালা করে কিম্বা অত্যন্ত জ্বালার সহিত মুখে বা গলায় ফোড়ার ন্যায়

ন্যায় শ্লেষ্মা একত্রিত হয়, পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু জল দিলে, তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া ফেলে, গিলিবার সময়, গলা বন্ধপ্রায় বোধ হয়, চক্ষুর পুতলিকা স্থির হইয়া থাকে, অত্যন্ত ভয় বোধ, সর্বদা থুথু দিতে, কামড়াইতে, বা ছিঁড়িয়া কেলিতে ইচ্ছা করে, পলায়নে উদ্যত হয়, নিয়ত ঘুরিয়া পড়ে, মুখ দিয়া ফেণা উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, প্রত্যেক বার আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে পূর্ণ মাত্রায় দিবেক ।

যদ্যপি আক্রমণ কাল, অতিশয় গাঢ় এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, কামড়াইতে তাদৃশ ইচ্ছা থাকে না, দ্রব-দ্রব্যে ভয় থাকে, সর্বদা থুথু ফেলে, রোগে আক্রান্ত হইলে, তৎকালে জ্ঞান শূন্য হয়, আরও মুখ দিয়া ফেণা উঠে, অত্যন্ত ভীৰু হয়, গৃহ হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে, মনুষ্য জাতির নিকট থাকিতে ভাল বাসে না, জন্তুতে কামড়াইবে বলিয়া ভয় করে, নিদ্রাকালীন চম্কিয়া উঠে, এবং ভয়ানক স্বপ্নদর্শন করে তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েমস্, পূর্ববৎ ।

কোন উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টিপাত করিলে, রোগের আক্রমণ কাল উপস্থিত হয়, অত্যন্ত পিপাসা, মুখ এবং গলা শুষ্ক, কিন্তু দ্রব-দ্রব্য মাত্রেই ভয়, মুখে ফেণা উঠে, পাগলের ন্যায় নৃত্যাদি করিতে থাকে, কখন কখন গান করে, হাস্য করে, এবং কখন কখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া হুঃখ প্রকাশ করে, রোগের আক্রমণ কালে অস্থির হয়, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে, চম্কিয়া উঠিয়া নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গি করে, এবং সমস্ত বস্তুরই কামড়াইতে বা দস্ত দ্বারা ছিঁড়িয়া কেলিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্লোমোনিয়ম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি গলার ভিতর এবং মুখের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা ও শুষ্ক থাকে এবং তাহা গিলিবার সময় রুদ্ধ হয়, কখন কখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং গলা বা পেট কিঞ্চিৎ চাপিলে ও জল দেখিলেই রোগের আক্রমণ কাল উপস্থিত হয়, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, এবং উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যাস্‌গারাইডিস্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যেক বার রোগের আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে।

সর্পদংশন।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ সর্পে দংশন করিলে, যে প্রকার উত্তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা পূর্বপ্রকরণে করা হইয়াছে, তদনুসারে, যে পর্য্যন্ত রোগী কম্পান্বিত না হয়, অথবা এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ঐ রূপে তাৎ দিবেক। যদ্যপি তাহাতেও ক্রমশঃ বিষ জন্য লক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং ঘায়ে স্থান হইতে উর্দ্ধ দিকে ছৎপিণ্ডে, যাতনা রুদ্ধ হইয়া উঠে, কিম্বা যদ্যপি ঘা ঈষৎ নীলবর্ণ হয়, বা ফোলে, এবং রোগী বমন করে ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, চারিটি করিয়া বটিকা অর্দ্ধ ঘণ্টা বা বিশ মিনিট্ অন্তর এক এক বার দিবেক, কিন্তু যদ্যপি দুই ঘণ্টা পরে, কোন উপকার বোধ না হয়, তাহা হইলে ঔষধ বেলাডোন', পূর্ববৎ দিবেক।

সর্প দংশনের প্রথম বিকার নিবারিত হইয়া, যদ্যপি অন্য কোন প্রকার শারীরিক হানি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, বা এসিডম্-কস্ ফরিকম্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে আট দিবস পর্য্যন্ত দিবেক, তাহার ছয় দিবস পরে, আবশ্যক হইল পূর্বের ক্রমশঃ পূর্ববৎ দিবেক।

১ম চিকিৎসা ।

যদ্যপি কেহ কোন প্রকারে বিষ ভক্ষণ করে তখন তাহাকে বমন দ্বারা উঠাইয়া ফেলা বা প্রতিবিরোধী ঔষধ সেবন দ্বারা বিষের শক্তির হ্রাস করা কর্তব্য, তাহার পর তজ্জন্য যে কোন রোগ হইবার সম্ভব তাহা নিবারণ করা প্রয়োজনীয় । শীঘ্র বমন করাইবার নিমিত্ত ঈষৎদুষ্ণ জল অধিক পরিমাণে পান করাইয়া গলার ভিতর করুতরের পাখা দ্বারা সুড় সুড়ি দিবেক ইহাতে যদি বমন না হয় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ নম্ম বা রাইএর গুঁড়া লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া জিহ্বার উপর দিয়া এক গ্লাস গরম জল এক দমে পান করাইবেক । ইহাতেই বমন হইয়া বিষের তেজের অনেক লাঘব করিবেক ।

যদ্যপি কেহ ধাতু ঘটিত বিষ ইচ্ছা পূর্বক বা দৈবাৎ ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহা হইলে অধিক পরিমাণে সাবানের জল অথবা এক তোলা বা দেড় তোলা পরিমাণে, কার্বোনেট্-অব-ম্যাগ্নেশিয়া * এক পোওয়া জলের সহিত অথবা ঐ পরিমাণে ফুলখড়ি এক পোওয়া জলের সহিত অথবা আট হইতে দশ রতি পর্য্যন্ত, সোডা, † এক গ্লাস জলের সহিত প্রত্যেক বার বমনের পর বা যত বার যাতনা উপস্থিত হয় তৎকালে, এক এক বার পান করাইবেক ।

যদ্যপি বমন না হয় তাহা হইলে ডিম্বের খেত-ভাগ জলের সহিত চিনি দিয়া, অথবা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইবেক ।

* এক প্রকার ডাক্তারি (এলোপেথি) মতের ঔষধ ।

† এক প্রকার ডাক্তারি ঔষধ বিশেষ ।

বিষ ভক্ষণের তীব্র অবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে পাকস্থলীকে সমভাবে রাখিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর চারি বার দিয়া পরেতে ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ১২ ঘণ্টা পরে যদিও বমনেচ্ছা বমন, উত্তাপ বা শরীরের শীতলতা এবং শক্তিহীনতা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, পূর্ববৎ ।

উক্ত ঔষধের পর যদিও রাত্রিতে অস্থিরতা প্রবল থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না পূর্ণমাত্রা রাত্রি এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহ এক এক বার ।

যদিও দিবসে বিশেষতঃ নিদ্রার পর উপসর্গ বৃদ্ধি হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে বা পিচ্ছিল পাতলা মল নিঃসৃত হয় তবে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ ।

উদ্ভিজ্জবিষ ভক্ষণের চিকিৎসা ।

যদিও কেহ উদ্ভিজ্জ বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে অথবা যদিও বমন করান অসাধ্য বোধ হয় তাহা হইলে, কপূরের আরক নাসিকা দ্বারা টানাইবেক । রোগীকে সর্বদা চালিত করিবেক এবং সদত অন্যমনস্ক রাখিবেক । মস্তকের উপর এবং ঘাড়ের লতায় বন্ধস্থলে ও পশ্চাদ্ভাগে শীতল জলের দ্বারায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবেক, এতদ্বারা নিদ্রিত হইবেক অথবা যদি পূর্বে ঢুলিয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে চেতন হইবে ।

উদ্ভিজ্জ বিষ ভক্ষণের পর অথবা তামাকু বা আফিঙ্গ ভক্ষণের পর উক্ত প্রকার চিকিৎসাতে কিছু উপশম বোধ হইলে পরে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

কিন্তু যদিও উক্ত ঔষধ সেবনের চারি বারের পর রোগের লক্ষণের উপশম বোধ না হয় তাহা হইলে শেষ বারের ছয় ঘণ্টা পরে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, নক্স-বমিকা, বা মর্কিউরিয়স্ এই ঔষধদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একটি পূর্ণমাত্রায় প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে এক এক বার দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

এই রোগে মাংসের কাথ য়ত দুগ্ধাদি বল-কারক দ্রব্য অন্ন বা রুটীর সহিত ব্যবস্থা করিবে ।

মদ্য পান ।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য নেশায় অভিভূত হয় এবং তাহাকে শীঘ্র চেতন করার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে* তাহার উপর শীতল জল কলস পরিমাণে উচ্চ স্থান হইতে এরূপে ঢালিবে যে তাহাতে তাহার মস্তকে আঘাত লাগে । তাহার পর অথবা যখন মদ্যপান করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে শরীর ভার বোধ হয়, চক্ষুতে আলোক সহ হয় না, বমনেচ্ছা হয়, নাভিস্থলে যাতনা বোধ, স্বরভঙ্গ, হস্তেতে

উত্তাপ, শরীরে আলস্য ও শীত বোধ, অথবা কখন কখন নাসিকা
দিগ্না রক্ত প্রাব হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা বা কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্, পূর্ণমাত্রায় দুই বা
চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে ।

যদ্যপি মাথা ধরা থাকে, মস্তক মধ্যে শলাকা বিদ্ধ থাকার
ন্যায় যাতনা, কিম্বা এক পার্শ্বে মাত্র মাথা ধরিয়া থাকে,
গমনাগমনে, কোন বিষয় চিন্তা করিবার সময়, এবং মাথা
নোওয়াইতে, যাতনা বৃদ্ধি হয় বমন এবং উকি হয় । বেগের
সহিত পিচ্ছিল মল নিঃসৃত হয়, অত্যন্ত মাথা ঘোরে, চক্ষুঃ রক্ত-
বর্ণ হয় কাশী থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি মাথা ধরিয়া দপ্ দপ্ করে চক্ষুর উপর চাপিয়া
ধরা বোধ হয়, বমনেন্দ্ৰা থাকে, নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে
বিশেষতঃ বৈকালে বা প্রীয়ের সময়ে ঐ সকল যাতনা বৃদ্ধি
বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্, পূর্ববৎ ।

অতিরিক্ত মদ্যের নেশায় অত্যন্ত অভিভূত হইলে যদ্যপি
তৎক্ষণাৎ নেশা ছাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—লডেনম্ * ৫ ফোটা এক গ্লাস জলের সহিত পান করিলে
তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক ।

মদ্যাদির দ্বারা নেশা করিয়া শরীরের বিকৃতি করা কোন
মতে বিধেয় নহে এই জন্যই আমাদিগের প্রাচীন যুনিগণ
এতৎ প্রদেশে মদ্যপান এককালীন নিষেধ করিয়াছেন । মদ্য

* এক প্রাকুর এলপেথি মতের ঔষধ ।

পান, তদ্রূপ “সদৃশ ব্যবস্থা” মতে নিতান্ত নিষিদ্ধ, অতএব এ মতে চিকিৎসাকালীন রোগীর (অভ্যাস থাকিলে) মদ্যপান ত্যাগ করা উচিত । কিন্তু বহু দিনের অভ্যাস এক কালীন ত্যাগ করিতে হইলে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়, তজ্জন্য যদিপি কেহ মদ্যপান ত্যাগ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়, তাহার কষ্ট নিবারণের জন্য ।

ঔষধ—সন্ধ্যা প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিগুণমাত্রায় সাত দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিবেক ।

যদিপি পানেচ্ছার অগ্গতা হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পানের ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা উক্তরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এক এক বার সেবন করিবেক ।

যদিপি দুই তিন দিবস পরে পানেচ্ছা পুনর্ব্বার বলবতী হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সন্ধ্যা, প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার সাত দিবস পর্য্যন্ত ।

যদিপি উক্ত ঔষধ, ফলদায়ক না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, বা নক্ল-বমিকা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে বা উপর্যুপরিরূপে দিবেক ।

কুইনাইন্ দোষ জন্য রোগের চিকিৎসা ।

আক্লিঙ্ক এবং পারার (মর্করি-ইত্যাদি). ন্যায় কুইনাইন্ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে শরীরকে জীর্ণ করিয়া এমত সকল রোগ উৎপন্ন করে, যে তাহার চিকিৎসার উপায় থাকে না । যদিপিও

রোগী, যত্ন হইতে রক্ষা পায় তাহা হইলেও বহুকাল পর্যন্ত ইহার ফলভোগ করে। মর্করি, অপেক্ষা ইহাকে শরীর হইতে দূর করা অতীব কঠিন, ইহাকে শরীর হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত ধৈর্য্যতা আবশ্যিক। এই ঔষধ শরীর হইতে দূর করণের প্রধান।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ক্রমশঃ সেবন করিবেক।

যদ্যপি কুইনাইনের দোষ জন্য, বাতজ দুর্বলতা, অস্থি মধ্যে যাতনা বোধ হয়, এবং ব্যায়ামকালে, কথা কহিতে, নাক ঝাড়িতে, বা উচ্চ শব্দ শ্রবণে যাতনা বৃদ্ধি বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি শরীর শীতল, ও শরীরে শীতল ঘর্ষ হয়, কোষ্ঠা-বরোধ বা অতিসার বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে।

ঔষধ—বেরাট্রম্, পূর্ণবৎ।

যদ্যপি কুইনাইন্ জন্য কামলা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কি উরিয়স্-বাইবস্ অথবা বেলাডোনা, পূর্ণবৎ।

যদ্যপি মুখেতে উত্তাপ বোধ ও মস্তকে রক্তবদ্ধ বোধ হয়, মস্তকে, বদনে, এবং দন্তে যাতনা বোধ থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা পূর্ণবৎ।

যদ্যপি ঐ জন্য কর্ণের বেদনা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পতেসটিলা, পূর্ণমাত্রা চারিঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি কুইনাইন্ দোষ জন্য পাদশোথঃ হয় অর্থাৎ পা কোলে তাহা হইলে।

ঔষধ—ফেরম্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রিতে এক বার করিয়া।

যদ্যপি ঐ জন্য পায়ের ঘা হয়, শোথঃ অম্প কাশী এবং ঘণ শ্বাস হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি একজ্বরী সময়ে কুইনাইন্ দেওয়াতে নবজ্বর অপেক্ষা অধিক কষ্ট দায়ক, প্রাচীন একজ্বরী এতাদৃশ হয়, যে তাহা দূর করা কঠিন হইয়া উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ চারি বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি কুইনাইনের দ্বারা নবজ্বর দমন হইয়া পরেতে কণ্ঠ-শূল, দন্তশূল, শিরঃশূল, এবং হস্ত পদাদিতে বেদনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পারেসিলা, পূর্ণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায় চারি বা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ববৎ দিবেক ।

পারা দোষ জন্য রোগ ।

পারা (অর্থাৎ মর্করি) নানাবিধ রূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বিরেচনের দ্বারা কোন মতেই দূর করা যায় না । কারণ ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই সমস্ত শরীরের রস ভাগে, এবং অস্থি পর্য্যন্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তজ্জন্য আদিম রোগ অপেক্ষা

* আমি এই ঔষধ দ্বারা অনেকের কুইনাইন্ দোষ জন্য জ্বর, সন্দেহভাবের আরোগ্য করিয়াছি ।

মর্করি দ্বারা ক্রমশঃ শরীর নষ্ট হইলে, তাহাকে আরোগ্য করা কঠিন হইয়া উঠে, অতএব তাদৃশ রোগে অধিক কাল চিকিৎসার প্রয়োজন।

চিকিৎসা।

যদ্যপি পারা দোষ জন্য নিম্ন লিখিত লক্ষণ লক্ষিত হয় অর্থাৎ রাত্রিতে মাথাধরা, চুল উঠিয়া যাওয়া, চক্ষুঃ লাল হওয়া এবং ফুলা, নাসিকা চাপিলে বেদনা বোধ হওয়া, মুখের চতুর্দিকে ফুসুড়ি নির্গত হওয়া, গলার ভিতর শ্লেষ্মা জমা, সদত মুখ দিয়া রস নির্গত হওয়া, মাটিতে ঘা থাকা, জিহ্বার নীচের গুঠলি ফোলা, গিলিবার সময় যাতনা বোধ, কাশী, কুচকিতে বা বগলে ফোড়া হইয়া পাকা, কিম্বা বক্ষঃস্থলে ছোট ছোট ফোড়া উঠা, পাতলা মল হওয়া, বিশেষতঃ বাতের ন্যায় অঙ্গুলি ও হস্ত, ও জাম্বুর উপর প্রদাহ বিশিষ্ট ফোলা, শরীরে কোন প্রকার ঘা হইলে, বা কোন স্থান আঁচড়াইলে, তাহাতে পুঁজ হইয়া বিস্ফুটি হওয়া, হস্ত পদাদির চর্ম্ম ফাটিয়া যাওয়া, অম্পে-তেই ঘা দিয়া রক্ত পড়া, রাত্রিতে জ্বালা এবং দপ্.দপ্. করা অপিচ জ্বর বিদ্যমান থাকে। উক্ত লক্ষণ সকলের মধ্যে কোন কোন প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে।

ঔষধ—হেপার, ৩ গুঁড়া পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার।

যদ্যপি পারা দোষ জন্য মুখ এবং গলা ও জিহ্বার নীচের গুঠলি ফোলে এবং বধির হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—হেপার এবং বেলাডোনা পূর্ব্ববৎ উপর্যুপরি বা স্বতন্ত্র ভাবে দিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে অবস্থার কিছু পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ট্যাক্সিসেপ্তিয়া, পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি রাত্রিতে যাতনা বৃদ্ধি হয়, অত্যন্ত দুর্বলতা থাকে ও যদ্যপি রোগী অতিরিক্ত বিরেচন এবং লাল নিঃসরণ জন্য দুর্বল হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, পূর্ববৎ ।

ইহা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবনের পর যদি উপকার বোধ না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, উক্ত রূপে দিবেক ।

প্রাপ্তক কোন ঔষধ সেবনের পর যদ্যপি অস্থি মধ্যে যাতনা এবং বাতের ন্যায় ফোলা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ডল্ফেমেরা, এবং পরেতে এসিডম্-ফস্ফরিকম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পারা দোষ জন্য অস্থি কোলে তাহা হইলে প্রথমতঃ ।

ঔষধ—এসিডম্-ফস্ফরিকম্, এবং ট্যাক্সিসেপ্তিয়া পূর্ববৎ ।

যদ্যপি উক্ত দুই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ণমাত্রা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর তিন দিবস পর্য্যন্ত দিবেক ।

পূর্বোক্ত কোন ঔষধ অনেক বার ব্যবহার করিয়া যদ্যপি সর্বতোভাবে রোগের লক্ষণ অন্তর্হিত না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফুর্; পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ তিন বার করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবেক । পরেতে ক্যালেকেরিয়া, ঐ রূপে ।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি অধিক পারা সেবন করিয়া পরেতে গন্ধক ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কি উরিয়স্-বাইবস্, বেলাডোনা, বা পল্লেসটিলা, পূর্ণ-মাত্রা প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করিবেক ।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মর্করি অর্থাৎ (পারা) ব্যবহার করিয়া পরেতে গন্ধক ব্যবহার না করিয়া থাকে, এবং লক্ষণানুযায়ী হেপারের নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফর, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

মাংগ্লেণিয়া বা এপ্সম্ সল্ট, ব্যবহার জন্য রোগের চিকিৎসা ।

যদি কোন ব্যক্তির উক্ত কোন প্রকার জোলাপ ব্যবহার করিয়া তজ্জন্য নিদ্রা না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ণমাত্রা শয়নের পূর্বে প্রত্যহ এক বার করিয়া সেবন করিবেক ।

যদ্যপি তজ্জন্য উদরে অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিল, পূর্ণমাত্রা দুই বা চারি ঘণ্টা অন্তর এক একবার ।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বা বিরেচন হইলেও যদি উদর অত্যন্ত দূষিত থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কলোমিসিহ, পূর্ণবৎ ।

যদ্যপি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ও মল নিঃসৃত না হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ।

• যদি রোগীর অতিশয় যাতনা থাকে এবং জ্বরের সহিত অত্যন্ত জ্বালা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, পূর্ণমাত্রায় অবস্থানুসারে, তিন হইতে ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি পাতলা মল, বিরেচিত হইতে থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল্লেসটিলা, পূর্ববৎ ।

হুল বিশিষ্ট কীটাদির আঘাত বা দংশন ।

বিচ্ছ বা কাঁকড়াবিচ্ছা, রুশ্চিক, ভীমরুল, ভ্রমর, বোলতা, মোমাছি, ও ডাঁশ, মসা, ছারপোকা, মাকড়শা, প্রভৃতির কামড় বা আঘাত যদ্যপিও কদাচিৎ মারাত্মক নয়, তথাচ যখন কোন কোন স্থান বিশেষ আক্রমণ করে তৎকালে আশু অত্যন্ত পীড়া-দায়ক হয় ।

চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ উক্ত প্রকার কীট বা পতঙ্গে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান শীতল জল দিয়া ধোত করিবে, এবং কপূরের ঘ্রাণ লইবে । যদ্যপি তজ্জাতীয় জীব তৎকালে ধরা যায় তাহা হইলে তাহাকে দলিয়া ঘায়ের উপর দিবে । যদ্যপি সহ্য হয় তাহা হইলে দৃষ্ট স্থান অগ্নির উত্তাপে কিয়ৎকাল ধরিলে তৎক্ষণাৎ যাতনার নিরুত্তি হইবে । হুল ফুটিয়া থাকিলে ঘায়ের উপর থুথু দিয়া নখ বা সোণা দ্বারা যত্ন পূর্বক উঠাইবে এবং তদনন্তর কপূরের ঘ্রাণ লইয়া পরে ।

ঔষধ—আর্গিকা, (অমিশ্র আরক) সেই ঘায়ের উপর দুই, তিন, বার লাগাইলে আরোগ্য হইবেক, এবং আর্গিকা, বটিকা পূর্ণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায় দুই, তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ দ্বারা ফুলা এবং জ্বর নিবারিত না হয়
ও কর্পূরের আঁগ লইলেও উপশম বোধ না হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা, পূর্ববৎ অথবা আর্গিণার সহিত
উপর্যুপরি রূপে দিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধদ্বয় সেবনের পর ফুলা থাকে তাহা

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা, অর্ধ ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর উপশম বোধ না
হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কি উরিয়স্-বাইবস্, পূর্ববৎ কিন্তু ক্রমশঃ বোগের
যাতনা এবং চিক্লের লাঘব বোধ হইলে সময় অধিক করিয়া দিবেক।

আঘাত।

দৈবাৎ কোন স্থানে পতিত হইয়া আঘাত লাগিলে
প্রথমতঃ।

ঔষধ—আর্নিকা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর চারি দিবস পর্য্যন্ত
সেবন করিবেক। এবং আর্নিকা (অমিশ্র আরক) ১০ ফোটা পরিমাণে
অর্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ৩। ৪। বার করিয়া ধৌত
করিবে।

যদ্যপি পাদ বিক্লেপ কালীন ভ্রমবশতঃ পতিত হইয়া
তজ্জন্য মাথা ধরে তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ।

উক্ত প্রকার অবস্থায় ককিউলস্, এসিডম্-কম্ফরিকম্, ও
পূর্বোক্ত প্রকারে দেওয়া যায়।

যদ্যপি পতন জন্য হস্ত পদাদিতে বেদনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পরেসটিলা, অথবা ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে এবং সন্ধ্যাকালে ।

যদ্যপি ভয় জন্য পতিত হইয়া উক্ত প্রকার বেদনাদি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পতন জন্য মুচ্ছা হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ,

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ববৎ কিন্তু পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বার মুচ্ছার পর অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে দিবেক ।

যদ্যপি পতন জন্য অস্থিরতা প্রবল হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ণমাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

মোচ্ড়ানি বা মচ্কিয়া যাওয়া ।

কোন স্থান কোন প্রকার কারণবশতঃ যদ্যপি মচ্কিয়া যায় ও সেই স্থান ফুলিয়া লাল হইয়া থাকে অথবা রক্ত জমিয়া কাল-শিরা পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, (অমিশ্র আরক) ত্রিশ ফোটা পরিমাণে এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিন বার করিয়া তদ্বারা ধৌত করিবেক ।

যদ্যপি রক্ত জমিয়া না থাকে এবং পূর্বোক্ত প্রকারে যাতনা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্লস্-টক্সিকোডেওন্ (অমিশ্র আরক) পূর্ববৎ ব্যবহার করিবেক এই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগকালীন প্রত্যহ এক এক মাত্রা সেবনও করিবেক ।

উক্ত ঔষধ ব্যবহারের পর যদিও পীড়িত স্থান বলহীন বা আড়ষ্ট হইয়া থাকে এবং চালনা করিতে অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, সল্ফর, ক্যাল্কেরিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে । এক এক ঔষধ ক্রমশঃ চারি দিবস করিয়া ক্রমাগত সেবন করিবেক ।

যদিও উপরোক্ত লক্ষণ সকল উক্ত প্রকারে অন্তর্হিত না হয় এবং যাতনাদি অধিক কাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে দশ মিনিট পরে ।

ঔষধ—সিপিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে আট দিবস পর্যন্ত সেবন করিয়া পরেতে কষ্টিকন্-উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবেক ।

যদিও বাহ্যিক যাতনার সহিত উত্তাপ ও রক্তবর্ণত্ব দেখা যায়, এবং তাহার সহিত জ্বর ও অস্থিরতা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া সেবন করিবেক । কিন্তু ঐ ঔষধ ব্যবহার কালীন অন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিবেক না ।

ক্ষত

ক্ষত অর্থাৎ ঘা ছয় প্রকার, এক কাটা ঘা, অর্থাৎ কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া যে ঘা হয় । দুই ছেঁড়া ঘা, অর্থাৎ অস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন না হইয়া কোন প্রকার গুরুতর টানে মাংসাদি ছিঁড়িয়া যে ঘা হয় । তিন ছাঁচা ঘা, কোন প্রকার গুরুতর বস্ত্র-আঘাত দ্বারা যে ঘা হয় । চারি খোঁচা ঘা, কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা খোঁচা লাগিয়া যে ঘা হয় । পাঁচ, গুলির ঘা । - ছয়, জন্তুর দস্ত-নখাদি দ্বারা যে ঘা হয় ।

নদুশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা ।

কাটা ঘায়ের চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ রক্তবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা আহত স্থান বাঁধিয়া অতি শীতল জল বা বরফ দিয়া ভিজাইবে, যত বার শুষ্ক হইবে তত বার পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া দিবেক । . এবং আর্গিকা অথবা ক্যালেন্ডিউলা, অমিশ্র আরক পূর্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ভিজাইবেক । ক্ষত আরোগ্য হইবার পূর্বে যদিপি তাহা হইতে অতিরিক্ত পুঁজ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে আর্গিকা অপেক্ষা ক্যালেন্ডিউলা অধিক উপকারক, তদ্রূপ পুঁজ না হইলে ক্যালেন্ডিউলা অপেক্ষা আর্গিকা অধিক উপকারক । কেবল যখন আর্গিকা, দ্বারা ক্ষত, ফুলিতে আরম্ভ হয় তৎকালে দেওয়া কর্তব্য নহে ।

যদিপি ক্ষত পাকিয়া পুঁজ হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণমাত্রা ৪৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক ।

যদিপি রোগী বলবান্ এবং দৃঢ়কায় হয়, ও অত্যন্ত প্রবল জ্বর বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর আর্গিকার সহিত ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করিবেক ।

ছিন্নক্ষত অর্থাৎ ছেঁড়া ঘায়ের চিকিৎসা ।

এই প্রকার ঘায়ে প্রথমতঃ একখানি বস্ত্র খণ্ড গদির ন্যায় করিয়া ঘায়ের উপর দিয়া পুনঃ পুনঃ শীতল জলের দ্বারা ভিজাইবে । এবং যদিপি পাকিতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে নিম্ন লিখিত মতে ঔষধ সেবন করিবে ।

যদ্যপি বাহ্য চিকিৎসা দ্বারা ক্ষত শুষ্ক হইবার উপক্রম না দেখা যায়, যাতনা অধিক প্রবল হয়, ও অতিরিক্ত গুঁজ নিৰ্গত হইতে থাকে, তৎকালে উক্ত প্রকারে জল দেওয়া বন্ধ করিয়া।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পুন্নাভ্রা প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে বিশেষ উপকার বোধ না হয় তাহা হইলে উক্ত ঔষধে শেষ যাত্রার চাক্ষুশ ঘণ্টা পরে।

ঔষধ—হেপার্ব পূৰ্ণবৎ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—সাইসিসিমা, পূৰ্ণবৎ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—সরফর্ উক্ত ঔষধের সহিত পূৰ্ণোক্তরূপে উপর্যুপরি প্রত্যেক চতুর্থ দিবসে আবহ্য করিবেক।

ছাটা ঘায়ের চিকিৎসা।

প্রথমতঃ শীতল জল দ্বারা পূৰ্ণোক্ত মতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইবেক তাহার পর যদ্যপি অতিরিক্ত রক্ত নিৰ্গত হইতে থাকে তাহা হইলে, আর্গিকার অমিশ্র আরক এক ফোঁটায় দশ ফোঁটা জলের পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত জলের দ্বারা আহত স্থান ধৌত করাইবে।

এই প্রকার ঘায়ের প্রথমাবস্থায় বা পরে।

ঔষধ—জার্মিকা, পুন্নাভ্রা ১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক।

খোঁচা ঘায়েৰ চিকিৎসা ।

এই প্রকার ঘায়ে প্রথমতঃ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা কষিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর কেবল শীতল জল বা আর্গিকার অমিশ্র আরক (প্রাণ্ডক্তরূপে) জলে মিশ্রিত করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি এই প্রকার ক্ষত হইবা মাত্র দাঁতি লাগে তাহা হইলে, এবং তজ্জন্য কোন প্রকার ভয়ানক লক্ষণ উপস্থিত না হয়, তন্নিমিত্তে ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণমাত্রা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি জ্বর লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ স্বতন্ত্র বা আর্গিকা সহি উপর্যুপরিরূপে দিবেক ।

যদ্যপি বাহ্যে অত্যন্ত কোলা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোদীলা, বা বেলাডোনা, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক । ইহার মধ্যে প্রথম ঔষধ, যদ্যপি অমহা যাতনা থাকি তৎকালে বিশেষ উপকারক ।

যদ্যপি এতাদৃশ ক্ষত মধ্যে পুঁজ হইতে আরম্ভ হয় এবং আরোগ্য লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ সাইলিশিয়া ভংগার পর মর্কিউরিয়স্, পূর্ণমাত্রায় ক্রমশঃ ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক, বিস্ত্র প্রথমোক্ত ঔষধের আট মাত্রার পর বার ঘণ্টা অন্তর দ্বিতীয় ঔষধ আরম্ভ করিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা আরোগ্য বোধ না হয় অথবা আংশিক উপশম বোধ হয় তাহা হইলে শোষোক্ত ঔষধের ছয় মাত্রার শেষে বার ঘণ্টা পরে, এবং যদ্যপি ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফর; পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ ত্রিবার এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক ।

গুলির ঘায়ের চিকিৎসা ।

শরীরে গুলি প্রবিষ্ট হইলে তাহা যত্নের সহিত উদ্ধার করিবেক । যদিও তাহা সহজে নির্গত করা দুঃসাধ্য বোধ হয় তাহা হইলে তাহাকে পাকাইয়া নির্গত করিতে হইবেক । অতএব প্রথমতঃ বস্ত্র খণ্ড অথবা মসিনা দ্বারা গদি প্রস্তুত করিয়া ঘায়ের উপর বাঁধিয়া, জল দিয়া পুনঃ পুনঃ ভিজাইবে অথবা আর্গিকার অমিশ্র আরকের বিশ ফোটা এক ছটাক জল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত জলের দ্বারা ভিজাইবে ।

যদ্যপি ক্ষত নিতান্ত পাকাইয়া অন্তরস্থ পদার্থ নির্গত করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ।

উষধ—সাইলিশিয়া, এবং পরেতে হেপার্ড ও সলফর পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

ষষ্ঠ প্রকার ঘায়ের চিকিৎসা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

জ্বর বিদ্যমান্ কালে জ্বরের ব্যবস্থার ন্যায় পথ্যদেবে এবং পরেতে লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে । রোগী স্থির হইয়া থাকিবে । কোন মতে অঙ্গ চালনা ইত্যাদি (যদ্বারা যাতনা বা ঘায়ের রুদ্ধি হয় এতাদৃশ ক্রিয়া) কদাচই করিবে না । ঘায়ে পুঁজ হইলে মৎস্য, অন্ন, মিষ্ট দ্রব্যাদি, দুগ্ধ, এবং স্নাত পর্য্যন্ত বর্জন করিবেক । কোন প্রকার নেশা বা উৎসাহের কার্য্য করিবেক না, যাহাতে শোণিত উষ্ণ করে, তাদৃশ কর্ম্ম মনো নিবেশ করা বিধেয় নহে, রোগীর বল রাখিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে মাংসের ক্বাথ দেওয়া যাইতে পারে ।

চর্ম রোগ ।

রক্তকুষ্ঠ ।

লক্ষণ—শরীরের কোন স্থানে প্রথমে উত্তাপ হইয়া বিস্তার
ন্যায় যাতনা আরম্ভ হয়, পরেতে আক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ হইয়া
ফুলিয়া উঠে । কিয়ৎকাল পরে জ্বালা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার
ন্যায় যাতনা বোধ হয়, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে ক্ষণমাত্র রক্তবর্ণত্ব
দূর হইয়া অঙ্গুলি তুলিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ ধারণ করে, এবং
জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে । অনিদ্রা, শুষ্ক জিহ্বা, বমনেচ্ছা,
পাকস্থলী চাপিয়া ধরা, এবং মাথাধরা ও থাকে । অম্প দিবস
মধ্যে আক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণের পরিবর্ত্তে পীতবর্ণ হয়, এবং রোগ
বদনে আক্রমণ করিলে ভয়ানক রূপে ধারণ করে ।

নিদান—অগ্নিমান্দ্য, প্রবল মনোবেগ বিশেষতঃ স্ত্রীলো-
কের রজস্বলা কালীন অনেকেরই এই রোগ দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।

যখন এই রোগ উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ প্রবল জ্বর থাকে
অথবা চর্ম উত্তপ্ত ও শুষ্ক থাকে তৎকালে অথবা অন্য সময়ে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ক্রমশঃ নাড়ী
শীতল ভাব ধারণ করা পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদ্যপি রক্ত বর্ণ, সূর্য্য কিরণের ন্যায়, চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হয়,
এবং উত্তাপের সহিত অত্যন্ত জ্বালা থাকে, আক্রান্ত স্থান
শরীর চার্লিত করিলে অতিশয় যাতনা বোধ হয়, অত্যন্ত মাথা
ধরা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, নিদ্রার অম্পতা, প্রলাপ তন্ত্রা ইত্যাদি

থাকে, এবং মাংসপেশী সকল সঙ্কোচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্দ্ধমাত্রা রোগের তীব্রাবস্থায় তিন ঘণ্টা অন্তর অথবা ছয় হইতে বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক। কিছু দিন এই ঔষধ ব্যবহার করিলেই এই রোগে শান্তি হইবে।

যদ্যপি আক্রান্ত স্থানের বর্ণ অতিরিক্ত লাল না হইয়া ঈষৎ রক্ত-বর্ণের সহিত নীল-বর্ণ হয় এবং পীড়া এক স্থানে অন্তর্হিত হইয়া অপর স্থানে প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ যদ্যপি কর্ণের বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে কোষ্কার ন্যায় হইয়া পীড়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেসেটিলা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার।

যদ্যপি রক্তকণ্ডু পাকিয়া তাহাতে পুঁজ হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফর, আর্সেনিকম্, এই উভয় ঔষধের অনাতর একটা পূর্ণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক এক বার করিয়া দিবেক।

পথ্য ব্যবস্থা।

এই রোগে যখন জ্বর বিদ্যমান থাকে তৎকালে জ্বর কালীন পথ্য ব্যবস্থার ন্যায়, এবং জ্বর লক্ষণের লাঘব হইলে লঘু আহার দিবেক, কিন্তু যদ্যপি এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ বিকার লক্ষণ উপস্থিত হইয়া নাড়ী বসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তৎকালে বলকারক দ্রব্য অর্থাৎ মাংসের ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে পোর্ট নামক মদ্য জল মিশ্রিত করিয়া অত্যল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ দিবেক। এই রোগে আক্রান্ত

হইলে এবং আরোগ্য হওয়ার লক্ষণ উপস্থিত হইলেও কোন মতে যাহাতে শীতল সেবা করা না হয় তাহা করিবেক ।

স্ফোটক অর্থাৎ ফোড়া

লক্ষণ—গোল অথবা অগ্নাকৃতি হইয়া চর্ম্মের উপর ক্রমশঃ প্রদাহের সহিত ফুলিয়া উঠে এবং পরেতে পাকিয়া প্রথমতঃ রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয়, এবং কঠিন পুঁজের দানা (বিচি) নির্গত হইলে শুখাইয়া যায়, কিন্তু পরেতে কিছু কাল পর্য্যন্ত কঠিন গুঠলি হইয়া থাকে ।

নিদান—কোন কোন ব্যক্তির স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, আরও চুল্কানি বা অন্য কোন প্রকার চর্ম্মরোগ শেষ হইলে অথবা জ্বরের পর হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ কোড়া উঠিলে এক খানি পাতলা বস্ত্রখণ্ড দুই পাট করিয়া তাহা জলের দ্বারা ভিজাইয়া কোড়ার উপর রাখিয়া তাহার উপর আর এক খানি শুষ্ক বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া দিবেক, এবং যত বার শুখাইবে ততবার পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া দিবে । যখন অত্যন্ত প্রদাহ বিশিষ্ট হইয়া যাতনার সহিত ফুলিয়া উঠে তখন মসিনা বাটিয়া গরম করিয়া ফোড়ার উপর পোলটিম্ দিবে ।

যদ্যপি এই রোগ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, এবং অত্যন্ত যাতনা দেয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্গিকা, এবং সফর, পূর্ণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃ এবং রাত্রিতে উপর্যুপরি সেবন করিবে ।

যদ্যপি ফোড়া অত্যন্ত প্রদাহ বিশিষ্ট দেখা যায়, এবং তাহার সহিত অতিশয় জ্বর ও অস্থিরতা থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্জুনাত্মা ছয় ঘণ্টা অন্তর (জ্বর লক্ষণ নিবারণ হওয়া পর্য্যন্ত) ।

যদ্যপি ফোড়া ফুলিয়া অগ্নিবৎ বা রক্তবর্ণ দেখায়, কিম্বা হস্ত পদাদির অগ্রভাগে উঠিয়া তাহার সহিত কুচ্কি ও বগলের নীচে গুঠলি সকল ফুলিয়া বেদনা বোধ হয়, ও পিপাসা, মাথাধরা, শরীরে উত্তাপ ইত্যাদি থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দ্বারা অন্যান্য লক্ষণ, নিরাক্রান্ত হইয়া কেবল ফুলা মাত্র থাকে, এবং পূর্কোক্ত ঔষধে দমন করিতে না পারে তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ণবৎ । এই ঔষধ পূর্কোক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার চক্ষিষ ঘণ্টা পরে আরম্ভ হইবেক ।

ফোড়ার ভিতর পুঁজ হইলে তাহা উপরে উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—হেপার্, পূর্ণমাত্রা ছয় বা আট ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

জ্বর বিদ্যমান থাকার সময় জ্বর কালীন ব্যবস্থার ন্যায়, এবং তাহার পর লঘু আহার করিবেক, আমিষ ভক্ষণ করিবেক না, মদ্যাদি বা অন্য প্রকার মাদক দ্রব্য বর্জিত করিবেক, শীতল জলে স্নান, ওবৎ শীতল জল পান দ্বারা বিশেষ উপকার হয়, প্রত্যহ নিয়মিত কালে আহার ও শয়নাদি করা, এবং নিয়মিত রূপে বহির্দেহে ব্যায়াম করা বিধেয় ।

রক্তবর্ণ ব্রণ ।

লক্ষণ—এই ব্রণ বা, স্ফোটিক, অনেকাংশে সামান্য ফোড়ার ন্যায় হয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন রূহদাকার বিশিষ্ট হয়, এবং প্রদাহ বিশিষ্ট ফুলা থাকে, উপরে চিক্ চিক্ করে, ও মধ্যস্থলে লাল বর্ণ বা দীপ্য নীলবর্ণ বা ক্লষ্ণবর্ণ দাগ দেখা যায় বিশেষতঃ ইহার মধ্যে বিচি থাকে না, যদিপি ইহাকে প্রথমতঃ দমন না করা যায় তাহা হইলে চতুর্দিকে মুখ হইয়া পুঁজ পড়িতে থাকে শেষে উপরে শুষ্ক চামড়া পড়িয়া অভ্যন্তরে গভীর গর্তের ন্যায় ঘা দেখা যায়, এই রোগ উপস্থিত হইলে মাথাধরা, পিপাসা, জিহ্বা মলিন, আহারে অনিচ্ছা, অস্থিরতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গসকল উপস্থিত হয়, যদিপি ঘা সামান্য হয়, এবং সুন্দর রূপ চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ উপসর্গ দূর হইতে থাকে, কিন্তু যদিপি অধিক দূর পর্য্যন্ত মাংস গলিয়া যায়, তাহা হইলে বিকার লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এই রোগ, স্থান বিশেষে অথবা ঘাড়ে হইলে ঘাড়মাণ্ডরা, পৃষ্ঠে হইলে, পৃষ্ঠাঘাত বা পৃষ্ঠব্রণ, উরু দেশে হইলে উরু-স্তম্ভ প্রভৃতি আখ্যা হয় ।

চিকিৎসা ।

এই রোগে অন্যান্য উপসর্গ না হইয়া যদিপি কেবল অতিশয় যাতনা এবং কষিয়া ধরা থাকে তাহা হইলে ফোড়ার উপর স্কেরার ন্যায় করিয়া অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া এক খানি বস্ত্র খণ্ড দুই তিন পাট করিয়া তাহার উপর রাখিয়া শীতল জলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভিজাইবে ।

এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া সেবন করিবেক ।

যদ্যপি ফোড়া ঈষৎ নীলবর্ণ হয়, এবং শীঘ্র বিস্তৃত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তৎকালে।

ঔষধ—ল্যাকসিস্, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা দিয়া পরেতে প্রাতঃকালে এবং রজনীতে এক এক বার করিয়া দিবেক।

যদ্যপি মাংস গলিয়া যাইবার উপক্রম হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, নাড়ী বেগবতী হয়, আর যদ্যপি এই রোগ সংক্রমণ জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—আসেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে সর্বতোভাবে আরোগ্য বোধ না হয় তাহা হইলে।

ঔষধ—চায়না, রসটক্লি-কোডেগুন, বা সাইলিশিয়া ইহার মধ্যে যে কোন একটি ঔষধ পূর্ণমাত্রায় রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া দিবেক।

পথ্য ব্যবস্থা।

এই রোগের সামান্যাবস্থায় লঘু আহার করিবেক কিন্তু যখন যা গলিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন বলকারক পথ্য দেওয়া নিতান্ত বিধেয়, যদ্যপি রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অত্যপ্প পরিমাণে, পোর্ট নামক মদ্য পুনঃ পুনঃ দেওয়া আবশ্যক।

কণ্ডু অর্থাৎ চুল্কনা।

লক্ষণ—চর্মের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি উঠে, তাহার উপরিভাগ স্বচ্ছ এবং তাহা হইতে জলের ন্যায় ক্লেদ নির্গত হয় ও তাহার মধ্যে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র কীট থাকে। এই

রোগ মুখ ভিন্ন সর্বাদ্বে বিশেষতঃ করতয়ে, অঙ্গুলির অভ্যন্তরে, এবং ঘোড়ের স্থানে হয়, নিয়ত অসহ্য রূপে চুল্কায; ইহার সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকেনা।

চিকিৎসা ।

এই রোগে সামান্যতঃ আন্তরিক এবং বাহ্যিক চিকিৎসার প্রধান ।

ঔষধ—সফরু দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে দশ দিন পর্যন্ত সেবন করিবেক তাহার সাত দিন পরে পুনর্বার ঐ রূপে আরম্ভ করিবেক । অনিষ্ট আরক বিষ্ কোটা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা এক খানি বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থান সকলে রাত্রি এবং প্রাতঃকালে সময়ে সময়ে দিবেক, রোগের সামান্যাবস্থায় ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে ।

বিশেষ চিকিৎসা ।

যদ্যপি চুল্কনা দিয়া রক্ত পড়ে...মর্কি উরিয়স্, সফরু ।

” ” শুষ্ক হয়...কষ্টিকম্, ল্যাকিসিস্, সিপিয়া, সফরু ।

” ” মলিন পুঞ্জ পড়ে...কষ্টিকম্, সিপিয়া, সফরু ।

” ” জলবৎ আব হয় ... { কার্বো-বেজিটেবিলিস্,
কষ্টিকম্, সফরু ।

চুল্কনা বস্তু অর্থাৎ তলপেটে হইলে...ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্ ।

” চরণে হইলে... .. এগিডম্-ফস্ফরিকম্ ।

” পায়ের পাতায় হইলে ঐ

এই সকল ঔষধ দ্বিগুণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবেক ।

পাচ্ড়া ।

লক্ষণ—এই রোগ প্রথমতঃ চুল্কনা হইয়া পরেতে পাকিয়া পাচ্ড়া রূপে পরিণত হয়, চুল্কনা এবং পাচ্ড়া উভয়ই সংক্রামক রোগ ।

চিকিৎসা ।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগীকে, একটী রুহৎ গাম্-লায় গরম জল ঢালিয়া তাহাতে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া বসাইবে, এবং সল্ফর, বা মর্কিউরিয়স্ দ্বিগুণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবেক ।

পথা ব্যবস্থা ।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মৎস্য, দুগ্ধ, শিষ্টান্ন এবং নদ্যাদি এক কালীন বর্জ্জন করিবেক, প্রত্যহ উষ্ণ জলে সাবানের দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিয়া স্নান ও পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান, পরিষ্কৃত স্থানে বাস করিবেক এবং তাদৃশ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সহিত এককালীন সহবাস পরিত্যাগ করিবেক ।

দক্র (দাউদ) ।

লক্ষণ—এই রোগ নানা প্রকার হইয়া থাকে, সামান্যতঃ লক্ষণ এই যে, চর্ম্মের উপর চুল্কাইয়া ক্ষুদ্র বা রুহৎ চক্রাকার হয়, চতুষ্পার্শ্বে উন্নত ও মধ্যস্থান সমান থাকে ।

চিকিৎসা ।

- যদ্যপি দ্রুত দিয়া রক্ত গড়ে...ডল্কেমেরা, লাইকোপোডিয়ম্ ।
- ” ” কটা বর্ণ হয়...ডল্কেমেরা ।
- ” ” জ্বালা করে ... { আসেনিকম্, কোনিয়ম্,
মর্কিউরিয়স্ সল্ফর ।
- ” ” প্রাচীন হয়...কোনিয়ম্, ল্যাকিসিস্, সল্ফর ।
- ” ” ফাটা ফাটা হয়...লাইকোপোডিয়ম্ ।
- ” ” শুষ্ক হয়...ডল্কেমেরা, ফস্ফরস্, সল্ফর, বেরাট্রম ।
- ” ” ঈষৎ কটা বর্ণ হয়...সল্ফর ।
- ” ” দিয়া জলবৎ রস { ক্যালেকেরিয়া, কফিকম্,
নির্গত হয়... { গ্র্যাফাইটিস্, সল্ফর ।
- ” ” চক্ষুতে বা চক্ষুর পাতায় হয়...ত্রায়োনিয়া ।
- ” ” কর্ণে হয়.....সিপিয়া ।
- ” ” মুখে হয়... { ব্যারায়্‌টা, ল্যাকিসিস্,
ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্ ।
- ” ” গালে হয়...কফিকম্, মর্কিউরিয়স্ ।
- ” ” দাড়িতে হয়...সাইলিশিয়া ।
- ” ” মুখে হইয়া তিতর নীলবর্ণ হয়...জিঙ্কম্ ।
- ” ” লিঙ্গে হয়...ডল্কেমেরা, পিট্রোলিয়ম্ ।
- ” ” উরু ও বস্তুর মধ্যস্থানে (কাচদাদ্)...পিট্রোলিয়ম্ ।
- ” ” বক্ষঃস্থলে ও স্তনের বোঁটে...কফিকম্, ডল্কেমেরা ।
- ” ” মাজার উপর, পৃষ্ঠদেশে...লাইকোপোডিয়ম্ সিপিয়া ।
- ” ” ঘাড়ে...লাইকোপোডিয়ম্, পিট্রোলিয়ম্, সিপিয়া ।
- ” ” বাহুতে হয়...মর্কিউরিয়স্; ফস্ফরস্ ।
- ” ” হস্তে হয়...ডল্কেমেরা, ইপিক্যাকুয়ানা, জিঙ্কম্ ।
- ” ” হস্তের অঙ্গুলিতে...গ্র্যাফাইটিস্, এনিডম্-নাইট্রিকম্ ।

- „ „ উরুদেশে...গ্রাফাইটিস্, মর্কিউরিয়স্ ।
 „ „ জাহুতে...আর্সেনিকম্, ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্ ।
 „ „ চরণে...গ্রাফাইটিস্, ল্যাকিসিস্ ।
 „ „ গুঠেফ (গুড়মুড়া)... { ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্,
 পিট্রোলিয়ম্ ।
 „ „ পায়ের অঙ্গুলিতে.....এলম্ ।

এই সকল ঔষধ লক্ষণানুযায়ী বিবেচনা পূর্বক পূর্ণ মাত্রায় বার ঘণ্টা অন্তর অথবা দ্বিগুণ মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে, সেবন করিবেক, এবং যখন যে ঔষধ সেবন করিবেক সেই ঔষধের চারিটা বটিকা পরিমাণে এক ছটাক জলে ফেলিয়া প্রস্তুত জলেরদ্বারা প্রত্যহ দুই বার করিয়া আক্রান্ত স্থান ধৌত করিবেক ।

পথা ব্যবস্থা ।

এই রোগাক্রান্ত রোগী লঘু আহার করিবেক, যে কোন দ্রব্য শোণিত উষ্ণ করে তাহা এবং মৎস্তাদি ত্যাগ করিবেক, লবণ পাকের দ্রব্য বর্জ্য করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়, প্রত্যহ সাবানের দ্বারা অঙ্গ পরিষ্কার করিয়া শীতল জলে স্নান পরিশুদ্ধ শয্যায় শয়ন ও পরিশুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান করিবেক, নিয়মিত রূপে ভ্রমণাদি দ্বারা ব্যায়াম কর্তব্য ।

পোড়া বা ঝল্‌শান ঘা ।

অগ্নি বা অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত কোন পদার্থ, চর্ম্মের উপর সংলগ্ন হইলে বা উষ্ণ জলাদি বা তৈল স্নাতাদি পতিত হইলে চর্ম্মের সেই স্থান দগ্ধ হয়, তাহা তিন প্রকার ।

প্রথমতঃ, যদ্বারা কেবল চর্ম্মের উপর প্রদাহ মাত্র হয়, কখন ফোঁকা উঠে অথবা উঠে না ।

দ্বিতীয়তঃ, চর্ম্মের শক্তিহীন করে, চর্ম্ম উঠিয়া যায়, এবং নিকটস্থ স্থান অথবা চর্ম্মের নিম্নে পাকিয়া উঠে ।

তৃতীয়তঃ, দক্ষ স্থানের শক্তি এরূপ লোপ হইয়া যায় যে এক কালীন শুষ্ক চর্ম্ম থাকিয়া নিম্নে যা হইয়া যায় ।

যদ্যপি অবস্থা বা ব্যয়ক্রম অথবা স্থান বিশেষে, দহনের পরিমাণ অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে কয়েককালের মধ্যে রোগী বিকার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া কাল প্রাপ্ত হয় ।

বাহ্যিক চিকিৎসা ।

কোন স্থান সামান্য দক্ষ হইলে, দুই মিনিট পর্য্যন্ত পুনর্বার উত্তাপে ধারণ করিবেক ।

যদ্যপি অধিক পরিমাণে দক্ষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্ণিকা “অমিশ্র আরক” ছয় গুণ জলে মিশ্রিত করিয়া দক্ষস্থান, তদ্বারা দশ মিনিট পর্য্যন্ত ধৌত করিবেক ।

ফোঁকা নিবারণ জন্য শীতল জল দক্ষ স্থানের উপর দেওয়ার পূর্বে ।

ঔষধ—ক্যাথ্যারাইডিস্, (অমিশ্র আরক) দুই ফোঁটা পরিমাণে প্রত্যেক এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা এক খানি বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া দক্ষ স্থান বান্ধিয়া দিবে । শুষ্ক হইলে পুনর্বার ভিজাইয়া দিবে এই রূপে বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিবে ।

যদ্যপি দক্ষ হওয়ার পর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রকার ঔষধ না দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কটিকম্ণ্ড আরক তিন ফোঁটা পরিমাণে প্রত্যেক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া এক খানি বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া দক্ষ স্থানের উপর দিবে, যত বার শুষ্ক হইবেক তৎক্ষণাৎ পুনর্বার ভিজাইয়া দিবেক ।

যদ্যপি দন্ধ স্থানের উপর চর্ম্ম শুখাইয়া নীচে ঘা বোধ হয়, এমত ভয়ানক স্থলে ।

ঔষধ—ক্যালোডিওল (অগ্নিশ্র জারক), পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ প্রত্যেক তোলা জলে দুই ফোটা করিয়া মিসাইয়া এক খানি বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া আহত স্থানে দিবেক ।

যদ্যপি অত্যন্ত দন্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই স্থানের উপর তুলা অথবা ময়দা বিছাইয়া দিবেক এবং তাহা পরিষ্কার করিবার সময় ঘায়ের উপর পোলিটম্ দিবেক ।

আভ্যন্তরিক চিকিৎসা ।

যদ্যপি দহন অতি সামান্য হয়, এবং উপরের চর্ম্ম মাত্র কিঞ্চিৎ দন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আণিকা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে ।

যদ্যপি অতিরিক্ত জ্বালা বোধ হয়, এবং ক্রমশঃই কষ্ট-দায়ক হইয়া উঠে তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ ।

উক্ত ঔষধ তিন চারি মাত্রা দিয়া যদ্যপি যাতনার লাঘব না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জ্বর বিদ্যমান থাকে এবং নাড়ী অতিশয় বেগবতী হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

গুরুতর অবস্থার চিকিৎসা ।

যদ্যপি অতিশয় দৃঢ় জন্য রোগী বিকার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হয় নাড়ী প্রায় বসিয়া যায়, শীত বোধ এবং কম্প ইত্যাদিও থাকে, ও যদ্যপি তাহার সহিত মনোমধ্যে ভয়ের উদয় হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্; পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যখন আরোগ্য হইবার লক্ষণ উপস্থিত হয় কিন্তু জ্বর বিদ্যমান থাকে তৎকালে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর পুনঃ ২ দিবেক ।

যদ্যপি মল্লাবস্থা হইতে পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা ক্রমশঃ বল প্রাপ্তির লক্ষণ না দেখা যায় এবং অতিশয় ঘা বৃদ্ধি হওয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর ।

পথ্যব্যবস্থা ।

প্রথমতঃ যদি অতিরিক্ত দৃঢ় হইয়া থাকে এবং জ্বর বিদ্যমান থাকে, তৎকালে এক এক বারে অল্প পরিমাণে লঘু আহার দিবেক এবং পরেতে বলকারক দ্রব্য অর্থাৎ মাংসের ক্বাথ, অল্প পরিমাণে পোর্ট নামক মদ্যের সহিত দিবেক, কিন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থা রোগীর মৃত্যু আশঙ্কা হইলে মাত্র । মৎস্য, দুগ্ধ, এবং যাহাতে শরীরের কদর্য রস জন্মায় তাদৃশ দ্রব্যাদি এক কালীন বর্জিত করিবেক ।

সাধারণ ক্ষত।

অস্ত্র দ্বারা ক্ষেদন, ছাঁচা, দহন বা স্ফোটক হইতে বহুকাল স্থায়ী ক্ষত, উৎপন্ন হইতে পারে এবং ইহা নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ অলস স্বভাব ব্যক্তিদিগের কিম্বা যাহারা অন্যায় রূপে আহার ব্যবহারাদি করে তাহাদিগের শরীরে স্বভাবতঃ হয়।

যদ্যপি শেযোক্ত কারণ জন্য হয় তাহা হইলে, প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ফুক্ষুড়ি উঠিয়া, উত্তাপবিশিষ্ট, ও রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া, পরেতে ফাটিলে চর্ম্মের ভিতর গর্ত্ত দেখা যায়, এই রূপে নানা বিধ পূর্বরূপ উপস্থিত হইয়া পরেতে ক্ষত হয়।

চিকিৎসা।

যখন ক্ষত ঈষৎ নীলবর্ণ বা রক্তবর্ণ দেখা যায় এবং স্পর্শ মাত্রেই রক্তপাত হয়, ও পাতলা পুঁজ, রক্ত-মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়, কিনারা অসমান এবং কঠিন থাকে ও অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—আসেনিকম্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিয়া তাহার চারি দিন পরে পুনর্বার ঐ রূপে আরম্ভ করিবেক।

উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকিয়া বিশেষতঃ যদ্যপি ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গত হয়, এবং সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিতে জ্বালা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ স্বতন্ত্ররূপে, অথবা পূর্বোক্ত রূপে উক্ত ঔষধের সহিত উণর্ঘ্যুপরি প্রকারে দিবেক।

যদ্যপি ক্ষত বৃহৎ হয় অথবা শীঘ্র বিস্তৃত হইবার উপক্রম দেখা যায়, বা তাহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা, বা ফুক্ষুড়ি থাকে

বিশেষতঃ যদিপি অতিরিক্ত কোলা এবং চতুষ্পার্শ্বে বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিসিস্, পূৰ্ব্ববৎ ।

যদি ক্ষত হইতে পাতলা দুৰ্গন্ধ পুঁজ নির্গত হয় তাহা হইলে ।

ঔষধ—মকি'উরিয়স্, পূৰ্ব্ববৎ ।

যদিপি পূৰ্ব্বোক্ত ঔষধে যা পুরিয়া আসিবার লক্ষণ না দেখা যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ--সল্ফুৰ্ বা সাইলিশিয়া, পূৰ্ণ প্রকারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অথবা উপৰ্য্যাপরি প্রকারে দিবেক ।

বাহ্যিক চিকিৎসা ।

ঘায়ের উপরে কেবল শীতল জল অথবা যখন যে ঔষধ ব্যবহার করা হয় সেই ঔষধের পূর্ণমাত্রা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া, বস্ত্র খণ্ড দিয়া ক্ষত আবৃত করিয়া উক্ত জলের দ্বারা ভিজাইবেক ।

লক্ষণ বিশেষে চিকিৎসা ।

- যদিপি ক্ষত মধ্যে কামুড়ানি থাকে..গ্র্যাকাইটিস্, সাইলিশিয়া
 আসে'নিকম্, ইপিক্যাকুয়ানা,
 „ „ কাল হইয়া যায়.. { ল্যাক্সিসিস্, সাইলিশিয়া ।
 „ „ হইতে রক্ত পাত হয়.. { আসে'নিকম্, কোনিয়ম্,
 হেপার, সাইলিশিয়া ।
 „ „ গর্ভের ন্যায় হয়..সাইলিশিয়া সল্ফুৰ্

- „ „ ঈষৎ নীলবর্ণ হয়.. { অরম্, কোনিয়ম্, হেপার,
 ল্যাকিসিস্ ।
- „ „ অভাস্ত জ্বালা করে.. { আসে'নিকম্, মর্কি'উরিয়স্,
 পতেসটিলা, সাইলিশিয়া ।
- „ „ প্রাচীন এবং অপকারী হয়... { ক্যামোমিলা, হেপার্,
 ল্যাকিসিস্, সল্ফব্ ।
- „ „ গভীর হয়... { ল্যাকিসিস্, মর্কি'উরিয়স্,
 এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।
- „ „ মলিন এবং বিবর্ণ হয়... { ল্যাকিসিস্, মর্কি'উরিয়স্,
 এসিডম্-নাইট্রিকম্
- „ „ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়... { আসে'নিকম্, লাইকোপোডিয়ম্,
 সাইলিশিয়া, ফ্যাফিসেগ্রিয়া
- „ „ নালী হয় (ভিতরে } কষ্টিকম্, ক্যাল্ কেরিয়া,
 শুরী থাকে)..... { কোনিয়ম্, সাইলিশিয়া,
- „ „ চওড়া ও বিস্তৃত হয়.. { আসে'নিকম্, ল্যাকিসিস্,
 মর্কি'উরিয়স্, সিপিয়া ।
- „ „ কঠিন হয়.. { আসে'নিকম্, ল্যাকিসিস্, মর্কি'উরিয়স্,
 সিপিয়া ।
- „ „ প্রদাহ ও ফুলা থাকে { একোনাইট্, আসে'নিকম্,
 ক্যামোমিলা, হেপার্ ।
- „ „ চুল্কায.. { কষ্টিকম্, চায়'নারস্-টক্সিকোডেণ্ড্রন্,
 সাইলিশিয়া, হেপার্ ।
- „ „ যাতনা বিশিষ্ট হয়.. { কার্বো-বেজিটেবিলিস্,
 গ্র্যাফাইটিস্, সাইলিশিয়া ।

- ” ” হইতে মাংস উচ্চ } আসেনিকম্, ক্যামোমিলা,
হইয়া উঠে..... } পিট্রোলিয়ম্, সলফর ।
- ” ” হইতে পুঞ্জ নির্গত হয়.. { আসেনিকম্, কোনিয়ম্,
মর্কিউরিয়স্, সাইলিশিয়া ।

স্থান বিশেষে হইলে তাহার চিকিৎসা ।

যদ্যপি ক্ষত মস্তকে হয়... আসেনিকম্ ।

- ” ” চক্ষুতে হয়... { আসেনিকম্, ক্যাল্কেরিয়া,
ইউফ্রেশিয়া, হেপার ।
- ” ” বদনে হয়... আসেনিকম্, ব্রায়োনিয়া, কোনিয়ম্ ।
- ” ” মুখের ভিতর হয়.. { ক্যাল্কেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম্,
নক্স-বমিকা, ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্
- ” ” তালুতে... অরম্, ল্যাকিসিস্, ।
- ” ” জিহ্বার নীচের গুঠলিতে,... লাইকোপোডিয়ম্ ।
- ” ” মাটিতে... ক্যাল্কেরিয়া, মর্কিউরিয়স্ ।
- ” ” জিহ্বাতে.. ডিজিটেলিস্ ।
- ” ” গলার ভিতর.. ল্যাকিসিস্, এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।
- ” ” তলপেটে... আসেনিকম্ ।
- ” ” বক্ষঃস্থলে এবং স্তনে.. হেপার, ফস্ ফরস্, সাইলিশিয়া ।
- ” ” পৃষ্ঠদেশে এবং ঘাড়ে.. ল্যাকিসিস্ ।
- ” ” বাহুতে... ল্যাকিসিস্ ।
- ” ” হস্তে... সাইলিশিয়া ।
- ” ” পায়ের পাতায়.. ইপিক্যাকুয়ানা, সলফর ।
- ” ” গুলফে.. আসেনিকম্, সিপিয়া, সাইলিশিয়া ।
- ” ” পায়ের তলায়.. আসেনিকম্, সিপিয়া ।
- ” ” পায়ের অঙ্গুলিতে... { আসেনিকম্, গ্রাফাইটিস্,
পিট্রোলিয়ম্ ।

„ : গুঠালি মাত্রে... { বেলাডোনা, ল্যাংকিসিস্,
মর্কিউরিয়স্, সাইলিশিয়া ।

স্থান বিশেষে নালী ঘা হইলে তাহার চিকিৎসা ।

সামান্যতঃ নালী মাত্রে.. ক্যালেকেরিয়া, কষ্টিকম্, পলসেটিলা ।

যদ্যপি মাটিতে হয়.. কষ্টিকম্, ন্যাট্রুম্-মিউরিএটিকম্ ।

মলদ্বারের উপর.. কষ্টিকম্, থুজা, কোনিয়ম্ ।

বক্ষঃস্থলে এবং স্তনের বোঁটে.. ফস্ফরস্, সাইলিশিয়া ।

উক্ত সমস্ত ঔষধ প্রাতঃকালে দ্বিগুণ মাত্রায় অথবা পূর্ণ
মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে সেবন করিবেক ।

অঙ্গুল হারা, বা ক্ষরা ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে অত্যন্ত যাতনার সহিত ফুলিয়া উত্তাপ
বিশিষ্ট কোড়া হয়, দুই এক দিবসের মধ্যে পাকিয়া পরেতে
কাটিলে যাতনা দূর হয়, এই রোগ কোন কোন ব্যক্তির তাদৃশ
ধাতু জন্য পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

এই রোগ প্রথমতঃ উপস্থিত হইলে বৃদ্ধি হইতে না দেও-
য়ার জন্য ।

ঔষধ—সলফর, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত প্রকারে আরোগ্য না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইতে থাকে, এবং যদ্যপি অত্যন্ত যাতনা থাকিয়া দপ্ দপ্
করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর, চারি, পাঁচ মাত্রা
পর্যন্ত দিয়া পরেতে, হেপার্ উক্ত রূপে তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি জ্বর বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ নাড়ী বেগবতী, পিপাসা, এবং অসহ্য যাতনা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর (জ্বর লক্ষণ নিবারিত হওয়া পর্য্যন্ত) ।

যদ্যপি পাকিয়া পুঁজ হইয়া অঙ্গুলির অস্থি পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, এবং সলফর্, উপর্যুপরিরূপে পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি আক্রান্ত স্থান গাঢ় রক্তবর্ণ বা, ঈষৎ নীলবর্ণ হয় এবং অতিশয় যাতনা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি আক্রান্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অতিশয় জ্বালা করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

উক্ত ঔষধের চারি মাত্রার পর যদ্যপি কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পূর্ববৎ, আর্সেনিকমের সহিত উপর্যুপরিরূপে দিবেক ।

যদ্যপি জ্বর না থাকিয়া অত্যন্ত যাতনার সহিত কেবল প্রদাহ মাত্র প্রবল থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস্-টক্সিকোডেণ্ড্রন্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যাহার এই রোগ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিগুণ মাত্রায়, সলফর্, এবং সাইলিশিয়া সেবন করা কর্তব্য ।

বাহ্যিক চিকিৎসা।

উক্ত প্রকার রোগ উপস্থিত হইলে, আক্রান্ত স্থান বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা আবৃত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা ভিজাইবে।

পথ্য ব্যবস্থা।

জ্বর বিদ্যমান থাকার সময় জ্বর কালীন পথ্যের ব্যবস্থানুসারে চলিবেক, এবং পরেতে লঘু আহার করিবেক, শাক, অন্ন, দুগ্ধ, মৎস্য ইত্যাদি বর্জন করিবেক।

স্ত্রীলোকের চিকিৎসা।

পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক রোগ হইয়া থাকে অতএব তাহার চিকিৎসা প্রকরণ স্বতন্ত্র রূপে লেখা যাইতেছে।

স্ত্রীলোকের আর্তব সম্বন্ধীয় রোগ তিন প্রকার।

প্রথম আর্তব রোধ। দ্বিতীয় কষ্টার্তব। তৃতীয় আর্তবাতিশয্য।

প্রথম অর্থাৎ আর্তবরোধ দুই প্রকার। প্রথম, নিয়মিত সময়ে রজোযোগ না হওয়া। দ্বিতীয়তঃ স্ব্দ্ধাবস্থার পূর্বে (চল্লিশ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সক্রমের সময় মধ্যে) এককালীন রজঃবদ্ধ হওয়া। অথবা রজঃস্রাব কালীন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক বেদনা জন্য অথবা কোন ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হইলে আর্তব, বদ্ধ হইয়া থাকে।

আর্ন্তবরোধের চিকিৎসা ।

যদ্যপি শিরা মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রবলতা হয় এবং মস্তকে রক্তবদ্ধ হইয়া মাথাধরা, ও মাথাঘোরা, অলস, বদনের উজ্জ্বলতা, মাজায় ভার বোধ এবং কোষ্ঠাবরোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর উক্ত লক্ষণ সকলের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব বোধ হয় এবং বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে টানিয়া ধরিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ মাথাঘোরে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, ৩০ প্রথমতঃ এই ঔষধ উক্ত প্রকারে, পরেতে ত্রায়োনিয়া ৩০ ঐ রূপে দিবেক ।

উক্ত প্রকার আর্ন্তবরোধ রোগে, নক্স-রমিকা, ওপিয়ম্, প্ল্যাটিনা, ক্যামোমিলা, মিসিয়া, সল্ফর্ প্রভৃতি ঔষধ উক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

যদ্যপি শারীরিক যন্ত্রের দুর্বলতা জন্য এই রোগ উপস্থিত হয়, অথচ স্ত্রী-চিহ্ন সমুদয় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেসেটীলা, কফিকম্, গ্র্যাফাইটিস্, চায়না, নক্স-রমিকা, কুপ্রম্, নাট্রম্-মিউরিএটিকম্, ল্যাকিসিস্ অথবা সল্ফর্ পূর্বোক্ত প্রকারে সেবন করিলে আরোগ্য হইবেক ।

যদ্যপি কোন কারণ বশতঃ প্রথমতঃ রজোযোগ হইয়া পরেতে এক কালীন বদ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহার সহিত অম্প বা অধিক পরিমাণে জ্বর, মাথাধরা, পিপাসা, চর্ম্মের উত্তাপ, প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ অর্থাৎ বাক্রোধ প্রভৃতি ও হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ডল্ফেমেরা, পেসেটীলা, ইগ্লেশিয়া, ত্রায়োনিয়া, অথবা ওপিয়ম্ পূর্ণমাত্রা অবস্থা বিবেচনায়, তিন বা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি কোন প্রকারে শীতল লাগিয়া হয়।

ঔষধ—পতেসটিলা।

ইচ্ছাৎ ভয় বা মনোবেগ জন্ম হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্, বা লাইকোপোডিয়ম্।

রিপুর প্রবলতা জন্ম হইলে।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, ক্যামোমিলা, অথবা কলোসিস্।

অতিরিক্ত আনন্দ জন্ম হইলে।

ঔষধ—কফি, বা ওপিয়ম্।

এই সকল ঔষধ লক্ষণানুযায়ী অবস্থা বিবেচনায় পূর্ণ, বা অর্দ্ধমাত্রায় তিন বা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

প্রদর।

এই রোগ প্রায় বালিকাবস্থায়, বিশেষতঃ রজোদর্শনের উপযুক্ত কালে রজোঃযোগ না হইলে ঘটিয়া থাকে, এবং তৎকালে, চিকিৎসিত না হইলে, অথবা গর্ভের পূর্বেও উপস্থিত হইয়া থাকে।

নিদান—হৃৎলাবস্থায় পুনঃ পুনঃ উৎসাহ, অতিরিক্ত তেজস্কর দ্রব্যাদি ভোজন, পুনঃ পুনঃ গর্ভ ধারণ, গর্ভপাত, অতিরিক্ত শোণিত স্রাব, অথবা অর্শঃ জন্ম পীড়া ইত্যাদি হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

সামান্য অবস্থায়, ক্যালেকেরিয়া, পতেসটিলা, সিপিয়া, সফর।

হৃৎরি অবস্থায় এবং এই রোগ) এলম্, ন্যাট্রুম্-মিউরিএটিকম্,

প্রাচীন হইলে.....) কস্ফরস্, সফর, জিঙ্কম্।

- যদ্যপি হরিদ্রা বর্ণ জব } একোনাইট্, এলমিনা, নক্স-বমিকা,
 আব হয়..... } সিপিয়া, সলফর্ ।
- ” কটা বর্ণ হয়.. এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।
- ” শবুজ বর্ণ হয়.. কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পলেসটিলা, সিপিয়া ।
- ” অঁস্টিয়া গন্ধ বিশিষ্ট হয়.. চায়্‌না, নক্স-বমিকা, সিপিয়া ।
- ” জলবৎ হয়.. { এন্টিমোনিয়ম্-জুডম্, ক্যামোমিলা,
 সিপিয়া, সাইলিশিয়া ।
- ” গাঢ় হয়.. { অ্যাসেনিকম্, কার্বো-বেজিটেবিলিস্,
 পলেসটিলা, সিপিয়া ।
- ” দুধের ন্যায় হয়.. { কার্বো-বেজিটেবিলিস্, পলেসটিলা,
 সিপিয়া ।
- ” পুঁজময় হয়.. চায়্‌না, মর্কিউরিয়স্, স্যাবায়্‌না, সিপিয়া ।
- ” শোণার ন্যায় হয়.. { ব্রায়োনিয়া, এসিডম্-নাইট্রিকম্,
 পলেসটিলা, জিঙ্কম্, নক্স-বমিকা ।
- ” রক্ত মিশ্রিত হয়.. { অ্যাসেনিকম্, চায়্‌না, লাইকোপো-
 ডিয়ম্, এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।
- ” আবার সহিত জ্বালা থাকে.. { ক্যাস্চারিস্, অ্যাসেনিকম্,
 এবং পলেসটিলা
- ” ” ” চুল্কানি থাকে.. { ক্যালেকরিয়া, চায়্‌না,
 স্যাবায়্‌না, সিপিয়া ।
- ” ক্ষয়কারী হয়.. { অ্যাসেনিকম্, ক্যামোমিলা, চায়্‌না,
 ইগ্নেশিয়া ।

এই সকল ঔষধ লক্ষণানুযায়ী পূর্ণ মাত্রায় তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর অবস্থা বিবেচনায় দিবেক ।

কষ্টার্ভব ।

এই রোগে রোগিণীর রজস্বলা কালীন বস্তুতে অর্থাৎ তলপেটে বা পশ্চাত্তাগে যাতনা বোধ হয়, রোগিণী শয্যার উপর গড়াইতে থাকে, এবং বমনেচ্ছা, ক্ষুধার অস্পৃশ্যতা, অতিসার, ও শীতবোধ প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি মাথাধরা, নাভিস্থলে, চিম্টি দেওয়ার ন্যায় যাতনা, বস্তুতে খেঁচনি, প্রসব বেদনার ন্যায় যাতনা, আহারে অনিচ্ছা, মুত্রস্থলীতে টানিয়া ধরা, এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগের সহিত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠে, প্রসব বেদনার ন্যায় অসহ্য যাতনা বোধ হয়, ও উপাস্থির উভয় পার্শ্বে রক্তস্রাবের সময় ছেদনের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, অতিরিক্ত বা দলা দলা রক্ত নির্গত হয়, এবং উদর ভঙ্গ উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা পূর্ববৎ ।

অত্যস্পন্ন পরিমাণে পাতলা রক্ত স্রাব হয়, পশ্চাত্তাগে অতিশয় যাতনা থাকে, শীত বোধ, শূলবৎ বেদনা, রজস্বলা হইবার পূর্বে কোষ্ঠাবরোধ, এবং পরেতে অতিসার, অন্ত্র মধ্যে মোচ্ড়ানি, ও জ্বালার ন্যায় যাতনা বোধ, আহারের পর পেট কষিয়া ধরে, বমনেচ্ছা, মুখদিয়া জল উঠে, এবং মাথাধরা থাকিলে ।

ঔষধ—গ্রাফাইটিস্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি নিয়মিত কালের পূর্বে অত্যম্প অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃ স্রাব হইয়া অধিক কাল থাকে, বস্তিতে এবং পৃষ্ঠদেশে যাতনা বোধ হয়, শীত বোধ, হস্ত পদাদি শীতল বক্ষঃস্থল টানিয়া এবং চাপিয়া ধরা, কোষ্ঠাবরোধ মাথাধরা, ও পশ্চাত্তাগে এবং হস্ত পদাদিতে, মুচ্ড়িয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ, অল্প উদ্যার উঠে এবং বমন হয়, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ব, নীলবর্ণ দেখা যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কস্ফরস্ পূর্ববৎ ।

যদ্যপি নিয়মিত কাল অতীত হইয়া গ্লত্ব হয়, ও কৃষ্ণবর্ণ থানা থানা রক্ত নির্গত হয়, অথবা পাণ্ডুবর্ণ রজঃস্রাব হয়, বস্তি মধ্যে মোচ্ড়ানি, মূত্রস্থলীতে এবং মলদ্বারে বেগ বোধ, মাথাঘোরা বমনেচ্ছা, কম্প, অশ্রুপাত এবং রোগিণী অত্যন্ত স্নান ও চিন্তান্বিতা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল্‌সেটিলা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি নিয়মিত কালের পূর্বে অত্যম্প পরিমাণে রজঃ নির্গত হয়, জরায়ু মধ্যে শূলবৎ বেদনার সহিত নিম্নে ভার বোধ, রজোনিঃসরণের পূর্বে অতিশয় প্রবল যাতনা বা তজ্জন্য মুচ্ছা, সমস্ত শরীরে কম্প, যোনি মধ্যে জ্বালা বোধ হয়; এবং পুনঃ পুনঃ টানিয়া ধরে, মাজায় ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কখন কখন উত্তাপ বোধ, পিপাসা, মাথাধরা, দন্তশূল, প্রদর, ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়, এবং যোনি হইতে নাভিস্থল পর্যন্ত টানিয়া ধরে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিপিয়া পূর্ববৎ ।

যদ্যপি নিয়মিত সময়ের পূর্বে অধিক পরিমাণে গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ রজঃ নির্গত হয়, এবং তৎকালে যোনি মধ্যে জ্বালা

এবং মাজার অত্যন্ত শূলবৎ যাতনা বোধ, কখন কখন অম্প পরিমাণে-রজঃ নির্গত ও কোষ্ঠাবরোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সচক্ষর পূর্ববৎ।

যদ্যপি জরায়ু বৃদ্ধি, বা নির্গত হয়, আর্ন্তব নির্গমের পূর্বে পশ্চাত্তাগে, উরুদেশে, পায়ের ডিমে, গর্ভ যন্ত্রণার ন্যায় যাতনা, উদরের নিম্নে ভার বোধ, হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল এবং, বদন কাঁপা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা পূর্ববৎ।

যদ্যপি রজস্বলা কালীন, মস্তকে রক্তবদ্ধ, কাশী, নাসিকা দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয় এবং প্রদর থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া পূর্ববৎ।

যদ্যপি রোগিণী অতি কোমলা অথবা কর্কশা হয়, এবং রজস্বলা কালীন পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃ নির্গত হয়, মাথা নোয়াইবার সময় মাথাঘোরে, মস্তকে উত্তাপ বোধ, এবং দন্তশূল হয়, যন্ত্র মধ্যে জ্বালা এবং কামড়ানির ন্যায় যাতনা বোধ, বিশেষতঃ যদ্যপি রোগিণী বিলক্ষণ স্ত্রীলাঙ্গী হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া পূর্ববৎ।

যদ্যপি আর্ন্তব অত্যম্প পরিমাণে নির্গত হয় ও তাহা ঘোরাল বর্ণ, অথচ জরায়ু মধ্যে ছেদনবৎ বা শূলবৎ যাতনা বোধ থাকে, হৃৎপিণ্ড ধস্ ধস্ করে, দুর্বলতা জন্য মূর্ছা পর্য্যন্তও হয়, অথবা জরায়ুর মোচ্ড়ানি, পেট চাপিলে বা হেঁট হইয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ যাতনার অম্পতা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ইগ্নেশিয়া পূর্ববৎ।

যদ্যপি রোগিণী কোপনস্বভাবা হয় এবং জরায়ু মধ্যে মোড়া দিয়া, উপযুক্ত সময়ের অধিক পূর্বে অত্যুষ্ণ পরিমাণে থানা থানা রক্ত নির্গত হয়, যোনি মধ্যে অগ্নির জ্বালার ন্যায় উত্তাপ থাকে, প্রাতঃকালে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে মুর্ছিতা হয় এবং রজোনির্গমের পূর্বে তলপেটে মোড়া দিয়া চালিত হইতে থাকে, হস্তদ্বয় শীতল, ও কোষ্ঠাবরোধ থাকে, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয়, এবং রজস্বলা কালীন ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ প্রদর সম্ভূত দেব শ্রাব হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি আর্তব অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, এবং তৎকালে তলপেটে, পশ্চাত্তাগে এবং উরুদেশে, গর্ভ যাতনার ন্যায় যাতনা হয়, আর্তব ঘোরাল বর্ণ হইয়া তাহার সহিত ঋণ্ড ঋণ্ড জমা রক্ত থাকে, ও যদ্যপি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, হয়, অস্থিরতা ও ক্ষুধা থাকে এবং অশ্রুপাত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্ল্যাটিনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি আর্তব পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া অধিক কাল স্থায়ী হয়, ছিন্ন করার ন্যায় শূলবৎ যাতনা থাকে, হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল এবং শীতল ঘর্ষ নির্গত হয়, অত্যন্ত দৌর্বল্য ও নাড়ী সূক্ষ্মা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিকেল্, পূর্ববৎ ।

আর্তবাতিশযা ।

নিয়মিত মাসিক সময়ের মধ্যে, বা প্রসব হওয়ার পর, যদ্যপি পুনঃ পুনঃ অথবা অতিশয় রজঃ শ্রাব হয়, তাহাকে আর্তবাতিশযা বলা যায়, এই প্রকার রোগের সহিত প্রায় প্রদর, আন্স-সঙ্গী থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি আর্ন্তব, উজ্জ্বল রক্তবর্ণের সহিত ঈষৎ ঘোরাল বর্ণ মিশ্রিত হয়, পুনঃ পুনঃ জরায়ু নির্গত হওয়ার ন্যায় যোনি মধ্যে চাপন বোধ, পশ্চাত্তাগে, ভগ্ন হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি আর্ন্তব ঘোরাল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, এবং জমা দেখায়, ও হুড়ু হুড়ু করিয়া নির্গত হয়, জরায়ু মধ্যে প্রসব বেদনার ন্যায় যাতনা বোধ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, উরু দেশে এবং চরণে, টানিয়া ধরা, বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা বোধ, মধ্যে মধ্যে মুচ্ছা হয়, বদন পাণ্ডুবর্ণ, হস্তপদাদির অগ্রভাগ শীতল, ও পিপাসা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি আর্ন্তব কৃষ্ণবর্ণ এবং থানা থানা হইয়া, নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত হয়, তলপেটে টানিয়া ধরা ও জরায়ু মধ্যে, চাপনের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, অথবা অতিরিক্ত শোণিত নির্গত জন্য মস্তকে ভার বোধ থাকে, মাথা ঘোরা, ও আবল্য, সর্বাঙ্গ শীতল এবং নীলবর্ণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, পূর্ববৎ কিন্তু এই ঔষধ আক্রমণকাল অতীত হইলে দিবেক ।

যদ্যপি রক্তঃ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়, ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, রোগিণী প্রলাপ বাক্য কহিতে থাকে, কখন কখন হস্ত, বা পদ চমকিয়া উঠে, কখন কখন হাস্ত করে, প্রস্রাব করিতে অতিশয় কষ্ট বোধ, কখন কখন মুচ্ছা হয়, অস্থিরতা থাকে, শরীর অত্যন্ত উত্তাপ-বিশিষ্ট হইয়া শিরাসকল ফুলিয়া উঠে,

নাড়ী স্থূল। ও বেগবতী, চক্ষুতে অপরিষ্কৃত দৃষ্টি, ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বোধের অস্পষ্টতা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েমস্, পূর্ববৎ ।

এই ঔষধ প্রস্রাবের দ্বার দিয়া রক্তস্রাবের পক্ষে বিশেষ উপকারক ।

যদ্যপি আর্ন্তব কখন জলবৎ ও কখন কৃষ্ণবর্ণ, এবং থানা থানা হয়, তলপেটে এবং কুঁচকিতে প্রসব-বেদনার ন্যায় যাতনা বোধ, বদন রক্তবর্ণও উত্তপ্ত, নাড়ী স্থূল, এবং কঠিনা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফেরম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি রক্তঃ থানা থানা হইয়া (রক্ত দলার ন্যায়), নির্গত হয়, ও জরায়ু মধ্যে প্রসব-বেদনার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেসিয়া, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি রোগিণী অহঙ্কার বিশিষ্টা এবং কোপন-স্বভাবা হয়, ঘোরাল, ঘন, রক্তঃ নির্গত হয়, পশ্চাত্তাগ হইতে কুঁচকি পর্য্যন্ত অত্যন্ত যাতনা বোধ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্ল্যাটিনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি রোগিণী দুর্বল হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণা হইতে থাকে, ও নিয়মিত সময়ে অতিরিক্ত আর্ন্তব নির্গত হয়, হস্ত-পদাদির অগ্রভাগ শীতল, বদন পাণ্ডুবর্ণ, নাড়ী ক্ষীণ, ও যদ্যপি রোগিণী সংশয়ান্বিতা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নিকেল্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পশ্চাত্তাগে, জরায়ুতে, প্রসব বেদনার ন্যায় যাতনা বোধ হইয়া, থানা থানা ঘোরাল কৃষ্ণবর্ণ রক্তঃ, অথবা বিরেচন

বা প্রস্রাবের সময়ে উজ্জ্বল বর্ণ রক্ত নির্গত হয়, অথবা যদ্যপি রোগিণীর পুনঃ পুনঃ গৰ্ভপাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—স্যাবাইনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি নিয়মিত সময়ের অধিক পূর্বে অধিক পরিমাণে রক্তঃ নির্গত হয় ও অতিসার থাকে, কিম্বা বিশেষতঃ যদ্যপি কাণ্‌ ভোঁ ভোঁ করে, নাসিকার দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়, সমুদয় হস্ত পদাদিতে বেদনা এবং পিপাসা, অত্যন্ত প্রবল থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, পূর্ববৎ । *

পথ্য ব্যবস্থা ।

উক্ত কোন প্রকার সময় জন্য উপসর্গ উপস্থিত হইলে, বলকারক অথচ সামান্য রূপে প্রস্তুত লঘু আহার দিবেক, ভর্জিত এবং ভ্রষ্ট দ্রব্যাদি, অর্থাৎ মিঠাই, পক্কান্ন, মুড়ী, প্রভৃতি এক কালীন বর্জন করিবেক, অধিক কাল দণ্ডায়মানা থাকিবে না, কোন ভার বিশিষ্ট বস্তু ক্রোড়ে ধারণ করিবে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিয়া যাহাতে কোনমতে শরীরে কষ্ট বোধ না হয়, এমত অত্যুপমাত্র পরিশ্রম করিবেক ।

পেচুয়ায় পাওয়া (এক প্রকার বায়ু রোগ) ।

লক্ষণ—এই রোগের আক্রমণ কালের পূর্বে দুশ্চিন্তা, অতিশয় অশ্রুপাত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, বমনেচ্ছা,

এই অধ্যায়ে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইল, তাহার মধ্যে সিকেল্‌ ভিন্ন সমুদয় ৩০ গুণ মিশ্র ব্যবহার করিবেক ।

প্রভৃতি হইয়া থাকে, বামপার্শ্বে বেদনা বোধ হইয়া ক্রমশঃ তাহা গলদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, এবং গলার মধ্যে কোন গোলাকৃতি পদার্থ থাকা বোধ হয়, তদনন্তর, বোধ শূন্যতা, দস্ত কড়মড়ি উপস্থিত হয়, শরীরের মধ্যস্থান চালিত হয়, কখন হাঁস্য়, কখন রোদন, এবং উচ্চ ধ্বনি করিতে, অস্পষ্ট বাক্য কহিতে থাকে, মুখ দিয়া ফেণা নির্গত হইতে থাকে, উদ্বার উঠিলে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, এবং ফোঁপায়, সর্ব শরীরে বেদনা বোধ এবং হিক্কা হয়।

আক্রমণ কালের চিকিৎসা ।

যদ্যপি আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে নিঃশ্বাস রোধের ন্যায় হয়, বদন উত্তপ্ত ও ফুলা, এবং গাঢ় রক্তবর্ণ দেখা যায়, কিম্বা আক্রমণ কাল উপস্থিত হইলে রোগিণী চক্ষুঃ বিক্ষারিত করিয়া ইতস্ততঃ বা এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, অথবা আক্রমণ নিরস্ত হইয়া দ্বিতীয় বার আক্রমণের কাল পর্য্যন্ত তন্দ্রা হয়, অথবা নিদ্রা কালীন চমকিয়া উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, অর্দ্ধমাত্রা পোনের মিনিট অন্তর এবং আক্রমণ কাল উপস্থিত সময়ে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি রোগিণী কোমল-স্বভাবা হয়, এবং সামান্য কারণে প্রথমতঃ হাঁস্য় উপস্থিত হইয়া, আক্রমণ কাল উপস্থিত হয়, বদন, যাহা এতৎকালের পূর্বে পাণ্ডুবর্ণ ছিল, পরেতে গাঢ় রক্ত বা নীলবর্ণ দেখায়, এবং হাঁস্য় হইতে পরিশেষে টীৎকার হইতে আরম্ভ হয়, কিম্বা আক্রমণকাল উপস্থিত হইবার পূর্বে গলার মধ্যে গোলাকৃতি কোন পদার্থ থাকিয়া নিঃশ্বাস অবরোধ

করা বোধ হয়, অথবা পুনঃ পুনঃ হাঁই তোলে, কিম্বা আক্রমণ হইতে নিষ্ক্ৰান্ত, হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ইগ্লেশিয়া, পূর্ববৎ।

যদ্যপি রোগিনী নম্রস্বভাবা অথবা ভীৰু, বা স্ক্লাজী অথবা শ্লেয়্য-ধিক্য-ধাত্ত-বিশিষ্টা হয়, এবং যদ্যপি স্বভাবতঃ রজোদোষ থাকে অথবা রজস্বলা কালীন অজীর্ণাদি বিদ্যমান থাকে ও আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে বিনা কারণে রোদন করে, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেসেটীলা, অর্দ্ধমাত্রা আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে পোনের মিনিট্ অন্তর এবং পরেতে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

যদ্যপি আক্রমণ কালের পূর্বে চক্ষুে অত্যন্ত উত্তাপ হইয়া জ্বালা বোধ হয়, ঘনশ্বাস বহে এবং রোগিনী যদ্যপি প্রখরা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি রোগিনী বিষন্ন-স্বভাবাবিহিতা হয় এবং আক্রমণ কাল উপস্থিত হইলে অত্যন্ত উত্তেজিতা হইয়া আত্ম-হননে উদ্যতা হয়, এবং আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে বক্ষঃ-স্থলে অসহ্য যাতনা হয়, ও হুৎপিণ্ড থর্ থর্ করে, তাহা হইলে।

ঔষধ—অরম্-মেটালিকম্, অর্দ্ধমাত্রা আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি আক্রমণ সময়ে হিঙ্কা বা উকি এবং বমন হয়, আর যদ্যপি রোগিনী স্বভাবতঃ প্রখরা বা বলিষ্ঠা বা পিত্তাধিক্য-ধাত্ত-বিশিষ্টা হয়, এবং আক্রমণের পূর্বে হস্ত পদাদি কষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা পূর্ববৎ।

যদ্যপি আক্রমণ কালীন দাঁতি লাগে অথবা সমুদয় শরীর মোড়া দিতে থাকে, হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল, ললাটে এবং বদনে আঠাল ঘর্ম নির্গত হয় ও আক্রমণ কালের পূর্বে কিম্বা পরে, অধিক পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ মুত্র নির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেরাট্রিন, অর্দ্ধমাত্রা আক্রমণের পূর্বে পোনের মিনিট অন্তর এবং পরেতে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

উক্ত রোগের নিবারক এবং উন্নীলক চিকিৎসা।

শ্বেত প্রদর অথবা জরায়ু সম্বন্ধীয় অন্য কোন প্রকার প্রাচীন রোগ থাকিলে অথবা রোগিণী মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্বল হয় যে তজ্জন্য কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত চলৎ-শক্তিহীন হয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে আঠাল ঘর্ম নির্গত হইলে।

ঔষধ—সিপিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়নের সময় এক বার করিয়া দিবেক।

যদ্যপি রোগিণী পাণ্ডুবর্ণা এবং অতি ক্ষীণা হয়, এবং যাহার এই রোগ আক্রমণকালে মুচ্ছা হয় তৎপক্ষে, অথবা যদ্যপি অতিরিক্ত ক্ষুধা বিশিষ্টা অথবা ক্ষুধা বিহীনা হয়, আর পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে রজোনির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যারেকরিয়া, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া

যদ্যপি. রোগিণী একাকিনী থাকিতে সদত বাঞ্ছা করে, অত্যন্ত ক্ষীণা এবং দুর্বলা হয়, ও নিয়ত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা থাকে, পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, অতিশয় শীত বোধ, রক্ত-

বর্ণ বদন, এবং নিয়মিতকাল অতীত হইয়া রক্তস্ফা হইয়া, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ন্যাট্রম্-মিউরিএটিকম্, দ্বিগুণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ছয় দিবস পর্য্যন্ত দিয়া তাহার দশ দিবস পরে প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপে চালাইবে ।

যদ্যপি আক্রমণকালে দাঁতি লাগে অথবা সর্ব্ব শরীর চালিত হয়, হস্ত-পদাদির অগ্রভাগ শীতল এবং বদনে, বিশেষতঃ ললাটে আঠাল ঘর্ষ্য নির্গত হয়, তাহা হইলে এবং যে রোগিণী, পুনঃ পুনঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়, তৎপক্ষে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, পূর্ণমাত্রা পূর্ব্ববৎ ।

আক্রমণ কালীন কর্তব্য বিধি ।

যখন আক্রমণকাল উপস্থিত হয়, তৎকালে, বস্ত্র সমুদয় ঢিলা করিয়া দিবে, গৃহের মেঝায় শয্যা করিয়া হেলান দিয়া শয়ন করাইবে এবং হস্ত পদাদি চালিত করিলে আঘাত লাগে, এমনত কোন বস্ত্র নিকটে রাখিবে না, গৃহের দ্বার সমুদয় খুলিয়া দিবে এবং রোগিণীর বদনে শীতল জল দ্বারা প্রেক্ষণ (ছিটা) করিবেক, আক্রমণ কালে হস্ত পদাদি দলিলে, অনেক উপকার হয় ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

এই রোগে কোন প্রকার গুরুপাক-দ্রব্য ব্যবহার করিবেক না, কিঞ্চিৎ বলকারক অথচ সামান্য রূপে প্রস্তুত লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবে, এবং প্রত্যহ নিয়মিত এক সময়ে ভোজন, ও এক সময়ে শয়ন করিবেক ।

গর্ভ ।

স্ত্রীলোকের এই অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পৃথক্, কারণ তৎকালে তিনি কেবল স্ত্রীয় শরীরের জন্য কর্মে লিপ্ত না হইয়া ভাবী সন্তানের সুখ দুঃখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, অতএব যদ্যপি স্ত্রীলোক গর্ভ ধারণকালে সুনিয়মে না থাকেন, তাহা হইলে প্রসূত-সন্তানের শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ পীড়া জন্মায় ।

যদ্যপি পিতা মাতা উভয়ে ক্লীণ ও ক্লীণা হয় অথবা অত্যপ্প বয়ঃক্রমকালে বা বয়োাধিক হইয়া বিবাহ হয়, অথবা যদ্যপি পিতার এবং মাতার বয়ঃক্রমের অধিক অন্তর হয়, অথবা পিতা মাতার আহাৰ ব্যবহারাদিতে দোষ থাকে বিশেষতঃ যদ্যপি উভয়ের বা একের মনঃপীড়া থাকে তাহা হইলে সন্তান, দুর্বল ও সৰ্বদা পীড়িত হয়, অতএব যদ্যপি ভাবীকালে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুখের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পিতা মাতাকে সদত সাবধানে থাকা উচিত ।

অন্তরপত্যাবস্থায় কর্তব্য বিধি ।

এই সময়ে যাহাতে উদরের উপর কোন প্রকার চাপন না লাগে তাহা করিবে, কারণ তাহা হইলে, নিয়মিত কালের পূর্বেই প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া অতিশয় কষ্ট হয়, অপিচ পূর্ণগর্ভ সময়ে, নীচে হইতে উপরে উঠিতে বা উপর হইতে নীচে নামিতে কোন প্রকার ধাক্কা না লাগে, কারণ তাহাতে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইয়া গর্ভপাত হইবার সম্ভব, কোন প্রকার গুরুতর ভার বহন করা বিধেয় নহে, গর্ভবতী স্ত্রী, অতিরিক্ত বলকারক

দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, কারণ তাহাতে অজীর্ণ জন্য নানাবিধ অমুখ জন্মাইয়া ভাবী শিশুর শারীরিক প্রদাহ জন্মাইতে পারে । গর্ভকালীন অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইলে গর্ভস্থ সন্তানও তাহার ফলভাগী হয়, অর্থাৎ তাহাকেও অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতে হয়, অতএব গর্ভিণীকে শরীরপোষক অথচ সামান্য রূপে প্রস্তুত, (অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রকার মসলা বা ঘৃতাদি না দেওয়া হইয়া থাকে) দ্রব্য যাহা অল্পকাল মধ্যে পরিপাক হয়, তাহাই ভোজন করা কর্তব্য । স্ত্রীলোকের এই অবস্থায়, মনোর-
ভিকেও স্থির ভাবে রাখা কর্তব্য, কারণ প্রসূতী কষ্টান্বিত-
চিত্তে থাকিলে পরেতে জাতসন্তান ও তদ্রূপ হয়, অতএব গর্ভিণী কোন প্রকার দুশ্চিন্তা ইত্যাদি করিবেক না ।

গর্ভ কালীন চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ গর্ভ হইলে বমনেচ্ছা, বমন, মুখ দিয়া জল উঠা ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই সকল উপসর্গ হেলান দিয়া বসিয়া উঠিবার সময় প্রায় উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎকাল পরে, শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, অথবা গর্ভ ধারণের আদ্যোপান্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যদিপি এই সকল উপসর্গ সামান্যভাবে উপস্থিত হয় তাহা হইলে, সুপথ্যে থাকিলে নিরুত্তি হয়, কিন্তু যদিপি অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা চমিশ ঘণ্টা অন্তর ।

যদিপি উক্ত প্রকার উপসর্গ থাকিয়া তাহার সহিত উদর-
ভঙ্গ রোগ পাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে ।

যদ্যপি প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিবামাত্রতঃ বমনেচ্ছা অথবা বমন হয়, বুক জ্বালা করে, অগ্নি-মান্দ্য হয়, অথবা পোড়ামাটি বা ফুলখড়ি খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ নক্ল-বমিকা, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের সময় পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার পর কিঞ্চিৎ মাত্র উপ-শম বোধ হয় তাহা হইলে, তাহার চারি দিবস পরে ।

ঔষধ—ককিউলস্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি আহার বা পানের পর অতিশয় বমনেচ্ছা ও সময়ে সময়ে মূর্ছা হয়, গলাতে এবং পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ ও অত্যন্ত দুর্বলতা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, পূর্ণ৭৭ ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

গর্ভকালীন সাধারণ ব্যবস্থা অনুযায়ী পথ্য ব্যবস্থা করিবেক ।

গর্ভকালীন কোষ্ঠাবরোধের চিকিৎসা ।

যদ্যপি সামান্য কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা হইলে মধুরস্ন করিয়া বা মূলাদি সুসিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে আরোগ্য হইবে ।

যদ্যপি পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠের বেগ হয়, অথচ অত্যুষ্ণ পারিমাণে মল নিঃসৃত, বা রুখা বেগ হয়, উদর মধ্যে জ্বালা করে

নিয়ত মাথা ধরিয়া থাকে অথবা মস্তকে ভার ও বিকৃতি বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, পূর্ণমাত্রা প্রভাহ শয়ন কালীন সেবন করিয়া তাহার অন্ত প্রহর পরে প্রয়োজন হইলে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা উপশম বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইণ্ডেশিয়া, পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ । কিন্তু নক্ক-বমিকার শেষ মাত্রার দুই দিবস পরে আরম্ভ করিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ হয়, এবং যদ্যপি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোষ্ঠাবরোধ থাকে ও রোগিণী কোপন-স্বভাবা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক দিবস অন্তর ।

যদ্যপি পাকস্থলীতে ভার বোধ, মুখ শুষ্ক এবং বদন রক্ত-বর্ণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, পূর্ণমাত্রা পূর্ববৎ ।

যদ্যপি এই রোগ কখন থাকে, এবং কখন থাকে না-এমত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সরফর, পূর্ববৎ ।

পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল ভিন্ন যদ্যপি অন্য প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া গর্ভকালে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধ প্রকরণের চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিবেক ।

গর্ভকালীন মূর্ছা

এবং

পেচুয়ায় পাওয়া, (বায়ু রোগ) রোগদ্বারা সময়ে সময়ে,

আক্রান্ত হওয়ার চিকিৎসা ।

যদ্যপি রোগিণী স্ক্রলঙ্গী হয় এবং গর্ভকালীন মূর্ছা বা পেচুয়া রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা চক্ৰিশ ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি মস্তকে রক্তবদ্ধ, ও বদন রক্তবর্ণ হয়, এবং ধমনীর কার্য্য প্রবল বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ স্বতন্ত্র রূপে অথবা পূর্বোক্ত ঔষধের সহিত উপর্য্যুপরি প্রকারে দিবে ।

যদ্যপি হঠাৎ রাগ হইয়া মূর্ছা হয় তাহা হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি পাকস্থলীর বিকৃতি জন্য মূর্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি দুর্বলতা জন্য হয়, এবং বিশেষতঃ যদ্যপি সেই দুর্বলতা শোণিত ক্ষয় জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে ।

যদ্যপি উদরमध्ये মোড়া দেওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ-নিঃস্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, শিরা সকল টানিয়া ধরে, এবং অত্যন্ত অস্থির করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি যাতনা বোধ হইবার পূর্বে বামপার্শ্ব হইতে উদরের অধোভাগ দিয়া উপরের দিকে বেদনা উঠে এবং সেখান হইতে গলা পর্যন্ত উঠিয়া গলার ভিতর কোন গোলাকৃতি পদার্থ থাকা বোধ হইয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করার ন্যায় যাতনা উৎপন্ন করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাকসিস্, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি এরূপ মাথাধরা থাকে যে মস্তক মধ্যে শলাবিদ্ধ হওয়া বোধ হয়, ও রোগিণী গোপনীয় শোক বিশিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইগ্লেশিয়া, পূর্ববৎ ।

গর্ভকালীন দন্ত রোগ ।

এই সময়ে দন্ত রোগ উপস্থিত হইলে দন্ত উৎপাটন দ্বারা যাতনার শান্তি করা কোনমতে বিধেয় নহে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হইয়া সেই যাতনা কর্ণ পর্যন্ত অথবা হস্ত এবং অঙ্গুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, দন্ত চাপিলে বা শীতল বাতাস লাগিলে ঐ যাতনা উপস্থিত হয়, গণ্ডদেশ ফুলে, চোয়ালের নীচের গুঠলি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিপিয়া, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর, এবং কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি কোন প্রকার শীতল দ্রব্য বা শীতল বায়ু বা উষ্ণ দ্রব্য দস্তে লাগিলে বেদনা উঠে, বা রুদ্ধি হয়, এবং মাটিতে যাতনা বোধ, ও সেই যাতনা কোন প্রকার উচ্চ রব শ্রবণ করিলে রুদ্ধি হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাতেকরিয়া, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি চৰ্ৰ্ণ কালীন অথবা রাত্রিতে শয়ন কালীন যাতনা উপস্থিত হয় এবং সেই যাতনা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বোধ হইয়া গণ্ডের অস্থি, মস্তকের উভয় পার্শ্ব, এবং ললাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এলমিনা, পূর্ববৎ ।

পূর্বোক্ত লক্ষণ ভিন্ন অন্যান্য লক্ষণাক্রান্ত হইলে, দন্ত রোগের সাধারণ চিকিৎসানুযায়ী চিকিৎসা করিবেক কিন্তু ঔষধ পরিমাণে অর্দ্ধমাত্রা ব্যবস্থা করিবেক ।

গর্ভকালীন বদন ফুলিলে চিকিৎসা ।

এই রোগ যদ্যপি দন্ত-শূল জন্য হয়, তাহা হইলে তাৎ-কালিক দন্ত-শূলের চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইবে ।

যদ্যপি উক্ত প্রকারে দন্ত-শূলের চিকিৎসা করিয়া দন্ত-শূল নিবারিত হইলেও বদন বা গণ্ডদেশ ফুলিয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আর্ণিকা, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

উক্ত ঔষধের দ্বারা কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে, তাহার তৃতীয় মাত্রার বার ঘণ্টা পরে, বিশেষতঃ যদ্যপি গাল ফুলার সহিত ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা থাকে, অতিশয় লাল নিগত

হয় এবং গাণ্ডদেশ রক্তবর্ণ ও প্রদাহ বিশিষ্ট হয়, তাহা

ঔষধ—পলেসটিল, পূর্ণমাত্রা হয় ঘণ্টা অন্তর, চারি মাত্রা দিয়া পরেতে মর্কি উরিয়স্ ঐ রূপে দিবে ।

শেষোক্ত ঔষধের চতুর্থ বা পঞ্চম মাত্রার পর যদিও ফুলা রুদ্ধি হইবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ বেলাডোনা, অর্দ্ধমাত্রা, পরেতে, হেপার্ পূর্ববৎ দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

এই রোগাক্রান্তা রোগিণী, কোন প্রকার গুরুপাক দ্রব্য ব্যবহার করিবেক না, কেবল মাত্র সামান্য রূপে প্রস্তুত আহাৰ্য্য, দিবা বা রাত্রিতে নিয়মিত সময়ে আহাৰ করিবেক । রাত্রি জাগরণ এবং অতিরিক্ত শ্রম-জনক-কর্ম করিবেক না কিন্তু নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাও বিধেয় নহে ।

গর্ভ কালীন শিরা ফুলা ।

গর্ভকালীন উরু দেশের শিরা টানিয়া অত্যন্ত যাতনা ও অসুখ বোধ হয় । এই উপসর্গ দৌর্বল্য জন্য ঘটিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি শিরা রক্তবর্ণ অথবা প্রদাহের সহিত ফুলিয়া তজ্জন্য অতিশয় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পলেসটিল, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের তিন, চারি, মাত্রার পর কিছু বিশেষ বোধ না হয়, তাহা হইলে শেষ মাত্রার বার ঘণ্টা পরে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস্ অর্জমাত্রা পরিমাণে রাত্রি এবং প্রাতঃকালে ।

যদ্যপি উক্ত উপসর্গের সহিত কোষ্ঠাবরোধ বা অর্শঃ থাকে এবং রোগিণী কোপন-স্বভাবা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি ও প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবে ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধে কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ হয় তাহা হইলে, পূর্বোক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার দশ দিবস পরে ।

ঔষধ—সলফুর্, দিগুণমাত্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পূর্ববৎ এবং পরেতে আবশ্যক হইলে পুনর্বার উক্ত রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি শিরা সকল নীলবর্ণ হয়, জ্বালাবৎ যাতনা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ আর্সেনিকম্, অর্জমাত্রায় প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে দুই দিবস পর্য্যন্ত দিয়া পরেতে আবশ্যক হইলে শেষ মাত্রার এক দিবস পরে কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্, ঐ রূপে দিবেক ।

সহকারী কর্তব্য বিধি ।

যদ্যপি এই উপসর্গ জন্য চরণ এবং তাহার উপরিভাগ অতিরিক্ত কোলে, তাহা হইলে চরণ হইতে উপরের দিগে অম্পা চাপিয়া, বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়াইয়া বান্ধিয়া দিবেক, এবং গর্ভিণীকে হেলান দিয়া রাখিবেক, অথবা সেই স্থান পুনঃ পুনঃ জলের দ্বারা ধোত করাইবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—সর্ব বিধায় পূর্ববৎ ।

গর্ভকালীন পশ্চাত্তানে এবং মাজার বেদনা।

কোন কোন স্ত্রীলোক গর্ভ কালীন, পৃষ্ঠদেশে বা মাজায় কোন বোঝা চাপানের ন্যায় ভার বোধ করিয়া অত্যন্ত যাতনা পায়, এবং সেই যাতনা রাত্রিকালে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত করে।

চিকিৎসা।

উক্ত প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইলে যদিও অর্শঃ রোগ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, অর্জমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে তিন দিবস পর্য্যন্ত দিয়া যদি কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে পুনর্বার ঐ রূপে দিবেক।

বিশেষতঃ এই রোগে ক্যালি-কার্বোনিকম্, সিপিয়া, এবং সিকেল্ উক্ত প্রকারে অথবা পূর্ণমাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে দিলে বিশেষ উপকার করে।

গর্ভপাত বা গর্ভাশ্রাব।

যে সকল স্ত্রীলোকের দুই তিন বার গর্ভপাত হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষে ইহা একটা অত্যন্ত হানি জনক রোগ বলা যায়। গর্ভ ধারণের প্রথম মাস হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত গর্ভপাতের সময়, কিন্তু সাধারণতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে হইয়া থাকে, যখন প্রথমে আরম্ভ হয়, তৎকালে যাতনা বা আপদের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ হইতে হইলে অত্যন্ত শোণিতাশ্রাব জন্য শরীর ভগ্ন হইয়া প্রায় ভয়ানক রোগ উপস্থিত হয়।

নিদান—হঠাৎ কোন প্রকার মনস্তাপ অথবা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, দৈবাৎ আঘাত প্রাপ্তি, গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকা, সর্বদা তেজস্কর দ্রব্য আহার করা, এবং শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি কারণে গর্ভপাত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ।

প্রথমে গর্ভ হইলে যদিপি পতনের উপক্রম থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—স্যাবায় না, পূর্ণমাত্রা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর চারি দিবস পর্য্যন্ত দিয়া ক্রমশঃ ঔষধ সেবনের নিয়ম কালের বৃদ্ধি করিয়া দিবেক ।

যদিপি এই উপসর্গ এক বারের অধিক হইয়া থাকে ও গর্ভিণী দুর্ব্বলা ও ক্ষীণা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বার মাসিক ঋতুকালের পর আরম্ভ করিয়া যে সময়ে পূর্বে গর্ভপাত হইয়া থাকে সেই সময় পর্য্যন্ত ।

ঔষধ—সিকেল পূর্ব্ববৎ ।

যদিপি ক্ষুধা বোধ না থাকে, অজীর্ণ হয়, এবং অল্পে অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পল সেটিলা, পূর্ব্ববৎ ।

যদিপি গর্ভিণী অতি কোমলা প্রযুক্ত গর্ভপাত হয়, তলপেটে ভার বোধের ন্যায় যাতনা বোধ হয়, স্বাভাবিক প্রদর ও কষ্টদায়ক স্থানীয় চুল্কানি থাকে, বদনে, কটাবর্গ, ঈষৎ-হরিদ্রাবর্ণ দাগ উঠে, অথবা যাহাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিক বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, ও সহজ ঋতুকালীন অল্প আব হয়, মাথাধরা ও দন্ত শূল থাকে, তৎপক্ষে ।

ঔষধ—সিপিয়া, গর্ভ কালীন পূর্ববৎ, কিন্তু গর্ভ পতনের পর তাদৃশ ঘটনা নিবারণ জন্য প্রত্যহ পূর্ণমাত্রায় প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিয়া তাহার দশ দিবস পরে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক।

যদ্যপি অশঃ রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে ও শ্লেষ্মাধিক্য ধাতু হয়, শরীরের উপর চুল্কানি, ফুফুড়ি ইত্যাদি নানাবিধ চর্ম রোগ হইয়া থাকে, দুর্বলতা, উদরের নিম্নভাগে ভার বোধ, ও পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, এবং সহজ অবস্থায় অর্থাৎ গর্ভ ধারণের পূর্বে অতিরিক্ত বা অত্যাশ্রয় পরিমাণে আর্ন্তব নির্গত হয়, ও তাহার সহিত প্রদর থাকিয়া, স্থানীয় উত্তাপ, ও চুল্কানি থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফুর্, পূর্ববৎ কিন্তু মধ্যে মধ্যে নক্স-বমিকা, ও উক্ত রূপে দিবেক।

যদ্যপি শোণিত ভাগ পূর্ণ থাকে ও পুনঃ পুনঃ মাথাধরে পশ্চাত্তানে শূলের ন্যায় যাতনা বোধ হয় ও প্রদর, অতি প্রবল থাকে, বিশেষতঃ যদ্যপি সহজ সময়ে নিয়মিত কালের পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃ নির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ববৎ।

গর্ভপাত হওয়ার সময় ও তাহার পর সময়ের চিকিৎসা।

যদ্যপি দৈবাৎ ঘটনায় অর্থাৎ পতন বা ঘূঁসা বা অন্য প্রকার আঘাত জন্য গর্ভপাত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—আর্গিকা, অমিশ্র আরক, এক ফোটা অথবা আটটি ক্ষুদ্র বটিকা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া এক তোলা পরিমাণে, দশ বা পোনের মিনিট অন্তর প্রথমে দিয়া পরেতে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর, ও ক্রমশঃ সময় বৃদ্ধি করিয়া দিবেক।

যদ্যপি গুরুতর ভার দ্রব্য তুলিতে বা নীচে হইতে উপরে টানিতে বা মোচড় লাগিয়া হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—রস-টক্কিকোডেগুন, পূর্ববৎ।

যদ্যপি তলপেট এবং মাজায় প্রসব বেদনার ন্যায় যাতনা থাকিয়া গাঢ় লালবর্ণ থানা থানা রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—স্যাবায়না, পূর্ববৎ।

যদ্যপি ক্ষণকালের জন্য রক্তস্রাব বন্ধ থাকিয়া পরেতে অতিরিক্ত রূপে নির্গত হয় ও তাহার সহিত অত্যন্ত যাতনা থাকে এবং থানা থানা রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পল্ সেটিলা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি পেট চাপিয়া ধরা বা বদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি গর্ভপাতের পর, (অত্যন্ত উজ্জ্বল বা গাঢ় লালবর্ণ না হয়, এমন) রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি গর্ভপাতের পর প্রসব বেদনার ন্যায় যাতনা থাকিয়া রোগিণী হস্ত পদাদি ছুড়িতে থাকে মাংস-পেশী সকলের কাঠিন্য হয়, নানা বিধ ভয়ানক রূপ দর্শন করে, অজ্ঞান হইয়া প্রলাপ বাক্য বলিতে থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—হায়োসায়েমস্, পূর্ববৎ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত লক্ষণ থাকিয়া এককালীন জ্ঞানাভাব না হয় এবং নাভির চতুষ্পার্শ্বে যাতনা থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, অর্দ্ধমাত্রা ৫ ১ ১০। বা ১৫। মিনিট অন্তর পরেতে ক্রমশঃ সময় বৃদ্ধি করিয়া দিবেক।

উক্ত ঔষধ প্রয়োগের ছয় ঘণ্টা পরে যদ্যপি কিঞ্চিদ্ভ্র

উপসর্গ বোধ হয় এবং ঘন রক্ত নির্গত হয় ও তাহার সহিত অতিশয় যাতনা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্লাটিনা, অর্দ্ধমাত্রা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি গর্ভপতনের পর প্রসব বেদনার ন্যায় যাতনা থাকে, এবং অতিশয় শোণিত নির্গত হয়, ও তাহার সহিত জ্বর থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফের্ ম্‌মেটালিকম্, পূর্ববৎ ।

অতিশয় রক্তস্রাব জন্য দুর্বলতা হইলে ও সর্বতোভাবে তৎকালে শোণিত বন্ধ করিবার নিমিত্ত এবং যদ্যপি উদরের নিম্নে ভার বোধ হইয়া সময়ে সময়ে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চাস্টনা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা গর্ভপাতের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব কোনমতে বন্ধ না হয় তাহা হইলে, সর্বোৎকৃষ্ট ।

ঔষধ—এসডম্-নাইট্রিকম্, অর্দ্ধ মাত্রা প্রত্যেক ৫। ১০। ১২ মিনিট অন্তর এবং পরেতে ক্রমশঃ সময় বৃদ্ধি করিয়া দিবেক ।

সহকারী কর্তব্য বিধি ।

গর্ভপাতের উপক্রমকাল উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে হেলান দিয়া বসাইবেক, অথবা শয়ন্য নিদ্রিত করাইবেক এবং শয়নাগার শীতল রাখিবেক ও তাহার মনেতে তৎকালে কোন উদ্বেগ উপস্থিত না হয় এমত যত্ন করিবেক এবং যদ্যপি তাহাতে নিবারিত না হইয়া নিতান্তই গর্ভপাত হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে শোণিত নির্গত হওয়া নিবারণ জন্য কিছু দিন পর্যন্ত

তাহাকে শয্যাতে শয়ন করাইয়া রাখিবেক ।, যদিপি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে গর্ভের উপর শুষ্ক অথচ শীতল ঐষত কোন দ্রব্য রাখিলে ও শীতল জন, পান করাইলে অনেক উপকার হইবে ।

পথ্যব্যবস্থা ।

কোন প্রকার গুরুপাক দ্রব্য, অথবা উত্তম রূপ মসলা ইত্যাদি দিয়া পাক করা দ্রব্য, ব্যবহার না করিয়া কেবল মাত্র বলকারক এবং লঘুপাক দ্রব্য, পথ্য করিবেক ও সেই সকল দ্রব্য কোনমতে অতি শীতল বা অতি উষ্ণ না থাকে অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে ভোজন করিবেক ।

সন্তান প্রসবের পূর্বকালের চিকিৎসা ।

যদিপি প্রবল বেদনার পূর্বে শোণিতাধিক্য বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ একোনাইট, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

দুই বার দিয়া তাহার ছয় ঘণ্টা পরে যদিপি গর্ভিণীর মুখ রক্তবর্ণ হয় ও ঘাড়ের শিরা সকল ফুলিয়া উঠিয়া দপ্ দপ্ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ব৭৭ ।

মিথ্যা প্রসব বেদনার চিকিৎসা।

যখন সম্ভাবন প্রসবের পূর্বে মাজায় ভার বোধ হয় ও তাহার সহিত কোষ্ঠাবরোধ ও তলপেটে বেদনা থাকে, বিশেষতঃ যদ্যপি তাদৃশ বেদনা ক্রোধাদি জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, অর্জুন-মাত্রা দিয়া যদ্যপি তাহার ক্রিয়াকাল পরে দুই, তিন বার সেই প্রকার যাতনা উপস্থিত হয় অথবা বেদনা নিরুত্তি হইয়া যায় তাহা হইলে তৎকালে ঔষধ বন্ধ করিবেক, আর যদ্যপি ক্রমশঃ উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার মাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি তলপেটে এবং পশ্চাঙ্গাগে সমান যাতনা ও উদরের নিম্ন ভাগে মোচ্ড়ানির ন্যায় যাতনা বোধ হয়, বিশেষতঃ যদি তাদৃশ যাতনা রাত্রিতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ববৎ।

উক্ত প্রকার যাতনা থাকিয়া যদি মাজায়, (বলুকণ হেঁট হইয়া থাকার ন্যায় অথবা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা কোমর কষার ন্যায়) যাতনা বোধ হয়, উরুদেশ কামড়ায়, কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার থাকে, বিশেষতঃ যদ্যপি তাদৃশ বেদনা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেটসটল পূর্ববৎ।

যদ্যপি পৃষ্ঠের নিম্ন ভাগে বিদ্ধকরার ন্যায় অথবা টানিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বোধ হয় ও যদি তাদৃশ বেদনা ক্রোধাদি জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, অর্জুনমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি গর্ভিণী যুবতী, স্কলান্ধী, ও উজ্জ্বল বদনা হয় ও নাড়ী বেগবতী হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, অর্দ্ধমাত্রা প্রথমতঃ প্রয়োজন হইলে ছয় ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—পূর্ববৎ ।

প্রসব বেদনা অধিক কাল স্থায়ী হইলে তাহার চিকিৎসা ।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া যদ্যপি শীঘ্র সন্তান নির্গত না হয়, এবং অতিশয় প্রবল যাতনা বোধ ও পুনঃ পুনঃ বেদনা উপস্থিত হয়, অত্যন্ত অস্থির করে ও গর্ভিণী ছট্ কট্ করিতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, অর্দ্ধমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক, ইহার তিন চারি মাত্রার পর যদ্যপি সন্তান প্রসব না হয় তাহা হইলে, একোনাইট্, ঐ রূপে দিবে ।

যদ্যপি গর্ভিণী ভীৰু হয়, এবং যাতনাতে অত্যন্ত কাতরা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ

যদ্যপি গর্ভিণী প্রৌঢ়াবস্থা প্রযুক্ত শীঘ্র সন্তান প্রসব করিতে না পারে এবং জরায়ু মধ্যে সন্তান বদ্ধ থাকা বোধ হয়, অথবা প্রসব বেদনা, অত্যাশ্রিত হয়, প্রথমতঃ অতিপ্রবল বেদনা হইয়া পরেতে এককালীন বেদনা থাকে না, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি প্রসব বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় ও কখন অধিক

কখন অম্পা বেদনা বোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ মল, মূত্র ত্যাগের উপক্রম হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা পূর্ণমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি প্রসব বেদনা, এককালীন অন্তর্হিত হইয়া মস্তকে রক্তবদ্ধ জন্য মুখ রক্তবর্ণ হয় এবং মূর্ছিতা হইয়া সুশুপ্তিকালের ন্যায় নাসিকার শব্দ হইতে থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ওপিয়ম্ অর্দ্ধমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি অত্যম্পমাত্র বেদনা, সময়ে সময়ে উপস্থিত হয় এবং তাহা জরায়ুর শক্তিহীনতা জন্য হ্রাস হওয়া বিবেচনা হয়, বেদনার সহিত পেট কামড়ানি, বমন, অথবা পশ্চাত্ত্যাগে, মাজার অত্যন্ত যাতনা বোধ ও উরুদেশ টানিয়া ধরার ন্যায় জ্ঞান হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পলেসটিলা, পূর্ণমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধে জরায়ুর শক্তি বৃদ্ধি না করে তাহা হইলে এবং উপরোক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকিলে।

ঔষধ—সিকেল্ পূর্ববৎ।

পথ্য ব্যবস্থা।

এই সময়ে ময়দা বা সেইরূপ কোন পদার্থ জলে বা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া মিস্রি বা চিনি মিশ্রিত করিয়া অম্পা পরিমাণে দিবসে একবার মাত্র দিবেক এবং কোন প্রকারে মানসিক উদ্বেগ না জন্মায় এমনত অবস্থায় রাখিবেক।

সন্তান প্রসবের পর চিকিৎসা ।

সন্তান প্রসবের পর স্মৃতিকাগারে কোন প্রকারে তীব্র আলোক, বা গন্ধকের ধূম, বা উচ্চ ধ্বনি, যাহাতে প্রবেশ না করে এমত করিবে, এবং স্মৃতিকাগার নাতিশীতোষ্ণভাবে রাখিবেক, সন্তান প্রসবের পর যে নিদ্রা হয় তাহার ব্যাঘাত করিবে না ।

যদ্যপি তৎকালে অস্থিরতা জন্য নিদ্রাকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, পূর্ণমাত্রা প্রয়োজন হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

কিন্তু যদ্যপি তৎকালে জ্বর বোধ হয় এবং পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা অস্থিরতা নিবারিত না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, অর্দ্ধমাত্রা পূর্ববৎ ।

প্রসবের পর বেদনা ।

যদ্যপি সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত বেদনা থাকে তাহা হইলে, তাহা নিবারণ জন্য এবং পরেতে জ্বর বা কোন প্রকার প্রদাহ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য ।

ঔষধ—আর্গিকা, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেক এবং আর্গিকা (অমিশ্র আরক) পোনের ফোটা অর্দ্ধ পোওয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া বেদনা বিশিষ্ট স্থানের উপর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ দুই মাত্রা সেবনের পর বেদনার লাঘব না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, অর্দ্ধমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দুই মাত্রার পর কিছুমাত্র উপশম

বোধ না হয় এবং যাতনা অত্যন্ত প্রবল হয় ও হেলান দিয়া বসিয়া থাকা কালে উদরস্থ অন্ত্রাদি নির্গত হইবার উপক্রম বোধ হয়, কিন্তু দাঁড়াইলে বেদনা থাকে না ও তাহার পর তলপেটে মোচড়াণির ন্যায় যাতনা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, অর্দ্ধমাত্রা প্রথমতঃ দুই ঘণ্টা অন্তর এবং পরে আবশ্যক হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি যাতনা অসহ্য হয়, অথবা হস্ত পদাদি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করে বা ধমুফকারের ন্যায় হয়, শরীর শীতল বা আড়ষ্ট হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ককি, অর্দ্ধমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি প্রসূতী অত্যন্ত ভীতা হয় আর বেদনা অধিক কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেসেটিল, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর।

যদ্যপি প্রসূতী পূর্বে বহু সম্ভান প্রসব করিয়া থাকে ও স্কুলাঙ্গী হয়, এবং বেদনা অধিক কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সিকেল, অর্দ্ধমাত্রা প্রথমতঃ এক ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা দিয়া পরেতে চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

উক্ত প্রকার লক্ষণ সকল থাকিয়া যদ্যপি প্রসূতী দুর্বলা এবং মুর্ছা রোগাপন্ন হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—কুশ্ণম্, পূর্ববৎ।

যদ্যপি প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে গর্ভপাতের চিকিৎসায় উক্ত প্রকার উপসর্গ নিবারণের জন্য যে প্রকার চিকিৎসা প্রণালী লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইবেক।

মৃত্তাবিরোধ ।

যদ্যপি প্রসবের পূর্বে দীর্ঘকাল প্রসব বেদনা থাকিতে
প্রস্রাব বন্ধ হয়, তাহা হইলে।

তুষধ—বেলাডোনা, অর্কমাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের তৃতীয় মাত্রার পর প্রস্রাব না হয় এবং উদরের নিম্নভাগে জ্বালার ন্যায় উত্তাপ হইয়া জ্বর বোধ হয়, তাহা হইলে।

উষধ—একোনা ইট, পূর্ববৎ।

অধারণতা (অর্থাৎ প্রত্নাবের বেগ ধারণে শক্তি না থাকা)।

যদ্যপি প্রসবের পূর্বে অধিক কাল পর্য্যন্ত প্রসব বেদনা থাকিতে প্রসবের পর প্রস্রাবের বেগ ধারণে শক্তি না থাকে তাহা হইলে প্রথমতঃ।

ঔষধ—আর্গিকা, অর্দ্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবেক ও অমিশ্র আর্গিকার, আরক পোনের ফোটা অর্দ্ধ পোতয়া পরিমাণ ঈষদুষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা এক খানি বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তলপেটের উপর দিবেক।

যদ্যপি উক্ত প্রকারে আরোগ্য বোধ না হয়, তাহা হইলে।

উষধ—পলসেটিলা, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে দুই দিবস পর্য্যন্ত দিয়া কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে পরেতে বেলাডেনা, ঐ রূপে দিবেক।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা আরোগ্য না হইয়া এই রোগ প্রাচীন হইয়া উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইকিউটা, সিপিয়া, সলফর, বা ন্যাট্রম-মিউরিএটিকম
 ইহার অনাত্তর একটা ঔষধ অথবা ক্রমশঃ এক একটা কবিশ্বা ঔষধ পূর্ণ
 মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবেক ।

প্রসবের পর যে সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

স্তন্য বন্ধ হইলে তাহার চিকিৎসা ।

যদ্যপি প্রসবের পর কোন প্রকার মানসিক উদ্বেগ জন্য অথবা অন্য কোন কারণে স্তন্য দুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য ।

ঔষধ—পল-সটিল, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে অবস্থা বিবেচনায় বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দুই তিন মাত্রার পর উপশম বোধ না হয় অথবা কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইয়া মস্তকে রক্তবদ্ধ থাকা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাডবেরিয়া, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি মস্তকে রক্তবদ্ধ জন্য প্রসূতীর বদন রক্তবর্ণ দেখা যায় এবং সময়ে সময়ে কোন কোন মাংস-পেশীতে টঙ্কার বোধ হয় এবং রোগিনী প্রলাপ বাক্য কহিতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্লিক্সম, অর্ধমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত উপসর্গের সহিত জ্বর প্রকাশিত থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, পূর্ণমাত্রার চতুর্থাংশ প্রত্যেক বার দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ কালীন বক্ষঃস্থলে বা পার্শ্বে টানিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বোধ হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি কোন প্রকার মানসিক উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—প্রসবের পরকালীন ন্যায় ।

স্তন্যাতিশয়া

প্রসরের পর অনেকানেক প্রসূতীর অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ হয় ও তাহা আপনিই নিঃসৃত হইতে থাকে । এই উপসর্গ নিবারিত না হইলে ক্রমশঃ ক্ষয় রোগ উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি স্তনের আধিক্য হইয়া তাহার সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকে এবং তাদৃশ উপসর্গ উপস্থিত হইবার কারণ জানা না যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, পূর্ণমাত্রার চতুর্থ ভাগ হয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া জ্বর লক্ষণ প্রকাশিত হয় ও অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস্-টক্সিকোডেগুন, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃ-কালে এক এক বার করিয়া ।

যদ্যপি জ্বর লক্ষণ প্রকাশিত না থাকিয়া আপনিই অধিক পরিমাণে দুগ্ধ নির্গত হইয়া ক্রমশঃ প্রসূতীকে ক্ষীণ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাস্কেরিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে এক এক বার করিয়া ।

উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকিয়া যদ্যপি ক্ষয় রোগের লক্ষণ হইয়া ক্রমশঃ ক্লশা করিতে থাকে ও উৎকর্ষী থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ফস্ফরস্, পূর্ববৎ ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

যে পর্য্যন্ত এই অবস্থায় জ্বর বিদ্যমান থাকিবে ও শোণিত বদ্ধ থাকা বোধ হইবে সে পর্য্যন্ত জ্বর কালীন পথ্য ব্যবস্থার ন্যায় পথ্য করিবে, কিন্তু যদিও জ্বরাদি প্রকাশ না থাকিয়া ক্রমশঃ শরীর ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে অত্যল্প পরিমাণে, এক এক বারে লঘু-পাক দ্রব্য আহার করিবে । কোন প্রকার তেজস্কর বা শোণিত উষ্ণ কারক দ্রব্য ও মৎস্য, মাংসাদি ভক্ষণ করিবেক না ।

স্তন্যজ্বর (অর্থাৎ দুগ্ধজ্বর) ।

লক্ষণ—কম্প, উত্তাপ, পরিশেষে ঘর্ম্ম, নাড়ী প্রথমতঃ দুর্ব্বল। পরেতে নানাবিধ অসম্মান গতি বিশিষ্টা, মুখ বিষাদ, পিপাসা, কখন কখন পশ্চাত্তাগ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত টানিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বোধ, অস্থিরতা, মাথাধরা, স্তন্য-স্রাবের লঘুতা, প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হইয়া যাতনার লাঘব হয় এবং দিবসে ক্রমশঃ পুনর্বার উপসর্গ উপস্থিত হয় ।

নিদান—সস্তান প্রসব হইবা মাত্র তাহাকে স্তন্যপান-না করান, বিশেষতঃ মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি জন্য এই উপসর্গ হইয়া থাকে ।

মানসিক উদ্বেগ জন্য স্তন্যজ্বরের চিকিৎসা ।

যদ্যপি উক্ত সকল লক্ষণ থাকিয়া অত্যন্ত প্রবল জ্বর থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, ও কফি, পূর্ণমাত্রায় ছয় ঘণ্টা অন্তর উপর্ধু-পরি দিবেক ।

উক্ত প্রকার চিকিৎসার পর জ্বরের লাঘব হইলে এবং পরেতে যদিও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, অতিশয় মাথা ধরা, এবং অত্যন্ত কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদিও উক্ত প্রকার উপসর্গ থাকিয়া জ্বরের সহিত শ্লেষ্মা-ধিক্যতা থাকে তাহা হইলে এবং বিশেষতঃ স্মৃতিকা-জ্বর নিবারণের জন্য ।

ঔষধ—পল্‌সেটিলা, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর অথবা অবস্থানুসারে ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

পঞ্চা ব্যবস্থা ।

এতাদৃশ সময়ে অতিশয় পাতলা যবের মণ্ড মাত্র ব্যবস্থা করিবেক, অতি শীতল, অথবা অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে প্রস্তুতীকে রাখিবে না ।

প্রসবের পর জরায়ু হইতে দ্রব স্রাবের বিসমতা ।

প্রসব হওয়ার কিয়দ্দিবস পর কাল পর্য্যন্ত জরায়ু হইতে কাহার কাহার পাতলা, অত্যপ্প পরিমাণে ও কাহার কাহার অধিক পরিমাণে দ্রব, স্রাব হয়, ও তাহা কোন কোন স্ত্রীলোকের অধিক কাল ও কাহার কাহার অপ্প কাল মাত্র থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদিও জরায়ু হইতে গাঢ় রক্তবর্ণ দ্রব স্রাব হয়, ও তাহার সহিত উদরের মধ্যে আন্তরিক জ্বালার ন্যায় যাতনা বোধ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ ত্রিবার এবং প্রাতঃকালে সেবন করিবেক ।

যদ্যপি শীতল সেবা জন্য হইয়া থাকে এবং পশ্চাত্ত্যাগে অতিশয় যাতনা ও নিরত রুখা মলের বেগ হয়, তাহাইহলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অভ্যন্তরে কষ্টদায়ক চুল্কানি অথবা অধিককাল পর্য্যন্ত আব, ও যদ্যপি প্রস্রুতী বলিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাস্কেরিয়া, পূর্ণমাত্রা বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি প্রত্যেক বার শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময়ে জরায়ু হইতে পরিষ্কার রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক এক বার বরিয়া সেবন করিবেক ।

সুতিকাবস্থায় অতিসার ।

সুতিকাবস্থায় অতিসার হইলে তাহাকে অত্যন্ত হানিজনক বিবেচনা করিতে হইবে, অতএব তাহা সুচিকিৎসার দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করা কর্তব্য ।

চিকিৎসা ।

সুতিকাবস্থায় ঘর্ষাবরোধ হইয়া অথবা শীতল সেবা জন্য যদ্যপি অতিসার হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি অজানতঃ ও বিনা যাতনায় মল, নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়ামস্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি জলবৎ দুর্গন্ধ মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এণ্টিমানিয়স্-জুডম্, অর্দ্ধমাত্রা বরিয়া প্রত্যেক বার বিরেচনের পর দিবেক ।

উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকিয়া সহজে আরোগ্য না হয় ও অধিক কালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কস্ ফরস্, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর চারি মাত্রা দিয়ৎ কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে বার ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের চারিমাত্রার পর কিছু উপশম বোধ না হয় অথবা কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইয়া পরেতে এক রূপেই থাকে তাহা হইলে, উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ছয় ঘণ্টা পরে ।

ঔষধ—এসিডম্-ফস্ ফরিকম্, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃ-কালে সেবন করিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

উক্ত প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইলে গোধূম (গমের) পাল প্রভৃতি দ্রব্য জলেতে পাতলা করিয়া সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ মিস্রির সহিত এক এক বারে অল্প পরিমাণে পথ্য করিবেক, কিন্তু যদ্যপি এই উপসর্গ অধিক কালস্থায়ী হয় ও প্রস্রুতী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে, তাদৃশ সময়ে মাংসের কাথ কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেওয়া বিধেয় ।

প্রসবের পর দৌর্বল্য ।

সন্তান প্রসবের পর অধিক পরিমাণে শোণিত নির্গত হওয়াতে প্রস্রুতীর দৌর্বল্য ও ক্ষীণতা হইয়া থাকে তৎকালে প্রথমতঃ ।

ঔষধ—চায়না, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং, সন্ধ্যাকালে চারি দিবস পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদ্যপি শিরা সম্বন্ধীয় দৌর্বল্য জন্য দুর্বলতা হয় এবং তাহার সহিত অস্থিরতা ও অনিদ্রা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক কিন্তু যদ্যপি অস্থিরতা অত্যন্ত প্রবল হয় তাহা হইলে কফি, এবং পরেতে বেরাট্রম্, ঐ রূপে দিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

উক্ত প্রকার অবস্থায় লম্বুপাক হয় এমত দ্রব্য এক এক বারে অল্প পরিমাণে দিবে এবং প্রসূতীকে অতিস্থিরভাবে রাখিবে, কোন প্রকার উচ্চ ধ্বনি যাহাতে শুনিতে না পায় এ প্রকার স্থানে রাখিবেক, ও তাহার সহিত অধিক আলাপ আদি করা ও পরিবারের বহু লোক একত্রিত হইয়া তাহার নিকট থাকা কোন মতেই বিধেয় নহে ।

শিশুর চিকিৎসা ।

সদ্যজাত শিশুর স্তন্যপানে অনিচ্ছা ।

প্রসূত-সন্তান যদ্যপি, কিয়ৎকাল পরে মুখে স্তন দিলে ও স্তন্যপান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিনা, অর্দ্ধমাত্রা ছয় ঘণ্টা অন্তর, প্রসূতীকে সেবন করিতে দিবে এবং একটা ক্ষুদ্র বটিকা একতোলা জলে দিয়া, মিশ্রিত হইলে প্রস্তুত জলের দ্বারা শিশুর জিহ্বা ভিজাইবে ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ সেবন করার ছয় ঘণ্টা পরেও ঐ রূপে শিশু স্তন্যপানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি শিশু স্তন গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে,
তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, পূর্ববৎ ।

পথ্য ব্যবস্থা—প্রসবের অব্যবহিত পর সময়ের ব্যবস্থার
ন্যায় ।

স্তন্য প্রদাহ অর্থাৎ স্তন কোলা ।

(খুম্কা ।)

যখন হঠাৎ স্তন্যস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তৎকালে, স্তন,
প্রদাহ বিশিষ্ট হইয়া ফুলিয়া কঠিন হয় এবং স্তনের কিয়দংশ
পাকিয়া ফাটিয়া পুঁজ পড়ে, অবশিষ্টাংশ ফুলিয়া কঠিন হইয়া
থাকে এবং পরিশেষে সমস্ত পাকিয়া যায় অথবা দৃঢ় হইয়া
থাকে ।

নিদান—ভয় হইতে, বা কোন প্রকার প্রবল রাগাদি জন্য
হঠাৎ স্তন্যস্রাব রোধ হইয়া অথবা শিশুকে অধিক কাল পরে
স্তন্য প্রদান করা বা শিশুর মৃত্যু জন্য স্তন্য দিতে না পারায় এই
রোগ উপস্থিত হয়, ইহা সুচিকিৎসিত না হইলে পরেতে এমন ক্ষতি
হইতে পারে যে তদ্বারা চিরকালের জন্য স্তনের হানি হইয়া যায় ।

চিকিৎসা ।

যখন স্তন, কঠিন, রক্তবর্ণ হইয়া, প্রথমতঃ প্রদাহের সহিত
ফুলিয়া উঠে এবং যদ্যপি জ্বর থাকে, তখন ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, একটা ক্ষুদ্র বটিকা একতোলা গরিমাণ জলে
মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি অতিশয় ফুলিয়া চর্ম্মের উপর রক্ত কুষ্ঠের ন্যায় প্রকাশ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি পূরোক্ত ঔষধ সেবনের পর আংশিক লাঘব হয় এবং পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইবার উপক্রম থাকে তৎকালে এবং যদ্যপি পাকিয়া স্থান বিশেষে ফাটিয়া অধিক পুঁজ নির্গত হইতে থাকে, এবং শীঘ্র ক্ষত পুরিয়া উঠিবার উপক্রম দেখা না যায় তাহা হইলে শীঘ্র সুখাইবার নিমিত্ত।

ঔষধ—সলফর, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে চারি দিবস পর্য্যন্ত দিয়া পরেতে এক দিবস অন্তর রাত্রিতে শয়নের কালে এক মাত্রা করিয়া সেবন করিবেক।

যদ্যপি এই উপসর্গ শীতল বায়ু সেবন জন্য বা শীতল স্থানে থাকাতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ডল্কেমেরা, পূর্ণমাত্রা আবশ্যক হইলে ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি বাহ্যিক আঘাত জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর্গিকা, পূর্ববৎ সেবন করিবেক ও আর্গিকার অমিশ্র আরক এক তোলায় সহিত দেড় ছটাক জল মিশ্রিত করিয়া প্রাপ্ত জলের দ্বারা প্রদাহ বিশিষ্ট স্থান ধৌত করিবেক।

উক্ত সকল প্রকার চিকিৎসার পর যদ্যপি ফুলিয়া কঠিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে তিন দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিয়া আবশ্যক হইলে তাহার ছয় দিবস পরে পুনর্ব্বার ঐ রূপে চালাইবেক।

যদ্যপি উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর পাকিয়া ফোড়ার

মায় হইয়া উঠে, অত্যন্ত যাতনা বৃদ্ধি এবং সময়ে সময়ে শীত বোধ হয়, স্তনের তিতর দপ দপ করে, তাহা হইলে পাকিয়া নির্গত হওয়া নিবারণ জন্য ।

ঔষধ—কস্ফরস্, পূর্ণমাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ ব্যবহারের পরে ও যাতনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে ও অত্যন্ত উত্তাপ থাকে বিশেষতঃ যদ্যপি পাকাইয়া নির্গত করার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হেপার্ অর্দ্ধমাত্রা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি অন্য কোন প্রকার পোল্টিস্ বা প্রলেপ দ্বারা কোন অঙ্গ ব্যক্তি পাকাইয়া থাকে ও স্তন দিয়া দুগ্ধের ন্যায় জলবৎ গুঁজ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ সাইলিশিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ছয় দিবস পর্যন্ত দিয়া তাহার শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে,

যদ্যপি উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকে অথবা ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত গুঁজ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কস্ফরস্, অর্দ্ধমাত্রা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

যখন সামান্য প্রদাহ মাত্র থাকে, তৎকালে জ্বর কালীন ব্যবস্থার ন্যায় পথ্য দিয়া পরেতে পাকিলে লঘুপাক দ্রব্য অথচ কিঞ্চিৎ বলকারক হয় তাহাই ব্যবস্থা করিবে, শাক, মৎস্য, অন্ন, ও গুরুপাক দ্রব্যাদি বর্জন করিবেক ।

স্তন্যাতাব বা স্তন্যের অল্পতা ।

শারীরিক শক্তির অম্পতা বা প্রদাহ জন্য স্তন্যের অম্পতা বা শুষ্কতা ঘটিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি এই উপসর্গ প্রদাহ জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে স্তনের প্রদাহ বিষয়ক চিকিৎসানুযায়ী চিকিৎসা করিবেক ।

যদ্যপি সাময়িক দুর্বলতা জন্য এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পরেসটিলা পূর্ণমাত্রা, প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে ।

যদ্যপি দৌর্বল্যাदि কোন প্রকার প্রকাশ্য কারণ না থাকাতেও স্তন্যের অম্পতা হয় ও বিশেষতঃ যদ্যপি স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত পরিমাণে আর্তব নির্গত হওয়াতে এই উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ণমাত্রা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবেক ।

যে স্ত্রীলোকের মাসিক, কালবিলম্ব হইয়া, অম্প পরিমাণে আর্তব নির্গত হয় ও স্তনের বোঁট ফাটা এবং ক্ষত থাকার ন্যায় দেখা যায় তাহার এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে ।

ঔষধ—কফিকম্, অর্দ্ধমাত্রা প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে সেবন করিবেক ।

পথ্য ব্যবস্থা—পূর্ববৎ ।

সদ্যজাত শিশুর চিকিৎসা ।

সদ্যজাত সন্তান প্রথমতঃ ভুমিষ্ঠ হইবামাত্রতঃ এই এক আপদে পতিত হয়, যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত পরিচালন, এবং অঙ্গ-চালন-শক্তি বিহীন হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়ে ।

নিদান—স্বাভাবিক দুর্বলতা, কষ্টে প্রসূত হওয়া, নাভির নাল অর্থাৎ নাড়ী গলায় জড়াইয়া যাওয়া, গলদেশের মধ্যে স্লেয়া একত্রিত হওয়া, ও ফুস্ফুস যন্ত্রের কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতে ইঠাৎ শীত হইতে গ্রীষ্ম বা গ্রীষ্ম হইতে শীতে পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

সদ্যজাত শিশু উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে উবুড় করিয়া বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত গড়াইবে, এইরূপ উপর্ঘ্যু-পরি পাঁচ, শাত, বার অথবা প্রয়োজন হইলে ততোধিক বার পর্য্যন্ত করিবেক । যদিপি এতদ্বারা জীবিত না হয়, তাহা হইলে এক জন যুবক বা যুবতী শিশুর গুষ্ঠাধর আপন গুষ্ঠাধরে লগ্ন করিয়া শিশুর, নাসিকাদ্বয়ের ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ করিয়া ও পাকস্থলী, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, বলের সহিত মুখ দিয়া বায়ু প্রবেশ করাইবে । অনন্তর বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিলে ক্রমশঃ বক্ষঃস্থলের উপর চাপন্ দিয়া বায়ু নির্গত করাইবে, যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ না হয় সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঐ প্রকরণ করিবেক । এতদ্ব্যতিরেকে শিশুকে শীতল বায়ুতে রাখা ও তাহার বক্ষঃস্থলের উপর শীতল জল দ্বারা আঘাত করা, শরীরের উপর চাপড় মারা, হস্ত পদাদি অম্পা অম্পা চাপাও উপকারক হয় ।

ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা।

যদ্যপি পূর্বোক্ত কোন প্রকরণের দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আদি শারীরিক কার্য আরম্ভ হইয়া সর্বতোভাবে জীবিত লক্ষণ না দেখা যায়, অথবা নাড়ী, স্রবের ন্যায় অতি ক্ষীণা বোধ হয়, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, হস্ত পদাদি বলহীন, কিম্বা যদ্যপি মুখ ফুলিয়া বেগুনিয়া বর্ণ হয়, আরও যদ্যপি বায়ু-বাহক-নালী, শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম্-টার্টেরিকম্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা শিশুর জিহ্বার উপর দিবেক অথবা চারিটি ক্ষুদ্র বটিকা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত জলের এক এক ফোটা করিয়া দিয়া শিশুর জিহ্বা ভিজাইবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পোনের মিনিট পরে ক্রমশঃ উত্তমাবস্থা না দেখা যায়, অথবা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ থাকিয়া মুখ, ঈষৎ নীলবর্ণ, বা সম্পূর্ণ নীলবর্ণ দেখা যায়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ওপিয়ম্ পূর্নবৎ।

যদ্যপি শিশু দীর্ঘাকৃতি ও পুষ্টাঙ্গ হয় এবং কিয়ৎ কাল পূর্বে মুখ, ফুলা বা ঈষৎ নীলবর্ণ থাকিয়া পরেতে ক্রমশঃ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা জিহ্বার উপরে দিবেক।

সহকারী কর্তব্য বিধি।

যদ্যপি শিশুর গলার ভিতর শ্লেষ্মা বা অন্য কোন পদার্থ থাকে (যদ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করে) তাহা প্রাপ্তক কোন প্রকার ঔষধ দিবার পূর্বে প্রথমতঃ দূর করা কর্তব্য।

শিশুর নাভিস্ফুটন (নাইফোলা !)

ঔষধের উপায় দ্বারা চিকিৎসা ।

যখন সদ্যজাত শিশুর নাভি ফাটিয়া যায়, তৎকালে একটী জায়ফল, দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া বস্ত্র খণ্ড মধ্যে আবৃত করিয়া সূচীদ্বারা বদ্ধ করিয়া, উক্ত জায়ফল খণ্ড নাভির উপর রাখিয়া, আর এক খানি বস্ত্র খণ্ড দ্বারা দুই তিন স্তর করিয়া জড়াইয়া দিবেক ।

ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা ।

উক্ত প্রকার চিকিৎসা দ্বারা যদিপি উপকার বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, ছয়টী ক্ষুদ্র বটিকা, ছয় তোলা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত জলের এক তোলা করিয়া বার ঘণ্টা অন্তর শিশুকে সেবন করাইবে ।

উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার ছয় দিবস পরে যদিপি আরোগ্য বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেরাট্রম্, পূর্ববৎ ।

যদিপি পূর্বোক্ত চিকিৎসা দ্বারা কোন প্রকারে উপকার বোধ না হয় ও শিশু অত্যন্ত ছিল্লি প্রায় হয় এবং পেট কষিয়া ধরে ও পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ পাতলা মল, নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, একটী ক্ষুদ্র বটিকা চচ্চিশ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদিপি উপরোক্ত কোন প্রকার ঔষধ দিয়া কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ হইয়া অধিককাল পর্যন্ত সমতীব্র থাকে, অথবা (নাল ছেদন) নাড়ী কাটার পর যদিপি নাভিতে ঘা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সহফর্, একটী ক্ষুদ্র বটিকা চারি, পাঁচ দিন অন্তর ।

শিশুর অনিদ্রা ।

যদ্যপি শিশু, অস্থির হয় ও বহুকাল জাগরিত হইয়া কোন
 রাতে সহজে নিদ্রিত না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, একটা ক্ষুদ্র বটিকা প্রত্যহ রাত্রিতে দিবেক ।

যদ্যপি শিশুর মুখ, রক্তবর্ণ দেখায় এবং অনিদ্রতা থাকে,
 তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি পেট ফুলিয়া বা কষিয়া ধরিয়া থাকে এবং পেটে
 বেদনা থাকার ন্যায় শিশু, উপরের দিগে পা টানিতে থাকে
 এবং চীৎকার করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ ।

উক্ত তিন প্রকার ঔষধ দুই মাত্রা করিয়া দিবেক ।

শৈবাবস্থার পীড়া ।

শিশুর চক্ষুঃ ফোলা ।

নিদান—এই উপসর্গ হঠাৎ আলোক বা অগ্নি শিখা
 দর্শন, বা মাতৃদোষে হইয়া থাকে । অনেকানেক সম্ভাব্য প্রথমতঃ
 এই রোগে আক্রান্ত হইয়া সূচিকিৎসিত না হওয়ায় জন্মান্ত
 হইয়া যায় ।

চিকিৎসা ।

এই উপসর্গ উপস্থিত হওয়া, সাবধানতার সহিত পরীক্ষা
 করিয়া স্থির হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা বায় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি পিতৃ বা মাতৃ শারীরিক দোষ জন্ম এই উপসর্গ উপস্থিত হওয়া নিশ্চয় বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ সলফু, একটা ক্ষুদ্র বটিকা দিয়া ভাহার চারি দিবস পরে, ক্যালেকেরিয়া, ঐ রূপে দিবেক উক্ত প্রকারে পুনর্বার সলফু, এবং পরে ক্যালেকেরিয়া উপর্যুপরি ভাবে চালাইবেক ।

সহকারী উপায় ।

ঈষদ্রব্য জল দিয়া শিশুর চক্ষুঃ, পুনঃ পুনঃ ধৌত করা-ইবেক ।

শিশুর মস্তকে শ্লেষ্মাবদ্ধ ।

এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে শিশুর নাসিকা-দ্বার, রোধ হইয়া স্তন্য পানে অতিশয় ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং ক্রমশঃ শিশুকে দুর্বল করিতে থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি শিশুর নাসিকা অবরুদ্ধ থাকে অথবা রাত্রিতে শুষ্ক হয়, দিবসে অত্যুপমাাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা একতোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি মস্তকে শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলের ভিতর সাঁই সূঁই শব্দ করে, নিঃশ্বাস বদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা-বিশিষ্ট কাশী থাকে এবং কঠেতে ঘনশ্বাস বহে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এন্টিমোনিয়ম-টার্টেরিকম্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা, একতোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি মস্তকে শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া নাসিকা দিয়া জল পড়ে, বিশেষতঃ যদ্যপি জ্বর বোধ থাকে, গাণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, ও নাসিকার ভিতর বেদনা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা ভিনতোলা জলে মিশ্রিত করিয়া একতোলা পরিমাণে ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি স্নায়ুর পূর্বে বৃদ্ধি বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—কার্বো-বেজিটেবিলিস্, একটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দিবেক।

যদ্যপি পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় এবং নাসিকা-দ্বার দিয়া সবুজ, বা পীতবর্ণ, বা রক্ত মিশ্রিত, অথবা পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেপেরটোলা, একটি ক্ষুদ্র বটিকা বার ঘণ্টা অন্তর দুই দিবস পর্য্যন্ত দিয়া তাহাতে উপশম বোধ না হইলে, সলফর, ঐ রূপে পূর্ববৎ দিবেক।

যদ্যপি নাসিকা-দ্বার শুষ্ক হইয়া বদ্ধ হইয়া থাকে এবং দিবা কালে পুঁজের ন্যায় পীতবর্ণ দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ও নাসিকার বেদনা বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, একটি করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা প্রত্যহ প্রাতঃকালে দিবেক।

সদ্যজাত শিশুর অনিদ্রা ও রোদনপরায়ণতা।

যদ্যপি শিশু নিয়ত রোদন করিতে থাকে ও কোন মতে নিদ্রিত না হয় এবং 'অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে অথচ তাহার কারণ জানা যায় না, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, একটি ক্ষুদ্র বটিকা চক্ষিশ ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি শিশু কোন কারণবশতঃ, (অর্থাৎ নিদ্রায় ইচ্ছা থাকিতে তাহাকে চেতন করাণ হেতুক) তাল্প হইয়া রোদন করিতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কফি, একটা ক্ষুদ্র বটিকা বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি শরীরে উত্তাপ থাকে ও অত্যন্ত অস্থির হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা আবশ্যক হইলে ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধ জন্য যাতনায় উদর স্ফীত হইয়া পেট বেদনা করে, পদদ্বয় উপরের দিকে টানিতে থাকে এবং সময়ে সময়ে রোদন করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি অধিক ভোজন বা অবিধেয় দ্রব্য ভোজন করাতে উদর স্ফীত হইয়া পেট বেদনার সহিত অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য রোদন-পরায়াণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেগেসটিল পূর্ববৎ ।

শিশুর উদর স্ফীততা ।

এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে ধাত্রী আপন হস্ত অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া শিশুর উদরের উপর দিয়া ঈষৎ ঈষৎ চাপিলে তৎক্ষণাৎ উপশম বোধ হয়, কিন্তু যদ্যপি পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করাতে আরোগ্য বোধ না হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত মতে চিকিৎসা কর্তব্য ।

যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং শিশু ক্ষীণকায় হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্ক-বমিকা, একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি অতিসার থাকে ও চক্ষুঃ দিয়া শ্লেষ্মা নিগত হয় অথবা আঁজিনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—পেসেটিলা, পূর্ববৎ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর উপশম বোধ না হয়, অথবা মধ্যে মধ্যে অঙ্গ খেঁচনি বা অতিসার প্রকাশ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, পূর্ববৎ।

পূর্বোক্ত কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগের পর যদ্যপি পুনর্বার তাদৃশ যাতনা উপস্থিত হইবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফর, ও ক্যালেকেরিয়া, প্রথমতঃ প্রথমোক্ত ঔষধের একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া এক দিবস প্রাতঃকালে এক যাত্রা দিয়া তাহার দুই দিবস পরে শেষোক্ত ঔষধ ক্রমশঃ উক্ত রূপে দুই দিবস দিবেক এবং পরেতে আবশ্যক হইলে পুনর্বার প্রথমোক্ত ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত রূপে চালাইবে।

শিশুর দুগ্ধক্ষুড়ি।

বহুসংখ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ফুক্ষুড়ি একত্র হইয়া শিশুর বক্ষঃস্থলে প্রকাশ হয়।

লক্ষণ—প্রথমতঃ বদনে, গণ্ডদেশে, এবং ললাটে প্রকাশিত হইয়া সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়, ফুক্ষুড়ির অন্তরস্থ রস, অম্প-

কাল মধ্যে পীতবর্ণ, গাঢ়, অথবা শোণিতবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ কাটিয়া যায়, অত্যন্ত চুল্কায় এবং পরেতে কেবল চক্ষুঃ ও নাসিকা ব্যতিরেকে সর্বদাঙ্গ ব্যাপ্ত হয় ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে শিশু, অত্যন্ত অস্থির হয় এবং যে স্থানে ফুক্ষুড়ি উঠে তাহার চতুষ্পার্শ্বে রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া অত্যন্ত চুল্কায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি পিতা মাতার দোষ জন্য এই রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-টক্কিকোডেগুন, একটা ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে প্রথমতঃ এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার এক দিবস দিয়া তাহার দুই দিবস পরে পুনরবার উক্ত রূপে দিবেক, অথবা ইহার সহিত সলফর উপর্যুপরি দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় এবং ফুক্ষুড়ি দিয়া রস নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে দশ দিবস পর্য্যন্ত দিবেক ।

এই উপসর্গ অধিক কাল স্থায়ী হইলে এবং যদ্যপি শীঘ্র আরোগ্য হইবার উপক্রম না দেখা যায়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত মতে ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবেক ।

ঔষধ—গ্রাফাইটিস্, সিপিয়া, এবং ক্যাফিসেগ্রিয়া, প্রথমতঃ

গ্রাফাইটিস্, একটি ক্ষুদ্র বটিকা, এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া এক এক বার প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে চারি দিবস পর্য্যন্ত দিয়া তাহার শেষ মাত্রার পঞ্চ দিবস পরে আবশ্যক হইলে ঐ ঔষধ অথবা সিপিয়া এবং তাহার পর স্ফাফিসেগ্রিয়া, উক্ত নিয়মানুসারে দিবে ।

কোষ্ঠ বদ্ধতা ।

যদ্যপি কোষ্ঠাবরোধের সহিত উদর স্ফীততা, উদরের কঠিনতা, অনিদ্রতা, অস্থিরতা ও দৌর্বল্য থাকে, এবং জিহ্বা মলিন, ঢুলানি, পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠের বেগ, ও কটাবর্ণ কঠিন মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি শিশুর শীত বোধ অথবা স্পর্শ করিলে গাত্র শীতল বোধ হয়, বিশেষতঃ শিশু কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে কোষ্ঠ-বদ্ধতার সহিত অসাধারণ রূহৎ আকারে গোলাকৃতি হইয়া মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর দুই দিবস দিবেক, তাহার চারি দিবস পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার উক্ত রূপে চালাইবেক, অথবা নক্স-বমিকা, একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক দিবস দিয়া পর দিনে, ব্রায়োনিয়া, ঐরূপে দিবেক, এই প্রকারানুসারে ক্রমশঃ চারি দিবস পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি রূপে উভয় ঔষধ সেবন করাইয়া, শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার প্রথমোক্ত ঔষধ উক্ত প্রকারে চালাইবেক ।

যদ্যপি উক্ত নিয়মানুসারে, ঔষধ প্রয়োগের চারি দিবস পরে কোন উপশম বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সকফর, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া

চক্ষিশ ঘণ্টা অন্তর ক্রমশঃ চারি দিবস পর্য্যন্ত দিয়া আবশ্যক হইলে শেষ
নাত্রার পাঁচ দিবস পরে, নক্স-বমিকা, উক্ত ব্যবস্থানুসারে সেবন
করাইবেক ।

যদ্যপি শিশু বলবান্ বোধ হয় এবং তাহার উদর, স্ফীত,
ও স্পর্শ করিলে কঠিন, বোধ হয় ও গাঢ় কটাবর্ণ, গোলাকৃতি
কঠিন মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, দুইটী ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত
করিয়া চক্ষিশ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধতা থাকায় শিশু বিরক্ত স্বাভাবিক না
হয়, এবং গাঢ় সবুজ, বা ঈষৎস্বেতবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট,
কঠিন মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পলেসটিলা, পূর্ববৎ দিবেক ।

উক্ত কোন প্রকার ঔষধে লক্ষণানুযায়ী কিঞ্চিৎ উপশম
বোধ হইলে, সর্বতোভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত ।

ঔষধ—সলফর, দুইটী ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া
চক্ষিশ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

শিশুর স্বাভাবিক কোষ্ঠ বদ্ধতা ।

যদ্যপি শিশু ক্ষীণতা প্রযুক্ত মল ত্যাগ করিতে অশক্ত
হয় এবং অজীর্ণ দোষ, অর্থাৎ অন্নত্র, উদর-স্ফীততা ইত্যাদি
থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এলমিনা, দুইটী ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে, এক তোলা জলে
মিশ্রিত করিয়া এক দিবস অন্তর প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে আট দিবস
পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত উপসর্গ বিরোচক ঔষধ সেবন জন্য উৎপন্ন

হইয়া থাকে, এবং অজীর্ণতা দোষ থাকে, ও যদি শিশু হস্ত পদাদিতে বেদনা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—লাইকোপেডিয়ম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি উক্ত উপসর্গ পারা দোষ জন্য ঘটিয়া প্রাচীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—এসিডম্-নাইট্রিকম্, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে, এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে চারি দিবস পর্য্যন্ত দিবেক, তাহার পর চারি দিবস পর্য্যন্ত উক্ত পরিমাণে এক এক দিবস অন্তর ।

যদ্যপি পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগের রূথা বেগ* হয় অথবা ক্রমি দোষ* জন্য এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং পেট বেদনা করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, এলমিনার ব্যবস্থার ন্যায় দিবেক ।

শৈশবাবস্থার অভিসার ।

এই উপসর্গ অল্প, বা অপাচ্য-দ্রব্য ভোজন জন্য অথবা দন্ত উঠিবার সময়ে উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।

উদর, ক্ষীত হইয়া কঠিন হইয়া থাকে, পেট কামড়াইয়, অস্থিরতা, সদত রোদন, পদদ্বয় উপর দিকে টানা, পুনঃ পুনঃ পিত্ত মিশ্রিত, জলবৎ, পিচ্ছিল, ঈষৎ শুভ্র, বা পীত, বা সবুজ বর্ণ, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল, নির্গত হয়, তৎপক্ষে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা, দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া এক তোলা পরিমাণে চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ অজীর্ণতা জন্য হয় এবং জলবৎ পিচ্ছিল, পিত্ত মিশ্রিত বা ঈষৎ শ্বেত, বা সবুজবর্ণ, মল নির্গত হয়, রাত্রিতে বৃদ্ধি, ক্ষুধা থাকে না, বিশেষতঃ যদ্যপি ভয় জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পেপেটিকা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি শিশুর দন্ত উঠিবার সময় অথবা অন্ত্র প্রাসনের পর এই উপসর্গ উপস্থিত হয়, ও বমন করে, বদন পাণ্ডুবর্ণ, সদত রোদনপরায়ণ হয়, এবং পীতবর্ণ, অথবা ঈষৎ সবুজ, বা কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল নিঃসৃত হয়, কোষ্ঠের বেগ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিকাকুয়ানা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া এক তোলা পরিমাণে চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি জলবৎ পিচ্ছিল মলের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে অথবা ঈষৎ কাল, সবুজ, কিম্বা শ্বেতবর্ণ মল নিঃসৃত হয়, ও অত্যন্ত বেগের সহিত মল ত্যাগ কালীন হারীষ নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্-করোসাইবস্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ সাময়িক উষ্ণতা জন্য সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে ।

যদ্যপি এই রোগ, দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়াতে ক্রমশঃ শিশু, ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুপ্রাণে পতিত হইবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে এবং যদ্যপি অধিক পরিমাণে জলবৎ পিচ্ছিল, ঈষৎ

সবুজ, শ্বেত বা কটাবর্ণ, পাচা গন্ধ বিশিষ্ট মল, নির্গত হয়, এবং তাদৃশ উপসর্গ রাত্রিতে বা ভোজন পানাদি করিলে উপস্থিত হয়, অত্যন্ত পিপাসা, অনিদ্রা, রোদন-পরায়ণতা, উদর বৃদ্ধি, অতিশয় দুর্বলতা ও বিশেষতঃ যদ্যপি অতিসারের সহিত বমন হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, চারিটি ক্ষুদ্র বটিকা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া এক এক তোলা পরিমাণে ছয় ঘণ্টা অন্তর, চারি মাত্রা পর্য্যন্ত দিয়া। পরেতে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে উক্ত পরিমাণানুসারে এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ বহুকাল স্থায়ী হয়, ও অত্যন্ত ক্ষীণতা, উদরের কঠিনতা, গুহদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব রক্তবর্ণ দেখা যায়, অথবা শরীরের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফর, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে দিয়া, তাহার চারি দিবস পরে পুনরার উক্ত রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ উক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উপকার বোধ না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, পূর্ববৎ, কিন্তু ইহা উক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার এক সপ্তাহের পর আরম্ভ করিবেক ।

যদ্যপি অতিসারের সহিত প্রদাহ থাকিয়া শারীরিক উষ্ণতা, নাড়ীর তীব্রগতি, ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর উষ্ণতা প্রভৃতি নিবা-

রিত হইয়া কেবল শিশু নিয়ত রোদন করিতে থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ তিন মাত্রা দিয়া পরেতে বার ঘণ্টা অন্তর একটা করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি অতিসারের সহিত মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং তলপেট ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিস্, পূর্ববৎ দিবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ ভয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া বার ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি অতিসার নিবারিত হইয়া পরেতে দৌর্বল্য ও টুলানি থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—প্রথমতঃ চায়না, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক, তাহার দুই মাত্রার পর বার ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া আসেনিকম্, উক্ত রূপে চালাইবেক ।

মূত্রের অধারণতা ।

এই উপসর্গ মূত্রস্থলীর শক্তি হীনতা, মূত্র নির্গমনের যন্ত্রের বিকৃতিবস্থা, স্বাভাবিক দৌর্বল্য, বা ক্রমি দোষ জন্য, হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি শিশু, নিদ্রিত হইয়া প্রথমাবস্থায় শয্যায় প্রত্যা-
করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিপিগা, দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত

করিয়া চারি দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যাহ শয়নের পূর্বে সেবন করাইবেক, তাহার পর চারি দিবস অপেক্ষা করিয়া যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পুনরুদার ঐ রূপে চালাইবেক।

যদ্যপি মস্তকের দোষ জন্য এই উপসর্গ উপস্থিত হওয়া স্থির করা হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—বেলাডোনা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক চতুর্থ দিবসে এক এক বার করিয়া সেবন করাইবেক।

যদ্যপি এই রোগ প্রাচীন হয়, এবং শিশু অতি কোমল-স্বভাব হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি তাহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—সলফর, পূর্ববৎ।

যদ্যপি কৃমি দোষ জন্য এই রোগ উপস্থিত হওয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—সিনা, দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক চতুর্থ দিবসে এক এক বার করিয়া সেবন করাইবেক।

শিশুর মূত্রাবরোধ।

যদ্যপি প্রস্রাব অবরোধ হইয়া শিশুর, অত্যন্ত অস্থিরতা, ক্রিয়ণ পরিমাণে জ্বর বোধ এবং প্রস্রাবের বেগ থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া আবশ্যক হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

উক্ত ঔষধ দুই মাত্রা দেওয়ার দুই ঘণ্টা পরে যদ্যপি উপকার বোধ না হয় এবং অস্ত্রের নিম্ন দেশে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—পকসেটিল, পূর্ববৎ।

উপরোক্ত উপসর্গ বিদ্যমান থাকিয়া যদ্যপি তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে এবং শিশু, পিত্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্ল-বমিকা, একোনাইটের ব্যবহার ন্যায় দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগের পর বিশেষ উপকার বোধ না হয়, তাহা হইলে অথবা এই উপসর্গ উপস্থিত হইবার প্রথম সময়ে অন্য চিকিৎসা না করিয়া, কপূরের আরকের শিশির সিপি খুলিয়া পোনের মিনিটের মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে শিশুর নাসিকায় ধরিলে, বিশেষ উপকার বোধ হইবেক ।

শিশুর কামলা রোগ ।

নিদান—এই উপসর্গ যেরূপ পূর্বে (সাধারণ চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে) উক্ত হইয়াছে, তজ্জন্য, অর্থাৎ সদ্য-প্রসূত সন্তানকে পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করানতে উপস্থিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি হঠাৎ শীতল বায়ু বা জল লাগিয়া অথবা মানসিক উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত শরীর হরিদ্রাবর্ণ দেখায় ও অত্যন্ত উদর স্ফীত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কামোমিলা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত জলের এক তোলা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ দুই দিবস পর্য্যন্ত দিয়া কিঞ্চিৎ উপশম
বোধ হয়, তাহা হইলে শেষ মাত্রার তিন দিবস পরে ।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, উপরোক্ত রূপে দুই দিবস পর্য্যন্ত দিবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ এমত ভাব ধারণ করে যে কখন
প্রকাশিত ও কখন অদৃষ্ট হয়, অথবা যদ্যপি অতিরিক্ত ঘর্ম
হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগের দুই দিবস পরে ।

ঔষধ—চায়না. দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া
এক তোলা পরিমাণে দুই দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে
দিবেক ।

যদ্যপি রোগী বিরক্ত স্বভাবান্বিত হয় এবং এই রোগের
সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ব্ববৎ ।

শিশুর দাঁতি লাগা ।

লক্ষণ—এই উপসর্গ জন্মের পর অল্প দিবস মধ্যেই
ঘটিয়া থাকে, প্রথমতঃ স্তন্যপানে রুখা চেষ্টা, এবং পান
করিলেও স্তন্য-দুগ্ধ উদরস্থ হয় না, উভয় চোয়াল চাপিয়া ধরে,
সমস্ত শরীর দৃঢ় হয়, এবং পরেতে মৃত্যু ঘটনা হয় । এই রোগ
দুই দিবস হইতে চারি দিবস পর্য্যন্ত থাকে ।

নিদান—এই রোগ বাহ্যিক উত্তেজনা, শীতল সেবা, অল্প
স্তন্যপান, এবং কদর্য বায়ু সেবন জন্য হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

এই রোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ নিম্ন লিখিত প্রকারা-
নুযায়ী আন্তরিক, এবং বাহ্যিক চিকিৎসা কর্তব্য ।

ঔষধ—আর্গিকা, দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা অর্ধ ডোলা জলে মিশ্রিত
করিয়। প্রস্তুত জলের এক এক ফোটা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুর
মুখে দিবেক এই রূপে বার ঘণ্টা পর্যন্ত দিয়া পরেতে ক্রমশঃ অধিক
সময়ান্তর দিবেক এবং আর্গিকা, অমিশ্র আরক দশ ফোটা, দেড় ছটাক
জলে মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত জলের দ্বারা চোয়ালের উপরিভাগ চক্ষিণ
ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ধৌত করাইবেক ।

যদ্যপি এই উপসর্গ হঠাৎ শীত লাগাতে বা শীতল-সেবা
জন্য উপস্থিত হওয়া নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, ক্ষুদ্র বটিকা, আর্গিকার ব্যবস্থার ন্যায়
দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ চারি মাত্রা দেওয়ার চক্ষিণ ঘণ্টা পরে
বিশেষ উপকার বোধ না হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি এই উপসর্গ
উপস্থিত হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট করা না যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, আর্গিকার ব্যবস্থানুসারে দিবেক ।

যদ্যপি শৌষোক্ত ঔষধের দ্বারা বিশেষ উপকার বোধ না
হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েরম্, এবং ল্যাকিনিস্, উপর্যুপরি রূপে অর্থাৎ
আর্গিকার ন্যায় উভয় ঔষধ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে প্রস্তুত করিয়া প্রথমতঃ
প্রথমোক্ত ঔষধের এক ফোটা শিশুর মুখে দিয়া, তাহার ছয় ঘণ্টা পরে
শৌষোক্ত ঔষধ ঐ রূপে দিবেক এই প্রকার ক্রমানুসারে উভয় ঔষধ ব্যবহার
করাইবেক ।

দন্ত উঠিবার সময়ের রোগ।

লক্ষণ—দন্ত উঠিবার সময় শিশু পূর্বাপেক্ষা রাত্রিতে অধিক অস্থির হয়, শরীরে উষ্ণতা, কখন কখন পাণ্ডুবর্ণত্ব, মাঢ়ী, ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উত্তপ্ত হয়, স্তন্যপানের ব্যাঘাত জন্মায়, অতিসার হয় এবং মুখ দিয়া লাল পড়ে।

চিকিৎসা।

যখন শিশু, অত্যন্ত উদ্বেজিত হয়, এবং নিদ্রিত হয় না ও মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে তৎকালে।

ঔষধ—কফি, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি উক্ত ঔষধের দুই মাত্রা দেওয়ার পর বার ঘণ্টা মধ্যে কোন উপকার বোধ না হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্র, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া বার ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধে আংশিক উপশম মাত্র বোধ হয় এবং কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুধা শুনিলেই, শিশু চমকিয়া উঠে; নিদ্রা-কালীন পদাদি সঙ্কোচিত করে, অত্যন্ত পিপাসা থাকে, ঘনশ্বাস বহে, উৎকাশী হয়, অতিসার হইয়া সবুজবর্ণ, ঈষৎ শুভ্রবর্ণ, অথবা জলবৎ মল নির্গত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক, এই রূপে তিন মাত্রার পর বার ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা দিবেক।

যদ্যপি হস্ত পদাদি সঙ্কোচনের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ইগ্নেশিয়া, পূর্ববৎ দিবেক।

যদ্যপি মাটি ফুলিয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রদাহ উপস্থিত হয় ও বদন রক্তবর্ণ, চর্ম উত্তপ্ত, হইয়া জ্বর বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট, একটি ক্ষুদ্র বটিকা দেড় তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া যদি মস্তিষ্কের কার্য রহিত হয়, অর্থাৎ যদ্যপি গাঢ় নিদ্রা, চক্ষুদ্বয়, অর্দ্ধ মুদ্রিত, অথবা গতি-শক্তিহীন হইয়া, চক্ষুর পুতলিকা অবরুদ্ধ হয়, সমস্ত শরীর শীতল হইয়া যায় এবং নীলবর্ণ হয়, নাড়ী প্রায় বোধ হয় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধপ্রায় হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—জিহ্বা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা শিশুর জিহ্বার উপর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবেক এবং পরেতে যে পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর উষ্ণ, নাড়ী বলবতী, এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত রূপে না চলে, তদবধি উক্ত পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি দন্ত নির্গত হইতে কষ্ট বোধ ও মাটি পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, স্ফীত, এবং যাতনা বিশিষ্ট হয়, ও শিশু দুর্বল ও বিরক্ত স্বভাবান্বিত হইলে, দন্ত উঠিবার বিশেষ সাহায্যকারী ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে এক দিবস মাত্র প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে দিবেক ।

যদ্যপি উদরস্ফীততা থাকে, জিহ্বা রলিন হয়, কিঞ্চিৎ জ্বর বোধ, অনিদ্রা, অথবা ঢুলানি, এবং দৌর্বল্য থাকে, শুষ্ক কাশী, কোষ্ঠবদ্ধতা, রক্তাবর্ণ, কঠিন গোলাকৃতি মল, নিঃসরণ হয়, স্নাত্তিতে অনিদ্রা এবং দিবসে ঝিমনি থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চক্ষিণ ঘণ্টা অন্তর দুই দিবস দিবেক ।

উক্ত কোন প্রকার ঔষধে কিঞ্চিৎ উপশম হইলে সর্বতো-
ভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্তে ।

ঔষধ—সকল, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা প্রত্যহ চক্ষিণ ঘণ্টা অন্তর
দিনেক, কিন্তু ইহা উক্ত কোন প্রকার ঔষধের শেষ সাতার চারি দিবস
পরে আরম্ভ করা কর্তব্য ।

শিশুর অঙ্গ টঙ্কার ।

নিদান—শিশুর শারীরিক অবস্থা অপেক্ষা মস্তক এবং
শিরা সহনীয় গুরুত্ব জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

পূর্ব লক্ষণ—এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে শিশু,
হস্ত পদাদি ও অঙ্গুলি সঙ্কোচিত করিতে থাকে, এবং চক্ষুর পুস্ত-
লিকা হঠাৎ বিস্ফারিত, বা সঙ্কোচিত হয়, অতএব এক দিকে
বিস্ফারিত অন্য দিকে সঙ্কোচিত ও চক্ষুঃ, স্থির বা ক্ষুদ্র দ্রুত-
গতি বিশিষ্ট, শ্বাসের গতি, অসমান, মুখ নীলবর্ণ, এবং পুনঃ
পুনঃ বর্ণের পরিবর্তন ইত্যাদি এই উপসর্গের পূর্বরূপ হইয়া
থাকে ।

লক্ষণ—এই রোগে আক্রান্ত হইলে শিশুর মুখমণ্ডল এবং
এক বা উভয় চক্ষুঃ সঙ্কোচিত, অথবা অর্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়া
অবশিষ্টাঙ্গ স্থিরভাবে থাকে, চক্ষুঃ, বিস্ফারিত হইয়া ইতস্ততঃ
স্থগিত, কখন রিস্তৃত ও কখন সঙ্কোচিত হয়, মুখ দিয়া কেণা
উঠে, করণয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, বদন, প্রাথমিকঃ রক্তবর্ণ হইয়া পরেতে
নীলবর্ণ দেখা যায়, হ্রাসাবস্থায় উক্ত লক্ষণ সকল অন্তর্হিত
হইয়া, নিদ্রাক্রম্য ও পরেতে অতিরিক্ত ঘর্ম হইলে জাগরিত
এবং সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি ভয় হইতে উৎপন্ন { প্রথমতঃ ওপিয়াম্, তাহার পর আবশ্যিক
হইয়া থাকে..... { হইলে হায়োসায়েনম্, একোনাইট্-বা
বেলাডোনা ।

বাহ্য আঘাত জন্য হইলে... { আর্গিকা, বা প্রয়োজন বশতঃ
সাইকিউটা, বা বেলাডোনা ।

পাকস্থলীর অম্লর জন্য হইলে... { ক্যামোমিলা, নক্স-বমিকা,
বেলাডোনা ।

অতিভোজন বা অপাচ্য দ্রব্য { ইপিক্যাকুয়ানা, নক্স-বমিকা,
তোজন জন্য হইলে..... { বা পল্লেসটিলা ।

যদ্যপি কৃমি দোষ জন্য হয় { সিনা, মকিউরিয়স্, বা সাইকিউট
তাহা হইলে..... {

ক্রোম্বাদি জন্য হইলে ক্যামোমিলা ।

মস্তিষ্কের নোষ জন্য হইলে বেলাডোনা ।

যদ্যপি উৎপত্তির কারণ স্থির করা না যায়... ..ইগ্লেশিয়া ।

উক্ত সকল ঔষধের মধ্যে যে কোন একটা ঔষধ লক্ষণ-
সুযায়ী এক একটা ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে অবস্থা বিবেচনায়,
এক, দুই, বা তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

বিশেষ লক্ষণসুযায়ী চিকিৎসা ।

হঠাৎ এই রোগ উপস্থিত হইলে যদ্যপি সমুদয় শরীর
কঠিন, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, বা দাঁতি লাগে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যাফর, আরকের শিশির যুগ্ম খুলিয়া সময়ে সময়ে ফণ
কালের জন্য শিশির নাড়িকায় ধরিলে, অথবা কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনির

সহিত এক ফোটা আরক একত্রিত করিয়া তাহার মধ্যে হইতে অত্যল্প পরিমাণে এক এক বার লইয়া শিশুর জিহ্বার উপর দিবেক ।

যদ্যপি দন্ত উঠিবার সময় অথবা অল্পত্ন এবং পেট বেদনা জন্য অথবা কোন প্রকারে বিরক্ত হওয়াতে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যদি অস্থিরতা, চেতন কালীন ঢুলানি, এক দিকের গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, ও অপর দিক পাণ্ডুবর্ণ হয়, অতিসার, অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়ন, অতিশয় পিপাসা, ঘনশ্বাস, জ্ঞান শূন্যতা, এবং মুষ্টি বদ্ধ করিয়া থাকা, ও হস্ত পদাদির সঙ্কোচন, লক্ষিত হয়, তাহা হইলে

ঔষধ—ক্যামোমিলা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার চতুর্থাংশ প্রথমতঃ এক বার রোগের আক্রমণ কালে দিবে, যদ্যপি তৎকালে নিবারিত হইয়া কিয়ৎকাল পরে পুনর্বার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রয়োজন বশতঃ উক্ত প্রস্তুত ঔষধের অপর একাংশ সেবন করাইবেক ।

যদ্যপি মস্তিষ্কের বিকার জন্য এই রোগ উপস্থিত হয়, এবং পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর উপসর্গ শান্তি না হইয়া পুনর্বার আক্রমণ করে, বিশেষতঃ যদি শিশু, নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে, চক্ষুর পুতলিকা অতিশয় বিস্ফারিত, শরীর কঠিন, ললাট এবং হস্তদ্বয় শুষ্ক হয়, এবং জ্বালা করে, বিশেষতঃ যদ্যপি আক্রমণ কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে শিশু, হাস্য করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি দন্ত উঠিবার সময়ে, এই রোগ উপস্থিত হয় ও শিশু, পাণ্ডুবর্ণ, ম্লান-স্বাভাবিত হয়, এবং হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রোদন এবং রোদনের পর-ক্ষণেই হাস্য করিতে থাকে,

হঠাৎ শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে, চীৎকার করে, বিশেষতঃ যদ্যপি আক্রমণকাল, প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে, অথবা এক দিবস অন্তর উপস্থিত হয় এবং তাহার পর জ্বর বোধ ও ঘৰ্ম হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ইয়েলিশিয়া, পূর্ব ৭।

যদ্যপি নাড়ীর অতি তীব্র গতি এবং জ্বর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—একোনাইট্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা দেড় তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি আক্রমণ কালে অথবা তাহার পরে বা পূর্বে অতিসার, বমন, আহ্বারে অনিচ্ছা, নিঃশ্বাসে কষ্ট এবং যদি অতি-ভোজন বা অপাচ্য দ্রব্য ভোজন জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা, দুই তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর এবং পরেতে তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

যদ্যপি অজীর্ণ দোষ জন্য এই রোগ উপস্থিত হয়, তুচ্ছ-দ্রব্য বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, হস্ত পদাদির সঙ্কোচন, মস্তক, পশ্চাৎ দিকে লুণ্ঠন, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা পূর্ববৎ।

শিশুর দ্বিতীয় বার দন্ত উঠিবার সময়ে যদ্যপি এই রোগ উপস্থিত হয় এবং যাহাদিগের কুমি-দোষ, অথবা শয্যায় প্রত্নাব করা রোগ থাকে, এবং রোগ উপস্থিত হইলে, সর্বদা কঠিন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, তৎপক্ষে ও বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরা লক্ষিত হইলে।

ঔষধ—সিনা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা দুই তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে আক্রমণ কালের পূর্বে দিয়া আক্রমণ কাল গত হইলে পুনর্বার ঐ পরিমাণে দিবেক।

যদ্যপি আক্রমণ কালের পূর্বে ও আক্রমণ কাল উপস্থিত সময়ে, এবং পরেতে পাকস্থলী, ক্ষীত এবং কঠিন দেখা যায়, শিশুর কফদায়ক উদ্ধার উঠে, লাল নির্গত হয়, গাত্র-ক্ষী আর্দ্র থাকিয়া জ্বর বোধ থাকে, এবং আক্রমণ কালের পরে শিশু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শ্রুতবৎ পুঁত হইয়া থাকে, তাহা হইলে।

ঔষধ—মর্কিউরিয়স্, উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী দিবেক।

শিশুর দন্ত উঠিবার সময় এই রোগ উপস্থিত হইয়া সর্বদা উত্তাপ বোধ হয়, পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিগে সঙ্কোচিত করে, তদনন্তর হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত চীৎকারের সহিত শয্যার উপর গড়াইতে থাকে, অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ করে, অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু এক বারে অত্যাঁপ মাত্র জলপান করে, অতিসার হইয়া অপক-ভুক্ত-দ্রব্য বিরেচিত হয়, এবং আহ্বারান্তে বমন হইলে।

ঔষধ—আসেনিকস্, সিনার ব্যবস্থার ন্যায় দিবেক।

যদ্যপি এই রোগ ভয় জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ও সামান্যতঃ কন্প, হস্ত পদাদি নিঃক্ষেপ, এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করা, রোদন, এবং অশ্রু অজ্ঞানতা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ওপিয়াম্, তিনটা ক্ষুদ্র বটিকা দুই তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে আক্রমণ কালের প্রারম্ভে এক বার এবং পরেতে এক বা দুই বটিকা অন্তর উক্ত পরিমাণে (উপসর্গের শাস্তি হওয়া, পর্য্যন্ত ক্রমশঃ) দিবেক।

যদ্যপি হঠাৎ ভয় জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া স্বতঃই মল মুত্র নিঃসারিত হয়, এবং কোন উজ্জ্বল পদার্থ দেখিবারাত্র, রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ট্র্যামোনিয়ম্, একটি ক্ষুদ্র বটিকা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর শিশুর জিহ্বার উপর দিবেক অথবা এই ঔষধের সহিত উক্ত প্রকারে সিকেল, উপর্যুপরি রূপে দিবেক ।

শিরঃশেথঃ (মস্তকে জলভার) ।

লক্ষণ—এই রোগ উপস্থিত হইবার প্রথমে পিত্ত বমন, শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে গলার শব্দ ইত্যাদি উপস্থিত হয়, এবং পরেতে জ্বর বোধ, অনিদ্রা, ইত্যন্তঃ বা পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাত, হুর্গন্ধ বিশিষ্ট বা শুষ্কবৎ মল নিঃসরণ, ঘনশ্বাস, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, আলোক বা শব্দ অসহ্য, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, উর্দ্ধ দিকে হস্ত নিঃক্ষেপ, মুখের চতুষ্পার্শ্বে পাণ্ডু বা নীলবর্ণিত্ব এবং মূর্ছা আরম্ভ হইয়া, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা হয় ।

চিকিৎসা ।

এই রোগ উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ যদ্যপি চর্ম উত্তপ্ত এবং শুষ্ক, নাড়ী দ্রুতগতি বিশিষ্টা, বিশেষতঃ রোগীর শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া যদ্যপি সবল বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, একটি ক্ষুদ্র বটিকা অর্দ্ধ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক বার মাত্র এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবেক ।

মস্তকে উত্তাপ, বদন রক্তবর্ণ, ঘাড়ের শির দপ্ দপ্ করা,

মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, শিরোলুঠন, আলোক অসহ্য, চক্ষুঃ রক্ত-
বর্ণ এবং উজ্জ্বল, চক্ষুর পুত্তলিকা বিস্ফারিত অথবা সংকোচিত,
প্রলাপ, জ্ঞান হীনতা, ও অত্যন্ত চীৎকার, দন্ত কড়মুড়ি, অজা-
নভঃ, মল মুত্র নিঃসরণ হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, একোনাইটের ব্যবস্থানুসারে দিবেক ।

যদ্যপি অত্যন্ত অঙ্গ টঙ্কার, জ্ঞান হীনতা, অথবা অস্ফুট
বাক্য কখন, বদন আরক্তবর্ণ, স্থির দৃষ্টি, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ পদার্থে
আচ্ছাদিত, বিস্ফারিত লোচন, শারীরিক উত্তাপ এবং শুষ্কতা,
পিপাসা, ও অতিসার থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হায়োসায়েমস্, পূর্ববৎ ।

(কিন্তু এই ঔষধ বেলাডোনার সহিত উপর্যুপরি রূপে
দিলে উপকার বোধ হয় ।)

পূর্বোক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগের পর যদ্যপি মস্তকে
অত্যন্ত উত্তাপ, অতিশয় পিপাসা, চক্ষুঃ কখন বিস্ফারিত ও
কখন মুদ্রিত থাকে, নিদ্রার সহিত হঠাৎ চমকিয়া উঠা, অথবা
নিয়ত নিদ্রালুতা, চৰ্ভ্বণের ন্যায় নিয়ত মাটি চালন, জিহ্বার
উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ পদার্থে আচ্ছাদিত, মল মুত্র রোধ, অথবা
মূত্র ত্যাগে অতিশয় কষ্ট বোধ, অতিশয় পিপাসা, চর্ম্ম শুষ্ক,
এবং অতিশয় উত্তপ্ত ঘনশ্বাস, ইত্যাদি লক্ষিত হইলে ।

ঔষধ—ব্রায়োনিয়া, একটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে এক, দুই, তিন,
বা চারি ঘণ্টা অন্তর ক্রমশঃ দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধে কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ হয়, কিন্তু
শিশুর মৃত্যু আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—হিলেবোরস্, প্রথমতঃ দুইটি করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা শিশুর
জিহ্বার উপর চারি ঘণ্টা অন্তর দিয়া কিছু উপশম বোধ হইলে, পরেতে
হয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি গাঢ় নিদ্রার সহিত নাসিকার শব্দ হয়, অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়ন, সম্পূর্ণ অলস, চেতন হইলে মাথা ঘোরা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ওপিয়ম্, তিনটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে পূর্বোক্ত ব্যবস্থানুসারে দিবেক ।

যদ্যপি যন্তিষ্ক শক্তিহীন হয় এবং অজ্ঞানতা, অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়ন, সমস্ত শরীর শীতল, হস্ত পদাদি নীলবর্ণ, নাড়ী দুর্বল, ক্ষীণা, এবং কদাচিৎ বোধ হয়, এতাদৃশ লক্ষিত হইলে ।

ঔষধ—জিঙ্কম্, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর (যে পর্য্যন্ত শরীরের উষ্ণাদি পুনর্ব্বার উপস্থিত না হয়) শিশুর জিহ্বার উপর দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত কোন ঔষধ লক্ষণানুযায়ী দিয়া উপসর্গের কিঞ্চিৎ লাঘব বোধ হয়, কিন্তু তাহার পর তদবস্থাতেই থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সকফর্, দুইটি পরিমাণে ক্ষুদ্র বটিকা ছয় ঘণ্টা অন্তর শিশুর জিহ্বার উপর দিবেক এবং প্রয়োজন বশতঃ লক্ষণানুযায়ী ঔষধ, ইহার সহিত উপর্য্যুপরি ভাবে দিবেক ।

এই রোগ প্রাচীন হইলে ।

ঔষধ—হিলেবোরস্, আর্সেনিকম্, বা সকফর্, ইহার অন্যতর একটা ঔষধের একটা ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিয়া শেষ মাত্রার এক সপ্তাহ পরে আবশ্যক হইলে দ্বিতীয়, বা তৃতীয়োক্ত ঔষধ পুনর্ব্বার উক্ত রূপে চালাইবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

এই রোগ উপস্থিত কালীন শিশুকে এবং ধাত্রীকে লঘু পথ্য দেওয়া কর্তব্য ।

শিশুর শ্বাস কাশ রোগ (অর্থাৎ হাঁপানি) ।

এই রোগে, শিশুর গলার ভিতর বায়ু-বাহক-প্রণালী সঙ্কোচিত হইয়া শ্বাসাবরোধের উপক্রম করে ।

লক্ষণ—শ্বাস উপস্থিত হইয়া গলার ভিতর সাঁই স্খুঁই শব্দ করে, এবং যদিও অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে বদন, এবং হস্ত পদাদির অগ্রভাগ ধূমলবর্ণ দেখা যায় ও অঙ্গ টঙ্কারের ন্যায় অস্পৃষ্ট, কর মধ্যে মুষ্টি বদ্ধ করে এবং পদাঙ্গুলি সঙ্কোচিত হয় । যদিও এই রোগের শীঘ্র দমন করা না হয়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যদ্যপি রাত্রিকালে শ্বাস রোধের ন্যায় কাশী উপস্থিত হয়, স্বরভঙ্গ, ঘনশ্বাস, কষ্টে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ, চর্শ্ব উষ্ণ এবং শুষ্ক, নাড়ী স্থলা, কঠিনা ও গীত্র গতি বিশিষ্টা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্ আটটি ক্ষুদ্র বটিকা বার তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে (রোগের সামান্যাবস্থায়,) তিন ঘণ্টা অন্তর এবং প্রবলাবস্থায় এক, বা অর্দ্ধ, ঘণ্টা অথবা পোনের মিনিট্ অন্তর ও দিবেক ।

যদ্যপি অপাচ্য দ্রব্য ভোজন জন্য বিরেকনের পরে এই

রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, অথবা বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা একত্রিত হইয়া ঘড় ঘড় শব্দ করে, শ্বাস রোধের উপক্রম বোধ হয়, বদন ধুমলবর্ণ এবং সমস্ত শরীর আড়ম্ব-প্রায় হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, তিনটি ক্ষুদ্র বটিকা তিন তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রথমতঃ পোনের মিনিট অন্তর তিন মাত্রা পর্য্যন্ত দিয়া, পরেতে ক্রমশঃ অধিক কাল বিলম্ব দিবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধের শেষ মাত্রার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রাপ্ত লক্ষণ সকলের কোন মতে হ্রাস না হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি আক্রমণ কালের পরেতে শীতল ঘর্ম্ম, বলের হ্রাস, অত্যন্ত যাতনা ইত্যাদি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকন্, ছয়টি ক্ষুদ্র বটিকা চারি তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে উপরোক্ত প্রকারে দিবেক ।

যদ্যপি শিশু কিছু বয়োধিক হয়, এবং গন্ধকের ধূম নাসিকা দ্বারা প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় কষ্ট প্রকাশ করে, বক্ষঃস্থল মধ্যে অত্যন্ত খেঁচনি বোধ হয়, গলা খুস্ খুস্ করে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—গ্লেসটিলা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

এই রোগ হঠাৎ উপস্থিত হইলে যদ্যপি শিশু, অত্যন্ত অস্থির হইয়া চীৎকার বা রোদন করে, এবং পঞ্জরের অধোভাগে টানিয়া ধরা বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজন হইলে ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিবেক ।

পথ্যব্যবস্থা ।

শিশুকে এবং ধাত্রীকে লঘু পথ্য করাইবে । অত্যন্ত শীতল বা উত্তপ্ত স্থানে, অথবা যে স্থানে হিম লাগিবার সম্ভব সেখানে, রাখিবে না ।

শৈশব পাল্য জ্বর ।

পূর্ব লক্ষণ—শৈশবব্যবস্থায় এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে বলহীনতা, বৈরক্তি, রাত্রিতে অস্থিরতা, ক্ষুধার অভাব, জিহ্বার মলিনতা, মুখে দুর্গন্ধ, বমনেচ্ছা, বা বমন, পিপাসা, চর্ম্মের কিঞ্চিৎ উষ্ণতা, মাথা ধরা, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা, উদর-ক্ষীততা, কোষ্ঠাবরোধ, অথবা অতিসার, এবং মূত্র, শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে ।

আক্রমণ কালিক প্রকাশিত লক্ষণ—কিয়ৎ কাল পরে উক্ত লক্ষণ সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তৎকালে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, নাড়ীর, তীব্র গতি, ভুক্ত-দ্রব্য বা পিত্ত বমন, পেট কষিয়া ধরা, কোষ্ঠ বদ্ধ, সময়ে সময়ে অতিসার, বৃথা মলত্যাগের বেগ, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, শ্লেষ্মা, এবং রক্ত মিশ্রিত বা কৃমি সংযুক্ত মল নিঃসরণ, হস্ত পদ সর্বদা শীতল, অবশিষ্টাঙ্গ অত্যন্ত উত্তাপান্বিত, মস্তক উত্তপ্ত এবং তার বিশিষ্ট হয়, রাত্রিতে জ্বর লক্ষণ উপস্থিত হইলে, শিশু অত্যন্ত অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ অঙ্গ নিঃক্ষেপ করিতে থাকে, ও দিবসে হইলে তৎপরিবর্তে অলস এবং বিমানি উপস্থিত হয়, জ্বরের কিঞ্চিৎ রিবাম কালে নামিকা, ওষ্ঠাধর, অথবা জিহ্বা খুঁটিতে থাকে এবং কাশী হয় ।

চিকিৎসা ।

যদি অতিভোজন বা অপাচ্য-দ্রব্য ভোজন জন্য এই রোগ উপস্থিত হয় এবং সন্ধ্যাকালের পূর্বে সর্ব শরীর, বিশেষতঃ বাহ্যিক অত্যন্ত উত্তপ্ত, অতিশয় অস্থিরতা, রাত্রিতে ঘর্ম, ঘনশ্বাস, জিহ্বা মলিন, বমনেচ্ছা, অথবা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া, আহারান্তে ভার বোধ, অতিশয় দৌর্বল্য, এবং অল্পত্ব ইত্যাদি লক্ষিত হইলে ।

ঔষধ—ইপিকাকুয়ানা, ছয়টি ক্ষুদ্র বটিকা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে রোগের উপক্রম কালে ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক এবং স্পষ্ট প্রকাশিত হইলে জ্বর বিরাম কালে চারি ঘণ্টা অন্তর ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের চক্ৰবর্ষ ঘণ্টা মধ্যে রোগের লক্ষণ সকল পরিবর্তিত না হয় অথবা উদরভঙ্গ হইয়া পিত্ত মিশ্রিত, ক্রমঃ শ্বেতবর্ণ, দুর্গন্ধ মল, নির্গত হয় এবং পেট কমিয়া ধরে, প্রস্রাব কটু, ও সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে জ্বর বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পলেসটিলা, ছয়টি ক্ষুদ্র বটিকা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের শেষ মাত্রার বার ঘণ্টা পরে বমন বা বমনেচ্ছা নিরস্ত হইয়া যায়, কিন্তু উদর ভঙ্গ উপসর্গ থাকিয়া, উদর স্ফীত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে দিবেক ।

যদ্যপি রোগী জ্বলাঙ্গ হয় অথবা অতিপ্রবল জ্বরের সহিত অত্যন্ত পিপাসা, চর্ম শুষ্ক, নাড়ী জ্বলা, ও তীব্র গতি বিশিষ্টা, এবং মূত্রের অল্পতা হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—একোনাইট্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে প্রয়োজনবশতঃ চারি ঘণ্টা অন্তর দিবেক। এই ঔষধ লক্ষণায়ুযায়ী অন্য কোন ঔষধের সহিত মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করান যাইতে পারে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় যদ্যপি কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ মল-ত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়, অথবা অত্যম্প পরিমাণে শ্লেষ্মা বা কিঞ্চিৎ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল-বৎ মল নির্গত হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি শিশু অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া উঠে, জিহ্বার পার্শ্ব রক্তবর্ণ, ক্ষুধা শূন্যতা, ভোজনে অনিচ্ছা, এবং রাত্রিতে কিয়ৎ পরিমাণে জ্বর বোধ হইয়া প্রাতঃকালে স্পষ্ট জ্বর প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, পূর্ষ লক্ষণের প্রবলতা কালীন দুইটা করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে দিবেক, এবং জ্বর, স্পষ্ট প্রকাশিত হইলে একটা ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া (জ্বর বিরাম কালে) ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক।

উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর যদ্যপি জিহ্বা রক্তবর্ণ এবং খরস্পর্শ বা গীতবর্ণ পদার্থে আচ্ছাদিত হয়, গাঢ়-নিদ্রা, বা তন্দ্রা, নিদ্রাকালীন চম্কিয়া উঠা, শরীরের নানা স্থানে তাপ বোধ, মস্তক ভারি, নাড়ী দ্রুত গামিনী, পিত্ত বমন, কোষ্ঠাবরোধ অথবা অত্যন্ত বেগের পর, পুনঃ পুনঃ অত্যম্প পরিমাণে, ঈষৎ সবুজবর্ণ মল, নিঃসরণ এবং মুত্র, ঘোরাল হরিদ্রাবর্ণ হয়, তাহা হইলে।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, ছয়টা ক্ষুদ্র বটিকা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে জ্বর বিরাম কালে এবং জ্বর কালীন তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর দিবে।

যদ্যপি উক্ত ঔষধ প্রয়োগের চক্ষিশ ঘণ্টা পরেতেও মস্তকের উষ্ণতা, নাড়ীর তীব্র গতি, জিহ্বা মলিন, বা শ্বেতবর্ণ, অথবা মধ্যস্থলে গীতবর্ণ, এবং পার্শ্বে রক্তবর্ণ হয়, পিপাসা, বমন, বা বমনেচ্ছা, উদরে অত্যন্ত উত্তাপ, নিঃশ্বাস প্রাশ্বাসে কষ্ট বোধ থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, পূর্ববৎ ।

পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বারা উপরোক্ত লক্ষণ সকলের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, যদ্যপি জিহ্বার মলিনতা, বমন, বা বমনেচ্ছা, ও পিপাসা, অথচ পানীয় দ্রব্যে অশ্রদ্ধা, ঘোরাল বা শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব, কোষ্ঠাবরোধ, অথবা অত্যন্ত বেগের পর আম বা রক্ত মিশ্রিত মল, পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—মর্কি উরিয়স্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা অর্দ্ধ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

যদ্যপি এই প্রকার জ্বরের সহিত ক্রমিদোষ থাকে, অর্থাৎ নাক্ খোঁচা, নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করা ও চম্কিয়া উঠা, চক্ষুর পুত্তলিকা বিস্ফারিত, পেট বেদনা, অতিসার, অথবা পিত্ত মিশ্রিত পাতলা মলের সহিত ক্রমি নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিনা, দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবেক ।

পূর্বোক্ত কোন প্রকার ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগের পর উপসর্গের কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি হইলে, সর্বতোভাবে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত, এবং বিশেষতঃ যদ্যপি জ্বরের উত্তাপ, সন্ধ্যার সময়, প্রাতঃকালে, বা সমস্ত দিবসে, বোধ হয়, মুখ, পাণ্ডুবর্ণ, কখন কখন রক্তবর্ণ হয়, চর্ম্মের শুষ্কতা, কণ্ঠের সহিত ঘনশ্বাস, হৃৎকম্প, চরণদ্বয়ের অগ্রভাগে অবসন্নতা, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ

প্রস্রাব, শুষ্ক, কঠিন, বা আম মিশ্রিত তরল মল, নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সলফর, রোগ উপস্থিতির পূর্বকালে বা প্রবলতা সময়ে লক্ষণানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে একটা ক্ষুদ্র বটিকা অর্দ্ধ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর দিবেক । অন্য ঔষধ, প্রয়োগের পর সর্বতোভাবে আরোগ্য করিতে হইলে, দুইটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবেক, এবং প্রয়োজন হইলে তাহার চারি দিবস পরে পুনর্ব্বার ঐ রূপে চালাইবে ।

এই রোগ বহুকালস্থায়ী বা অশুভ জনক হইলে তাহার চিকিৎসা ।

যদ্যপি এই রোগ উপস্থিত হইয়া শিশুর, অতিশয় অবসন্নতা, এবং ক্ষুধাহীনতা, বা উত্তম দ্রব্যে অত্যন্ত ইচ্ছা দেখা যায়, বদন পাণ্ডুবর্ণ, এবং অঙ্গ চালিত হইলে হাঁপানি উপস্থিত হয়, প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময়ে জ্বরের উত্থাপ বোধ, বিশেষতঃ যদি ক্রমিদোষ জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সাইলিশিয়া, প্রথমতঃ একটা ক্ষুদ্র বটিকা অর্দ্ধ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চারি দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন বার করিয়া দিয়া, শেষ মাত্রার দুই দিবস পরে, সিনা, উক্ত প্রকারে দিবেক ।

উক্ত ঔষধে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইলে অথবা রোগের প্রারম্ভিকালে বিশেষ উপকারক ।

ঔষধ—সলফর, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অত্যন্ত শক্তি বিহীন হইয়া শিশু, নিয়ত হেলান দিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, এবং চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত থাকে, জিহ্বা উষ্ণ, অতিশয় পিপাসা, কিন্তু পানে

অত্যম্পা ইচ্ছা, আঠাল ঘর্ম, হস্ত পদাদি শীতল, পাকস্থলীর বিকৃতি, উদর কঠিন, মুখের ভিতর ক্ষত, অম্পা নিদ্রা, নাড়ী কখন বোধ হয়, কখন হয় না, এবং রোগী বিরক্ত স্বভাবাবস্থিত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—আসেনিকম্, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিন বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি জিহ্বা শুষ্ক এবং কটাবর্ণ, বা কোমলস্পর্শ, ও বাহুদ্বয় কম্পিত হয়, অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকে, সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, নাড়ী ক্ষীণা, এবং বেগবতী, অত্যন্ত অস্থিরতা ও পাতলা মল নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—রস-রেডিক্যান্স্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি মস্তকের এবং ঘাড়ের শিরা সকল উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত দপ্ দপ্ করে, গাঢ় নিদ্রা, হস্তদ্বয় শীতল, বদন, পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল, ক্ষীণা বেগবতী নাড়ী, এবং উদর, উত্তপ্ত ও কঠিন, বোধ হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া তিন তিন ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

পূর্বোক্ত লক্ষণানুযায়ী উক্ত ঔষধ প্রয়োগের পর যদ্যপি গাঢ় দীর্ঘ-নিদ্রা, দন্ত ঘর্ষণ, মধ্যে মধ্যে অনিদ্রা, এবং নাড়ী, কখন বোধ হয়, কখন হয় না, এমনত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ল্যাক্সিসন্স্, তিনটা ক্ষুদ্র বটিকা দুই তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া এক এক দিবস অন্তর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে দিবেক ।

সহকারী উপায় ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনিদ্রা এবং অস্থিরতা, ও চর্ম্মের উত্তাপ, শীঘ্র দূর না হয়, তাহা হইলে, ঈষদুষ্ণ জলে ফ্লানেল বা তাদৃশ কোন বস্ত্র বা স্পঞ্জ নামক দ্রব্য, ভিজাইয়া তদ্বারা শিশুর অঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দিবে ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

এই রোগে পথ্য ব্যবস্থার প্রতি যত্ন রাখা নিতান্ত প্রয়োজন । রোগের অত্যন্ত প্রবলতা সময়ে শিশুর আহারে সর্ব্বতোভাবে অনিচ্ছা থাকে, তখন এবং রোগ শান্তির উপক্রম সময়ে, যখন ক্ষুধার উদ্দীপন হইতে থাকে, তৎকালে ও কোনমতে প্রলোভন দ্রব্য দ্বারা শিশুর পাকস্থলীকে ভারান্বিত করিবে না । পাতলা যবের মণ্ড, অন্নের মণ্ড, আরোরুট, প্রভৃতি লঘু-পাক দ্রব্য মাত্র পথ্য দিবে, কোন প্রকার দৃঢ় দ্রব্য, বিশেষতঃ মৎস্য মাংসাদি কদাচই দিবে না । এই রোগে কখন কখন অতিরিক্ত ক্ষুধা হইয়া থাকে, তৎকালেও কোনমতে প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অন্যথা করিবে না । রোগ, বহুকালস্থায়ী হইলে, বায়ু পরিবর্তন করান বিশেষ উপকারক ।

শিশুর ক্ষয় রোগ ।

নিদান—এই রোগ শিশুর শারীরিক স্বভাববশতঃ, দন্ত উঠিবার সময়ে বা অতিরিক্ত স্তন্যপান, বা অপাচ্য দ্রব্য ভোজন করানতে, অথবা ক্রমি দোষ জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

যখন এই রোগ স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হয়, তৎকালে এবং বিশেষতঃ যদ্যপি অতিক্ষুধা, অতিসার, বা অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, পাণ্ডুবর্ণত্ব, চক্ষুঃ বসিয়া যায়, কুঁচকি এবং বগলের গুঠলি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সত্কর, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে দশ দিবস পর্য্যন্ত দিবে, তাহার শেষ মাত্রার পাঁচ দিবস পরে, লক্ষণানুসারে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি পূর্বোক্ত ঔষধ আট দিবস পর্য্যন্ত দিয়া কোন বিশেষ উপকার বোধ না হয়, এবং অত্যন্ত ক্ষীণতা, অতিক্ষুধা, অতিশয় দৌর্বল্য, চর্ম্মের শিথিলতা, ও শুষ্কতা, পাকের ন্যায় মল, নিঃসরণ হয়, মধ্যান্ত্র-নিবিষ্ট গুঠলি বৃদ্ধি এবং কঠিন হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যালেকেরিয়া, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা সত্করের ব্যবস্থার ন্যায় দিবেক ।

যদ্যপি শিশু, পুনঃ পুনঃ চীৎকার করে, উপরের দিকে, পদদ্বয় টানিতে থাকে, পেট ফাঁপিয়া কঠিন হইয়া থাকে, অত্যন্ত অস্থিরতা, এবং জ্বর বোধ, ও ঘাসের ন্যায় সবুজবর্ণ, বা অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, ফেণা বিশিষ্ট, পচা গন্ধ যুক্ত, মল নিঃসৃত হয়, পিত্ত বমন, পিপাসা, ক্ষুধা হীনতাদি থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ক্যামোমিলা, তিনটি ক্ষুদ্র বটিকা তিন তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রতি দিবস পঁতন বার করিয়া দিবেক ।

যদ্যপি অত্যন্ত অস্থিরতা, ক্ষুধা এবং পিপাসা শূন্যতা, অথবা অতিশয় ক্ষুধা থাকে এবং উদারের সহিত অল্প জল

উঠে, ভুক্ত-দ্রব্য বমন হইয়া উঠিবার উপক্রম হয়, পুনঃ পুনঃ জলবৎ পিচ্ছিল পিত্ত মিশ্রিত, ঈষৎ সবুজ বা শ্বেতবর্ণ মল নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—পরেসটিলা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি অতিমার অপেক্ষা বমন প্রবল হয়, এবং বমন হইয়া, উদর হইতে ঈষৎ সবুজবর্ণ জল উঠে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—ইপিক্যাকুয়ানা, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি কোষ্ঠাবরোধ এবং অতিমার উপাধু্যপরি রূপে হয়, ক্ষুধা হীনতা, বমন, পেট কাঁপা, অল্পত্ব, অত্যন্ত দৌর্বল্য, মুখের ভিতর ঘা দেখা যায়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—নক্স-বমিকা, প্রথমতঃ পূর্ববৎ দিয়া তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ না হইলে, ত্রায়োনিয়া, একটি ক্ষুদ্র বটিকা পরিমাণে প্রত্যেক ১২ ঘণ্টা অন্তর দিবেক ।

চর্ম শুষ্ক, চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট, জলপান করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু এক বারে অত্যল্প পরিমাণে পান করা, রাত্রিতে অতিশয় অস্থিরতা, অনিদ্রা, পেট কামড়ান, রাত্রিতে ঘর্ম, অতিশয় দুর্বলতা, ঈষৎ সবুজ, কটা, বা কৃষ্ণবর্ণ, অথবা অপক্ব-দ্রব্য মিশ্রিত, মল, নির্গত হইলে ।

ঔষধ—আর্সেনিকম্, একটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া, চারি দিবস পর্য্যন্ত রাত্রি এবং প্রাতঃকালে দিয়া শেষ মাত্রার দুই দিবস পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি ঘাড়ের উপরের গুঠলি বৃদ্ধি হয়, এবং তলপেটের গুঠলি সকল কঠিন হইয়া ফুলিয়া উঠে, শিশু পুনঃ পুনঃ নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে, অত্যন্ত অলস, আমোদ উৎসাহ ইত্যাদিতে অনিচ্ছা থাকুক, আশায়, অথবা পাতলা মলের সহিত ক্রমি নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বারায়্‌টা, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে, এবং সন্ধ্যাকালে দিয়া, শেষ মাত্রার চারি দিবস পরে আবশ্যক হইলে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি উদর কষিয়া ধরিয়া কঠিন হইয়া থাকে ও হস্ত পদাদি বা এক চরণ মাত্র কখন কখন শীতল হয়, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতিসার হইয়া অপক্ক-ভুক্ত-দ্রব্য মিশ্রিত জলবৎ তরল মল, নির্গত হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—কোনিয়ম্, পূর্ববৎ ।

যদ্যপি শিশু নিতান্ত অবাধ্য হয় এবং রাত্রিতে কাশীর সহিত গলার ভিতর গ্লেম্মা জড়াইয়া ঘড় ঘড় শব্দ হয়, ঘাড়ের গুঠালি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—বেলাডোনা, একটা ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া চারি দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে দিয়া শেষ মাত্রার দুই দিবস পরে প্রয়োজন হইলে পুনর্বার ঐ রূপে চালাইবেক ।

যদ্যপি শিশু, অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায় এবং অতিক্ষুধা, রাত্রিতে অতিসার হইয়া, পুনঃ পুনঃ শ্বেতবর্ণ, (চাউলের মণ্ডের ন্যায়) অথবা অপক্ক-ভুক্ত-দ্রব্য মিশ্রিত মল নির্গত হয়, অত্যন্ত দৌর্বল্য, অম্পা নিদ্রা, এবং রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ।

ঔষধ—চায়না, দুইটি ক্ষুদ্র বটিকা এক তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে সেবন করাইবে। এবং কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে পাঁচ দিবস পরে পুনর্বার উক্তনিয়মামুসারে দিবে ।

যদ্যপি ক্রিমিদোষ লক্ষিত হয় অথবা রাত্রিতে শিশু শয্যায় প্রস্রাব ত্যাগ করে ও অসম্ভব ক্ষুধা থাকে, তাহা হইলে ।

ঔষধ—সিনা, পূর্ববৎ ।

অত্যন্ত দৌর্বল্য, অলস, সদত শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা থাকিলে এবং অতিসার হইয়া রক্ত মিশ্রিত বা পিচ্ছিল মল, নিঃসরণ হইলে।

ঔষধ—রস-টক্কিকোডেগুন, পূর্ববৎ।

পথা ব্যবস্থা।

যখন এই রোগ দুগ্ধপোষ্য শিশুর হয়; তৎকালে ধাত্রী পরিবর্তন করিয়া অন্য কোন সুস্থকায়া প্রসূতীর স্তন্যপান করা-ইবে। অথবা গর্দভের বা ছাগলের দুগ্ধ বা কখন কখন অত্যাঙ্গুর পরিমাণে পাতলা মাংসের ক্কাথ (শরীর পোষণের নিমিত্ত) দিবে। যদিপি শিশু, স্তন্যপান ত্যাগ করিয়া, অন্য কোন প্রকার অন্নাদি ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে এবং ক্ষয় রোগে অধিক দিন আক্রান্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আহারের পরিমাণের অঙ্গুতা এবং কষ্ট-পাচ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করাইলে অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করিবে। যদিপি শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে (দুগ্ধ বিধেয় হইলে,) গাভী বা গর্দভের দুগ্ধ তিন ভাগ এবং জল এক ভাগ একত্রিত করিয়া সদৃশ ব্যবস্থার নিয়মানুসারে জাল দিয়া দেওয়া যাইতে পারে, পরিষ্কৃত বায়ু সেবন এবং নিয়মিত ব্যায়াম এই রোগে বিশেষ উপকারী।

এই পুস্তকে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইল তাহাদিগের বিশেষ গুণ।



অরম্-মেটালিকম্।

প্রতিষেধক ও দোষহ্ন ।—বেলাডোনা, চায়না, কুপ্রম্,
মর্কিউরিয়স্।

পুনঃ পুনঃ পারা ব্যবহার করাতে যে সকল রোগ উৎপন্ন
হয়, হাড়ের ভিতরের রোগ, অত্যন্ত প্রদাহ বিশিষ্ট, শিরা বা
অস্থি সম্বন্ধীয় যে সকল রোগ পারা ব্যবহার করাতে উপস্থিত
হইয়া থাকে, জরায়ু যন্ত্রের রোগ, স্মৃতিকার পীড়া, চক্ষুঃ, কর্ণ,
বিশেষতঃ অস্থি মধ্যে গ্লেয়াজ রোগ, ছৎপিণ্ডের এবং রক্ত
পরিচালনের বিকৃতি, বক্ষঃস্থলের শোথঃ ইত্যাদি, রোগেতে এই
ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মস্তকের শীতলতা, বদনের এক দিকে স্ফীততা, প্রাতঃ-
কালে অধিক ঘর্ষ, হস্ত পদাদির অগ্রভাগ শীতল, বদন উত্তপ্ত,
সমুদয় শরীরে শীতল বোধ, শয়ন কালীন কম্প, চোয়ালের
উপরিভাগের অস্থির ও লালটাস্থির স্ফীততা, নাসিকাতে হর্গন্ধ
বোধ, কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়, দৃষ্টিতে দৃষ্ট-পদার্থের
উপর রেখা অঙ্কিত বোধ দৃষ্টি করিলে অগ্নিশিখা বা ক্লববর্ণ
বোধ হয়, অঙ্গুলির হর্বলতা, কোন প্রকার চিন্তা করিতে
হইলে, মস্তিষ্কের বিকৃতি উপস্থিত হয়, রোদনে ইচ্ছা, জীবন

আশায় নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, কুস্বপ্ন দর্শন, নিদ্রিতাবস্থায় বাক্য কথন, নামিকার অস্থিতে ঘা, নামিকা ফোলা, কর্ণের ভিতর ঘা হইয়া দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গত হয়, মাটিতে ঘা, দন্ত শিথিল, অঙ্গুলির গ্রন্থি সকলে বেদনা বোধ, আহারে বিশেষতঃ, মৎস্য মাংসাদিতে অনিচ্ছা, অতিরিক্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা, পেটের এক স্থলে গদির ন্যায় ফুলিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে অল্প-রক্তির পীড়া উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে অতিসার, মূত্রাবরোধ, দধির ন্যায়, ঈষৎ শুভ্রবর্ণ বা পিচ্ছিল পদার্থ মিশ্রিত প্রস্রাব হয়, ইত্যাদি উপসর্গে এই ঔষধ উপকার জনক।

আর্গিকা।

প্রতিষেধক ও দোষহ্ন।—কপূর, ইণ্ডেশিয়া, ইপিক্যাকুয়ানা, বেরাটুম্।

কোন প্রকার বাহ্য আঘাত জন্য যে বেদনা উপস্থিত হয়, অথবা রক্ত জমে, চর্ম্মের উপর স্থান বিশেষে ফুলিয়া রক্তবর্ণত্ব, বাহ্য আঘাত জন্য দাঁতি লাগা, স্থান বিশেষ হইতে রক্ত নির্গত হওয়া, প্রদাহ জন্য শারীরিক কোন স্থানের শক্তিহীনতা, ফোড়া ইত্যাদি, হুলবিশিষ্ট কীটাদির দংশন, রক্ত-বমন, বা কাশীর সহিত রক্ত উঠা, স্ত্রীলোকের স্তন, এবং স্তনের অগ্র-ভাগের ক্ষীততা, প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক। শরীরের অধোভাগ শীতল, এবং উর্দ্ধভাগ উত্তপ্ত, মস্তক চুল্কায, শরীরের মধ্যে শীতল জল সেচনের ন্যায় শীত বোধ হয়, রাত্রিতে অতিশয় পিপাসার সহিত কম্প, চর্ম্মের উপর, প্রথমতঃ রক্তবর্ণ চিহ্ন উদ্ভিত হইয়া পরেতে পীতবর্ণ হয়, ঘাড়ের

এবং চোয়ালের নীচের গুঠলি ফুলে, এক দিকের গণ্ডদেশ ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়, পেট ফুলে, হস্তের শিরা সকলের স্ফীততা, মাটিতে এবং ওষ্ঠেতে অত্যন্ত যাতনা, ভ্রমণ করিবার সগয় বক্ষঃস্থলে এবং পার্শ্বে বেদনা বোধ, আহার করিতে বা শরীর চালিত করিবার সময়, মস্তকে অত্যন্ত যাতনা বোধ, পাকস্থলীতে বেদনা, বক্ষঃস্থল হইতে স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত বেদনা ।

দন্ত শিথিল, হঠাৎ বিনাকারণে মুচ্ছা, অঙ্গুলি সকল ধারণ-শক্তি বিহীন, গমনকালীন জানু, শক্তিহীন হয়, চক্ষুঃ বহির্নিগত এবং অর্দ্ধ মুদ্রিত, চক্ষুতে ঘোর দর্শন, কর্ণের ভিতর ভৌ ভৌ শব্দ বোধ, নীচের চোয়াল শক্তিহীন হইয়া ঝুলিয়া পড়ে, মাটি আঁটিয়া ধরে, মুখ দিয়া তিক্ত জল উঠা, আহারে অনিচ্ছা, পাকস্থলীর দুর্বলতা, রক্ত মিশ্রিত ভুক্ত-দ্রব্য বমন, দলা দলা রক্ত বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, ঈষৎ কটাবর্ণ প্রস্রাব বা প্রস্রাবের পরিবর্তে রক্তপ্রস্রাব, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নিঃশ্বাস প্রস্রাসে কষ্ট বোধ, ঘনশ্বাস, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত ভার বোধ, শিশুর রোদনের পর কাশী, কাশ উঠিবার জন্য রুখা চেঁচা, শুষ্ক, অগ্নি, কাশী, নিদ্রিত সময়ে কাশী । প্রাতঃকালে মুখ দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিগত হয়, মুখ অতিশয় শুষ্ক, ওষ্ঠাধর স্ফীত, মাটিতে বেদনা হইয়া দন্ত দীর্ঘ বোধ, জিহ্বা শুষ্ক বা কখন কখন রক্তবর্ণ, গলার ভিতর জ্বালা বোধ অথবা তিক্ত গ্লেঝা একত্রিত হওয়া, নাসিকা দ্বার দিয়া অতিরিক্ত রক্তপ্রস্রাব, নাসিকার স্ফীততা, নাসিকা রক্তের ভিতর শুষ্কতা এবং উত্তাপ বোধ । চক্ষুর ভিতর যাতনা, চক্ষুঃ ফুলিয়া লাল বর্ণ বা ঈষৎ নীল বর্ণ হয়, চক্ষুর পাতা ফুলা দেখা যায়, ইত্যাদি উপসর্গে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

আর্সেনিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয়।—চায়না, ফেরম্, হেপার, নক্স-বমিকা ।

শারীরিক শিরা সকলের শক্তির অস্পৃশ্যতা হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয়, তজ্জন্য বহুবিধ তরুণ বা প্রাচীন রোগে, যাহাতে শরীরের হানি করে, তাদৃশ অবস্থায় দেওয়া যায়, এবং চর্মরোগ, পচা, গলা ঘা, ফোড়া, গুঠলির ঘা, প্রভৃতিতে ব্যবস্থা করা যায় । অপচি ভয়ানক পিত্ত জ্বর, যাহাতে ক্রমশঃ শরীরকে ক্ষীণ করে তাদৃশ জ্বরে, এবং পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, ফুস্ ফুস্ যন্ত্র, প্রভৃতির ক্ষীণতা, বাহ্য শোথঃ, জরায়ু সম্বন্ধীয় যন্ত্র ঘটিত বিকৃতি, মস্তিষ্কের, বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের প্রাচীন রোগ সকল, বহুকাল স্থায়ী শারীরিক দৌর্বল্য, এবং কুইনাইন্, বা আয়োডাইন্, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করাতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, ওলাউঠা, অতিসার, বিকার-জ্বর, মূত্ৰ জ্বর, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক । আহারে অনিচ্ছা, অত্যন্ত পিপাসা সত্ত্বে অত্যন্ত পরিমাণে এক বারে জল পানে শক্তি, ভুক্ত-দ্রব্য বমন, উগদার, আহারের পর রোগী বসিতে অশক্তি হয়, বমনেচ্ছা, রাত্রিতে হিষ্কা, পাকস্থলী হইতে অল্প পদার্থ উঠা, শীতল জলে বা অল্পে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিঞ্চিৎ আহার করিলে বমন হয়, পাক স্থলীতে উত্তাপ এবং জ্বালা বোধ, অত্যন্ত বেগের সহিত জলবৎ অতিসার, ক্ষীণতা, মূত্রাবরোধ, বা জ্বালার সহিত, রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব নিঃসরণ, অন্ত্র সকল গ্রন্থির ন্যায় একত্র হওয়া, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ মলের সহিত অপক-ভুক্ত-দ্রব্য নির্গত হয়, শীত বোধ, শরীরের নানা স্থানে

শোথঃ জন্য ফুলিয়া সেই সকল স্থানের ভিতর জ্বালা বোধ, দুর্বল-কারী ঘর্ম, সর্ব শরীরে কম্প, নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম, নাভির চতুষ্পার্শ্বে ঘা, চর্মের শুষ্কতা, নখ, ঈষৎ নীলবর্ণ, জ্বালা বিশিষ্ট ঘা, রাত্রিতে সর্ব শরীরে জ্বালা বোধ, মস্তক, উদর, চরণ, ফুলা, বদনের উপর ঘা, শিরা ফুলা । নাড়ী, বৃদ্ধগামিনী, অসমান গতি বিশিষ্টা, অত্যন্ত ক্ষীণা, রাত্রিতে অস্থিরতা, মস্তক দপ্ দপ্ করে, সম্পূর্ণ রূপে শক্তিহীনতা, রাত্রিতে কাশী, এবং তজ্জন্য শ্বাসাবরোধ, অনিদ্রা, ঢুলানি, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, জিহ্বাতে তিস্তাস্বাদন, চরণদ্বয়ে অত্যন্ত শ্রম বোধ । নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, রক্ত মিশ্রিত স্বেদা উঠা, গলার ভিতর জ্বালা বোধ, শয়ন করিবামাত্র শুষ্ক কাশী, গলায় গ্লেয় জড়াইয়া থাকা, ফুস্ ফুস্ যন্ত্রের শক্তিহীনতা ।

যে সকল জ্বর, সূর্য উদয় বা অস্তকালীন অথবা চল্লিশ ঘণ্টা বা ৭০ ঘণ্টা অন্তর নিয়মিত রূপে আক্রমণ করে, এক-জ্বরীতে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া রোগীকে শক্তিহীন করে, এবং জ্বর কালীন রোগীর অজানতঃ মল নির্গত হয় । হস্ত পদাদির অগ্রভাগে, পাকস্থলীতে, উদর মধ্যে, মস্তকে, বা শরীরের অন্যান্য অংশে, জ্বালাবৎ অসহ্য যাতনা বোধ, প্রাতঃকালে বা রাত্রিতে শয়ন সময়ে যাতনার বৃদ্ধি, আহ্বার করিলে মস্তকে যাতনা বৃদ্ধি, চক্ষুর জ্বালা, জাম্বুর সংযোগ স্থানে জ্বালাবৎ যাতনা বোধ, মাজা হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত টানিয়া ধরার ন্যায় যাতনা । মুখ অত্যন্ত শুষ্ক এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, মুখে এবং গলার ভিতর ঈষৎ সবুজ বা ঈষৎ কটাবর্ণ গ্লেয় একত্র হয়, গলা, শুষ্ক, উত্তপ্ত, ও প্রদাহ বিশিষ্ট, মাটি ফুলা, এবং কর-স্পর্শ মাত্র মাটি দিয়া রক্ত নির্গত হয়, দন্ত সকল

শিথিল, নাসিকা দিয়া জ্বালার সহিত, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষারবৎ পাতলা, জল নির্গত হয়, নাসিকার ভিতর শুষ্কতা বোধ ।

চক্ষুঃ দিয়া জলস্রাব হয়, এবং ঘোর দেখায়, চক্ষুর শ্বেত ভাগ পীতবর্ণ, চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ ভাগে ঘা, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়, চক্ষুর পাতা শ্লেষ্মা দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, চক্ষুঃ দিয়া ক্ষারবৎ জল নির্গত হয়, এবং সেই জল যে স্থানে পতিত হয় শরীরের সেই স্থানে বেদনা হয় । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের পূর্বে রজোনির্গত হওয়া এবং রজোদর্শন কালীন অতিরিক্ত পরিমাণে শ্বেত-প্রদর দেখা যায় ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

ইউক্লেসিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষহ্ন ।—কপূর, পল্‌সেটিলা ।

এই ঔষধ, চক্ষুর, এবং চক্ষুর পাতায়, নাসিকায়, গলায়, বায়ু নির্গমনের পথের পীড়ায় এবং যান্ত্রিক শিরার উপর বিশেষ অধিকার রাখে । চক্ষুর, চক্ষুর পাতায়, প্রদাহ এবং ঘা, নাসিকা রক্তের ভিতর অত্যন্ত উত্তাপ ও অতিরিক্ত, জল স্রাব, প্রাচীন ঘা হইতে জলবৎ পদার্থ নিঃসরণ, অগ্নিত্ব, কাশী, এবং যে কাশীতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উঠে, তৎপক্ষে বিশেষ উপকারী ।

চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ-অংশ ফুলিয়া ঘা হয়, চক্ষুর পাতায় প্রদাহ বিশিষ্ট ঘা হইয়া তাহার সহিত মাথাধরা থাকে, উভয় চক্ষুঃ ফোলা ও অত্যন্ত বাতনা, চক্ষুঃ দিয়া ক্ষারবৎ ঈষৎ জল নির্গত হয়, এবং তৎকালে নাসিকাদ্বারা দিয়াও তাদৃশ জল নির্গত হয়, বা উক্ত প্রকার জলের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, চক্ষুর

পাতা বৃদ্ধি হয়, ও আঁটিয়া থাকে, চক্ষুঃ, নাসিকা, এবং মাটি দিয়া রক্তস্রাব হয় । নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, ও কাশী হইয়া শ্বাস রোধ করে । শরীর স্বভাবতঃ শীতল, যা হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত রস নির্গত হয়, অঙ্গুলির গ্রন্থি সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠে, বদনের চর্মে উত্তাপ হইয়া রক্তবর্ণ হয়, বদনের চর্মে উত্তাপ কালীন, এমত কষা বোধ হয়, যে বদন চালিত করিলে বদনের চর্ম ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় কষ্ট বোধ হয় ।

চক্ষুতে আলোক অসহ এবং চক্ষুর উপর ভার বোধ, মস্তকের রক্ত পরিচালনের নিয়মিত গতি ভঙ্গ, নিদ্রা হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠা, স্মরণ-শক্তি বিহীনতা, কর্ম বিশেষে মনোযোগের বিচ্ছিন্নতা, অঙ্গুলি সকলের শক্তিহীনতা । শারীরিক বা মানসিক ব্যায়ামে অনিচ্ছা ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

ইণ্ডেশিয়া ।

প্রতিবেধক ও দোষহ্ন ।—আর্গিকা, কর্পূর, ক্যামোমিলা, পলসেটিলা ।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা সমূহে এবং মস্তিষ্কের ও আবক যন্ত্র সকলের উপর বিশেষ অধিকার রাখে ।

হঠাৎ কোন প্রকার মনোবেগ জন্য মূর্ছা ইত্যাদি ও শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির লঘুতা, যাতনার সহিত শিরা সম্বন্ধীয় উপসর্গ, আন্তর্বের দোষ, পাকস্থলীর বিকৃতি, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

মস্তকে শলাকা বিদ্ধ করার ন্যায় যাতনা, এক দিকেই জ্র বা মস্তকের এক দিকে ছেদন করার ন্যায় যাতনা, এক পার্শ্বে শয়ন করিলে, সেই পার্শ্বের অস্থি সকলে মোচ্ড়ানির ন্যায় বেদনা বোধ, উত্তান-শায়ী হইলে যাতনার নিরুত্তি, হস্তের গ্রন্থি সকলে এবং অস্থি সমূহে, অসহ্য যাতনা বোধ, মস্তকের পশ্চাচ্ছাদ্যে ও সম্মুখে কাম্ড়ানি, চক্ষুর ভিতর বালি পড়ার ন্যায় কষ্ট বোধ, রজস্বলা কালীন জরায়ু মধ্যে মোচ্ড়ানির ন্যায় বেদনা, উরু দেশের পশ্চাচ্ছাদ্যে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা ।

শরীর কঠিন হইয়া পশ্চাদ্ধিকে নত হয়, মুখ দিয়া জল উঠে, জ্ঞান শূন্যতা, হাঁই উঠা, অম্পা নিদ্রা, স্বপ্নদর্শন করিয়া চীৎকার করা, অদম্য স্বভাব, গলার ভিতর চাপিয়া থাকাতে গিলিবার ব্যাঘাত, চক্ষুর সম্মুখে অগ্নি শিখা দর্শন, সর্ব শরীরে কম্প, অন্য সমুদয় শব্দ অপেক্ষা মনুষ্যের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পায়, প্রত্যেক বার আহারের পর হিক্কা, পাকস্থলীর মধ্যে শূন্য বোধ হয় ।

স্ত্রীলোকের রজস্বলা কালীন অতিরিক্ত রজঃস্রাব হয়, এক পক্ষের মধ্যে পুনর্ব্বার রজোদর্শন, রজস্বলা কালীন হৃৎকম্প ।

হৃৎ এবং তামাকুতে অশ্রদ্ধা, মুখে যুক্তিকার ন্যায় আশ্বাদন, তিস্ত শ্লেষ্মা বা ভুক্ত-দ্রব্য উঠা, কোষ্ঠাবরোধ, মল নিঃসরণে অত্যন্ত বেগ, হারীষ নির্গত হয়, মলের সহিত কৃমি মিশ্রিত থাকে, উদর ভঙ্গ হইয়া রক্ত মিশ্রিত কেনা বিশিষ্ট পাতলা মল নির্গত হয়, অথবা তদ্বিপরীতে অধিক বেগের পর হরিদ্রাবর্ণ বা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, বৃহৎ, মল খণ্ড সকল নির্গত হয় ।

বক্ষঃস্থল এবং গলা চাপিয়া ধরে ও তাহার সহিত শুষ্ক কাশী থাকে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, কষ্টে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত

হয় । শরীরের চর্ম উত্তেজিত হইয়া চুলকায়, বদন কখন রক্ত-
বর্ণ এবং কখন নীলবর্ণ দেখা যায়, সমুদয় শরীরে উত্তাপ, এক
দিকের গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, আহার কালীন ঘর্ম নিগত হয়, কর্ণের
নীচের গুঠলি ফুলে, চুল উঠিয়া যায়, হস্ত ঘামে, গমন কালীন
চরণের গুল্ফে বেদনা বোধ হয় ।

মুখ মধ্যে অল্প জল একত্র হয়, বদনের অভ্যন্তর এবং
তালু ফুলে, জিহ্বার নীচের গুঠলিঘয়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ঘায়ের চিহ্ন দেখা যায়, চর্ষণ বা বাক্য কখন সময়ে, জিহ্বা
দংশন ।

নাসিকার ভিতর শুষ্কতা এবং চুল্কানি, নাসিকাতে উত্তাপ,
অথবা বহির্ভাগ ফুলা, আলোক দর্শন করিলে চক্ষুঃ দিয়া জল-
স্রাব হয়, চক্ষুর উপরের পাতা ফুলা ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ
ব্যবহার করা যায় ।

ইপিক্যাকুয়ানা ।

প্রতিষেধক ও দোষহ্ন ।—আর্গিকা, আর্সেনিকম্, চায়না।

অপাচ্য দ্রব্য ভোজন জন্য পাকস্থলীর বিকৃতি জন্মাইয়া
বম্নেন্দ্ৰ বা অতিশয় বম্নন, অজীর্ণ বা পিত্ত লক্ষণ বিশিষ্ট
ঘোরতর জ্বর, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালীর প্রদাহ, শারীরিক
নানা রক্ত হইতে রক্তস্রাব, যুহু জ্বর, বম্নন, পিত্ত বম্নন, কাশী,
উদর ভঙ্গ, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কুইনাইন্ ঔষধ ব্যবহার জন্য
যে সকল পীড়া উপস্থিত হয়, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ
উপকারী ।

একোনাইট ।

প্রতিষেধক ও দোষল্প ।—বিনিগার, কর্পূর, মদ্য, নক্স-বমিকা, উদ্ভিজ্জ অল্প ।

শারীরিক যন্ত্রে বা শরীরের কোন বিশেষ স্থানে রক্ত নিবদ্ধ হইলে, বাহ্য প্রদাহ বা প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ সকল, বাহ্য উত্তাপ, রক্তবর্ণত্ব ও অধিক যাতনা থাকে, পাকস্থলী বা যকৃৎ ক্ষীত হইলে, তাহার প্রথমাবস্থায়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রাদিতে প্রদাহ, শ্বাস কাশাদি, ভয় জন্য যে সকল মূর্ছা ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয়, জরায়ুর প্রদাহ জন্য বিকৃতি, কামলা, প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

এন্টিমোনিয়ম্-ক্ৰুডম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষল্প ।—হেপার, মর্কিউরিয়স্, পল্‌সেটিল ।

দুষ্পাচ্য-দ্রব্য ভোজন বা অতি ভোজন জন্য পাকস্থলীর বিকৃতি, পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের ক্ষীততা, প্রবল পিত্ত লক্ষণ বিশিষ্ট পাকস্থলীর বিকার, অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের উদরের পীড়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রে হাঁপানি রোগের ন্যায় উপসর্গ, স্ত্রীলোকের প্রসব কালীন অতিশয় চক্ষুর পাতার ক্ষীততা, মাংসপেশী সকলের বাত রোগ, পানি বসন্ত, বা অন্য প্রকার তাদৃশ চর্ম রোগ, গ্রন্থি-বাত জন্য ফুলা, ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

এণ্টিমানিয়ম্-টার্টেরিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—চায়না, ইপিক্যাকুয়ানা ।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের রোগের প্রথমাবস্থায় বা শেষাবস্থায়, শিশুর গলার ভিতর জ্বেগ্না একত্রিত হইয়া ঘড় ঘড় শব্দ হয়, ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করে, বসন্ত এবং তাদৃশ চর্ম্ম রোগ, উৎকাশী, পিত্ত দোষ জন্য পাকস্থলীর বিকৃতি, তীব্র বাত রোগ, বিশেষতঃ যাহাতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলকে অথবা হৃৎপিণ্ডকে আক্রমণ করে, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগ সকলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

এলমিনা ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—ত্রায়োনিয়া, ক্যামোমিলা, ইপিক্যাকুয়ানা ।

পেট বেদনার সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের, এবং শিশুগণের পীড়া, গর্ভ কালীন কোষ্ঠাবরোধ, বহুকাল স্থায়ী মস্তকে জ্বেগ্না বদ্ধ, আঙ্গুল হারা এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ, মস্তকে রক্ত বদ্ধ, হইয়া শিরঃ শূল, গর্ভ কালীন দন্ত রোগ, এবং মাথাধরা, ও মূর্ছা রোগ ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—ক্যালেক্টেরিয়া, কপূর, কোনিয়ম্, ছেপার, সল্ফর ।

মর্করি, প্রভৃতি পারা, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করাতে

অস্থি সকলে এবং চর্ম্মের উপর যে সকল রোগ হয়, এবং পারা ব্যবহার জন্য যে সকল চক্ষুঃ রোগ, শিরা সম্বন্ধীয় বিকৃতি, গুঠলি সকলের রোগ, উৎপন্ন হয়, বাত রোগ, প্রাচীন ক্ষত, সঞ্চিত গৃহিণী, রক্তামাশয়, জরায়ুর এবং মূত্র-স্রাবক যন্ত্রের পীড়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের প্রাচীন রোগ, মুখ-রোগ, প্রাচীন কাশী, এবং অজীর্ণ রোগ, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

এসিডম্-ফস্ফরিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—কপূর, কফি ।

অস্থি সম্বন্ধীয় রোগ সকল, বলিষ্ঠ শরীরে রোগ হইয়া পরিশেষে যে দুর্বলতা, ও ক্ষীণতা জন্মে, চিকিৎসা জন্য বা অত্যন্ত তীব্র রোগ জন্য যে ক্ষীণতা হয়, মনোবেগ জন্য যে মূঢ় জ্বর হয়, প্রাচীন রোগ জন্য যে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হয়, বহু কাল স্থায়ী গ্রন্থি-বাত, উদরের পীড়া, গৃহিণী, রক্তামাশয়, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ বিশেষে পিত্ত জ্বর জন্য নিয়ত উদরের পীড়া, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

এসিডম্-সলফুরিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—পল্‌মেটিল ।

মদ্যপায়ী দিগের প্রাতঃকালিক পীড়া, ধাতুস্থ জ্বর, অনিদ্রা, অজীর্ণ, প্রাচীন অতিসার, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলের বিকৃতি, আর্ন্তব দোষ, চক্ষুঃ এবং চক্ষুর পাতার প্রাচীন রোগ,

সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা।

চর্মের উপরের ঘা. এবং অন্যান্য রোগ, যদ্বারা রোগীর শরীর ক্রমশঃ কুশ হইতে থাকে, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ওপিয়ম্।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন।—বেলাডোনা, কপূর, নক্স-বমিকা, মদ্য।

এই ঔষধ শিরা সম্বন্ধীয় শারীরিক যন্ত্রের উপর বিশেষ কার্য্য করে, এবং উদর, মাংসপেশী ও মস্তিষ্কের উপর ও অধিকার রাখে। হঠাৎ ভয় বা মনোবেগ জন্য মুচ্ছাদি রোগ, সর্বতোভাবে শক্তি হীনতা, স্থানীয় বা সর্বাঙ্গিক অবসন্নতা, সম্পূর্ণ অলস, ত্রিগুণ্ড্রিয়ের বোধ বা যাতনা শূন্যতা, শরীরের কোন বিশেষ স্থানে বা সমস্ত শরীরে কামড়ানি, অল্প কার্য্যের অভাব জন্য, বা অতিরিক্ত অতিসারের পর, কোষ্ঠ বদ্ধতা, ফুস্ ফুস্ যন্ত্রের অবসন্নতা, মাদক দ্রব্য পান জন্য প্রলাপ, ও অর্দ্ধাঙ্গ ইত্যাদি রোগ, এবং বৃদ্ধাবস্থায় যে সকল নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ককিউলস্।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন।—কপূর, নক্স-বমিকা।

এই ঔষধ প্রথমতঃ পাকস্থলীতে এবং অল্প মধ্যে, দ্বিতীয়তঃ মস্তিষ্কে, শিরা সমূহেতে বা বিশেষ রূপে জিরাযু এবং তল্লিকটস্থ স্থান সকলে, কার্য্য করে। অত্যন্ত বমনেচ্ছা বা বমন

এবং পিত্ত দোষ জন্ম যে রোগ হয়, অজীর্ণতা, উদর স্ফীততা, অথবা কফার্ভবা স্ত্রীলোকগণের উদর মধ্যে যে সকল শূলবৎ যাতনা উপস্থিত হয়, শারীরিক কোন স্থানে গর্ভকালীন রক্ত বদ্ধ হইয়া যে উপসর্গ উপস্থিত হয়, চরণদ্বয়ের অগ্রভাগের অবসন্নতা, বন্ধনী শিরায় বাহ্য আঘাত, বা রজস্বলা কালীন কফ জন্ম, যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়, অথবা তীব্র রোগ সকলের পর অত্যন্ত দৌর্বল্যের সহিত যে সকল প্রাচীন জ্বর হয়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারজনক ।

কফি ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।— একোনাইট ।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা সকলের উপরে শীঘ্র কার্য্য করে । জ্বর ব্যতিরেকে সমস্ত শরীরের বিকৃতি উপস্থিত হইয়া যে উত্তেজনা হয়, ইষ্ঠাৎ আনন্দ বা তাদৃশ মনোবেগ জন্ম মস্তকে রক্ত বদ্ধ হইয়া বিকৃতি ভাব, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

কপূরের আরক বা কপূর ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—ওপিয়ম্, বিনিগার, মদ্য ।

সূর্যের উত্তাপে জ্ঞান শূন্য হইয়া, যুত প্রায় হয়, শারীরিক যন্ত্রের খেঁচনি প্রভৃতি বিকৃতি, সামান্য কক, জ্বরের সহিত কফ, অথবা হিম হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, অত্যন্ত তীব্র রোগ সকল প্রথমতঃ প্রকাশিত হইয়া পরেতে ক্রমশঃ শক্তিহীন

করে, ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায়, প্রাচীন বা তরুণ অপস্মার রোগ, ও কএক প্রকার বিকার জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

কলোসিস্ বা কলোসিস্টিস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—কফ্টিকম্, ক্যামোমিলা, স্ট্যাকি-সেথ্রিয়া ।

এই ঔষধ পাকস্থলীর উপরি ভাগে, এবং যান্ত্রিক শিরা সকলের উপরে, বিশেষতঃ রুহদন্দের উপর ও গ্রন্থি সকলে, শিরার বন্ধনিতে, বিশেষ রূপে অধিকার করে ।

অন্ত্রের মোচড়ানি এবং স্ফীততা, মানসিক বিকার জন্য উদর ভঙ্গ, রক্তমাশয়, প্রাচীন অতিসার, শরীরের দক্ষিণ দিকে রুহদন্দের মধ্যে কাঁপিয়া থাকা, গ্রন্থিবাত, হস্ত পদাদির মধ্যে কোন একটীর সঙ্কোচন, প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

কচিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—ককিউলস্, নক্স-বমিকা, পল্‌সে-টিলা ।

এই ঔষধ পরিপাক এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলের উপর, অন্ত্র, রক্ত পরিচালনের, ও মূত্র গ্রন্থিষয়ের, মূত্রস্থলীর, উপর বিশেষ ফলদায়ক । পাকস্থলীর বিকৃতি, আমাশয়, প্কাশ-য়ের এবং উদরের প্রদাহ বিশিষ্ট পীড়া, উদরের স্ফীততার

সহিত শূলবৎ বেদনা, রাত্রিতে শুষ্ক কাশী, উদরের বা বক্ষঃ-স্থলের শোথঃ, মূত্র গ্রন্থি এবং মূত্রস্থলীর প্রদাহ বিশিষ্ট বিকৃতি ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

কফিকন্

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—কফি, কলোসিন্ধু, নক্স-বমিকা ।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা এবং বাহ্যিক যন্ত্র সকলের উপর বিশেষ অধিকার রাখে ।

স্ত্রীলোকের গর্ভ সম্বন্ধীয় মূর্ছা রোগ, বহুকালস্থায়ী শিরার যাতনা, শিরার বাত রোগ, পক্ষাঘাত, অপস্মার, প্রাচীন চর্ম-রোগ, শ্লেষ্মজ চক্ষুর এবং চক্ষুর পাতার ক্ষীততা ও মধ্যাত্ত নিবিষ্ট গুঠলি সকলের বৃদ্ধি, কফ জন্য নিঃশ্বাস প্রস্থাসের প্রণালীর প্রাচীন রোগ, গ্রন্থির অবসন্নতা, অর্শঃ, আর্ন্তবের বিসমতা, প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক ।

কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—আর্সেনিকম্, (ক্যাম্ফর,) কপূর ল্যাকিসিস্ ।

এই ঔষধ যান্ত্রিক আব, শোষণ, এবং রক্ত-পরিচালন, বিষয়ে, বিশেষ অধিকার রাখে ।

প্রাচীন শ্বাস, স্বর ভঙ্গ, অথবা বয়ু-বাহক-প্রণালীর অন্তরস্থ শ্লেষ্মজ রোগ, প্রাচীন ঘা, তীব্র রোগের প্রাচীন অবস্থায় শারী-

দ্রবিক দৌর্বল্য জন্য যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়, প্যারা ব্যবহার জন্য শারীরিক গুঠলি সকলে যে সকল প্রাচীন রোগ হইয়া থাকে, মাটির ঘা, ক্ষয় রোগের প্রথমাবস্থা, উদরক্ষীততা থাকিয়া অজীর্ণ রোগের প্রথমাবস্থা, কিঞ্চিৎ সময়ের পরিবর্তন হইলে শীতোষ্ণ জন্য যে সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়, ও শারীরিক দৌর্বল্য জন্য চর্ম্মের উপর যে সকল ফুস্ফুড়ি উঠে, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

কুপ্রশ্ন ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—বেলাডোনা, ক্যালেকেরিয়া, ডল্ফে-মেরা, হেপার ।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা সকলের উপর শীঘ্র কার্য্য করে, তন্নিমিত্তে মস্তিস্কের, ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলের উপর এবং পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার রাখে ।

পাকস্থলীর, এবং অন্ত্র সকলের অতিশয় বিকৃতি জন্য বমন, বিরেচন এবং বাহ্য টঙ্কার ইত্যাদি যাহা হইয়া থাকে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের বিকৃতি, ওলাউঠা, অতিমার, শ্বাস রোগ, এবং বহুকাল স্থায়ী অতিরিক্ত কাশী, ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

কোনিয়ম ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয় ।—কফি ।

এই ঔষধ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলের এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর বিশেষতঃ জরায়ু, ও তরিকটস্থ স্থান সকলে

বিশেষ অধিকার রাখে। হাঁপ কাশী এবং বার্দ্রক্যে যে সকল রোগের দ্বারা জীবনী-শক্তির ক্ষয় উপস্থিত হয়, স্ত্রীলোক দিগের রজস্বলা বা গর্ভধারণ কালিক উপসর্গ, গুঠলি বৃদ্ধি, গুঠলির প্রাচীন রোগ, পাকস্থলীর অথবা পরিপাকের যন্ত্র সকলের প্রাচীন বিকৃতি, প্রাচীন পচা ঘা, প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয়।

ক্যাস্‌য়ারাইডিস্ বা ক্যাস্‌য়ারিস্।

প্রতিষেধক ও দোষদ্ব।—কপূর, বিনিগার, এলেকোহল্।

এই ঔষধ শিরা সকলের ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে এবং রক্ত পরিচালন বিষয়ে অতি শীঘ্র কার্য করে ও মূত্র-স্থলী, মূত্র গ্রন্থিতে এবং তাহার নিকটস্থ স্থানের উপর বিশেষ অধিকার রাখে। মস্তিষ্কের এবং মেরুদণ্ড সংশ্লিষ্ট শিরা সকলের প্রদাহ, মস্তিষ্ক প্রদাহ জন্য প্রবল জ্বর, মূত্রস্থলী, মূত্র গ্রন্থির ক্ষীণতা ও প্রদাহ এবং জরায়ু ও তরিকটস্থ যন্ত্র সকলের বিকৃতি, ইত্যাদি উপসর্গে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্যাপ্সিকন্।

প্রতিষেধক ও দোষদ্ব।—কপূর।

এই ঔষধ মস্তিষ্কের এবং পরিপাক যন্ত্রের নানাবিধ রোগে বিশেষ উপকারক।

ক্যান্সারিলা ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয়।—একোনাইট, ইণ্ডেশিয়া, নুজ-
বমিকা, পল্‌সেটিল।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা সম্বন্ধে ও যকৃতের উপর, পাক-
স্থলী, অস্ত্রের, সামান্যতঃ রক্ত পরিচালনের, মূত্র-স্থলী ও মূত্র
গ্রন্থি ও তল্লিকটস্থ স্থানের উপর বিশেষ অধিকার রাখে ।

প্রায় সমস্ত প্রকার পিত্ত জন্য প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ,
কামলা, শিরা সম্বন্ধীয় যন্ত্রের প্রবল বিকৃতি, এবং তাদৃশ
বিকৃতি জন্য, বিশেষতঃ স্বাভাবিক ঘর্ষাবরোধ বশতঃ যে সকল
টঙ্কার উপসর্গ উপস্থিত হয়, প্রদাহ বিশিষ্ট দন্ত রোগ, বক্ষঃ-
স্থলের গুঠলি সকলের ক্ষীণতা, অথবা হীম সেবন জন্য যে
সকল চক্ষুঃ, কণ, ইত্যাদিতে প্রদাহ বিশিষ্ট উপসর্গ উপস্থিত হয়,
অত্যন্ত যতনা বিশিষ্ট প্রদাহ জন্য রোগ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের
যন্ত্রের এবং প্ৰকাশয়ের বিকৃতি, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ
উপকারী ।

ক্যালেকেরিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্বয়।—কপূর, এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।

এই ঔষধ শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা, যান্ত্রিক পোষণ, রক্ত-পরি-
চালন এবং শারীরিক মলাদি নির্গমন, ও পরিশোধন বিষয়ে
সমভাব রক্ষার নিমিত্তে অসীম শক্তি ধারণ করে ।

শৈশবাবস্থায় এবং বাল্যকালে অবসাদ্ধ সংঘটিত যে
সকল রোগ উপস্থিত হয় তৎপক্ষে এই ঔষধ পরমোপকারক ।

অস্থি অথবা চর্ম্মের দুর্দম্য রোগ সকলের পক্ষে, ইহা উপকারক। ও অতিশৈশবাস্থায় শারীরিক যন্ত্র বিকৃতি জন্য দৌর্বল্য হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সর্বতোভাবে বলিষ্ঠকায় করে। পরিপাক যন্ত্রের প্রাচীন রোগ সকল, প্রাচীন চক্ষুঃ রোগ, ও চক্ষুর পাতার ক্ষীততা জন্য রোগ সমুদয়, প্রাচীন কর্ণ-রোগ, গুঠলির কঠিনতা এবং ঘা, নানাবিধ স্ফোটক, আঙ্গুলহারা, প্রাচীন ক্ষত, স্বাভাবিক মস্তকে শ্লেষ্মাবদ্ধতা, ও জরায়ু সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রাচীন উপসর্গ, স্বাভাবিক গর্ভাশ্রাব, শিশুর উদর বৃদ্ধি, ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন রোগ সকলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয়।

ক্যালি-কার্বোনিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—কপূর, কফি ।

এই ঔষধ, মূত্রস্থলীয় ক্ষীততা, পাকস্থলীয় অম্ল উদগীরণ, কফ, শোথঃ, কোষ্ঠাবরোধ, মাটি দিয়া রক্তাশ্রাব, গর্ভকালীন পশ্চাত্তাগে বেদনা, অনিদ্রা, প্রভৃতি রোগে উপকারক ।

ক্যালি-বাইক্ৰোমাস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—প্রকাশিত হয় নাই ।

এই ঔষধ, মস্তকে শ্লেষ্মা বদ্ধ, মাজা হইতে চরণ পর্য্যন্ত শিরার যাতনা, এক প্রকার কাশী, অজীর্ণ, গ্রন্থিবাত প্রভৃতি রোগেতে উপকারক হয় ।

ক্যালিগুউলা ।

প্রতিষেধক ও দোষত্র ।—প্রকাশিত হয় নাই ।

এই ঔষধ প্রায় বাহ্যে প্রয়োগ করা যায়, এবং অস্ত্র ক্ষেদন জন্য বা, ও কীটাদি দংশন জন্য উত্তাপ নিরুত্তির নিমিত্ত বিশেষ রূপে কেবল বাহ্যিক, ও ছেঁচা ঘা, স্থান বিশেষের মোচ-ডানি, গুঠলির বৃদ্ধিতে, অস্তুর বাহ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গ্রাফাইটিস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষত্র ।—আর্সেনিকম্, নক্স-বমিকা, মদ্য ।

এই ঔষধ চর্ম্মে, এবং গুঠলি সকলে, পাকস্থলী, জর-যুতে ও তল্লিকটস্থ স্থানে, বিশেষ অধিকার রাখে ।

ক্লেদ বিশিষ্ট দ্রব্রবৎ চুল্কানি, বহুকালস্থায়ী ঘা, গুঠলি সকলের বৃদ্ধি এবং কঠিনতা, ঐস্থি বাত বা রসবাত ব্যতি-রেকে ঐস্থি সকলের স্ফীততা, ও তাদৃশ রোগ জন্য অজী-র্ণতা, শরীরের যে সকল স্থান সর্বদা সংলগ্ন থাকে সেই সকল স্থান ফাটা, দুর্দম্য অর্শঃ, প্রাচীন কোষ্ঠবদ্ধতা, কাছূদাউদ্, আবু, লোম বিশিষ্ট স্থানে দ্রব্র, ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক ।

চায়া ।

প্রতিষেধক ও দোষত্র ।—আর্সেনিকম্, ইপিক্যাকুয়ানা, নক্স-বমিকা, মলফর্ ।

ওই ঔষধ পাকস্থলী ও অন্ত্রের, পাত, ম্লীহা, যকৃতের

উপর, এবং মলাদির শোষণ ও নিঃসরণ বিষয়ে, বিশেষ অধিকার রাখে।

পাৰা ব্যবহার বা বিরেচক ঔষধ সেবন জন্য শারীরিক রক্ষণ হওয়াতে, বা অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত ক্ষয় জন্য যে দৌৰ্বল্যজ রোগ উপস্থিত হয়, প্রথমতঃ শরীরের উপর হরিদ্রাক্ত হইয়া পিত্ত চিহ্ন প্রকাশানন্তর যে সকল দৈশিক বা সাময়িক দোষ জন্য জ্বর উৎপন্ন হয়, এবং যে সকল পীড়াতে পূর্বে কুইনাইন, ব্যবহৃত না হইয়া থাকে, তৎপক্ষে প্রাচীন ও নূতন জ্বর, পিত্ত চিহ্ন সংযুক্ত পাকস্থলীর এবং উদরের প্রাচীন রোগ, দৌৰ্বল্য, যক্ষ্ম এবং প্লীহার তরুণাবস্থায় ও প্রাচীনাবস্থায়, প্রাচীন অতিসার, শোথঃ ও উদরীয় শোথঃ প্রভৃতি নানাবিধ রোগে পরমোপকারী হয়।

জিহ্বা।

প্রতিষেধক ও দোষহন।—কপূর, হেপার, ইথেশিয়া।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা সম্বন্ধে, এবং স্বতঃ-পরিচালন-বিষয়ক মাংসপেশী সকলের, ও মস্তিষ্কের উপর আশু অধিকার করে।

মস্তিষ্কের প্রবল বিকৃতির সহিত প্রদাহ, কোন প্রকার স্বাভাবিক স্রাবের হঠাৎ অবরোধ জন্য মস্তিষ্কে বিকৃতি, স্বতঃ-পরিচালন-শক্তি, বা স্থানিক অবসন্নতা, মস্তিষ্ক উত্তেজনা জন্য চক্ষার রোগ, ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

টারাক্কিকন্ ।

প্রতিষেধক ও দোষল্প ।—(?) অর্থাৎ প্রকাশিত হয় নাই ।

এই ঔষধ পিত্ত আবের হ্রাসতা জন্য যকৃতের জড়তা, উদরাদ্ধান, দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী হয়

ডল্কেমেরা ।

প্রতিষেধক ও দোষল্প ।—কপূর, ইপিক্যাকুয়ানা মর্কিউ-রিয়ন্ ।

এই ঔষধ শ্লেষ্মা-পরিচালক-যন্ত্রের নানা বিভাগে, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র ও মূত্র নিঃসরণের প্রণালির, এবং রক্ত পরিচালক গুঠলি সকলের উপর বিশেষ অধিকার রাখে । জল মধ্যে প্রবিষ্ট থাকাতে বা হিম লাগাতে, বায়ু-প্রবাহক-প্রণালীতে, গলার ভিতর, চক্ষুর পাতায়, নাসিকারন্ধ্রের ভিতর, শ্লেষ্মা একত্র হওয়াতে যে সকল পীড়া হয়, তাহার প্রারম্ভে এই ঔষধ সেবন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় । গুঠলি সকলের কঠিনতা ও স্ফীততা, গন্ধক বা পারা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে সেবন জন্য যে সকল চর্ম্ম রোগ, চুল্কানি, ক্লেদ বিশিষ্ট চক্ষুঃ ফুলা, সরল কাশী, ছাঁপানি, অথবা বয়ু-প্রবাহ-প্রণালী মধ্যে, যে সকল শ্লেষ্মাজ রোগ উপস্থিত হয়, দুর্দম্য মস্তকে শ্লেষ্মা-বদ্ধতা, মূত্র নিঃসারক-প্রণালী দ্বারা বহু কাল স্থায়ী আব, এবং শোথঃ জন্য স্ফীততা প্রভৃতি দ্বারাগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

ডিজিটেলিস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্ব।—নক্স-বমিকা, অহিক্লেণ (আকিং) ।

এই ঔষধ রক্ত পরিচালক যন্ত্র সকলের এবং পাকস্থলীর উপরিভাগে ও মূত্রস্থলী ও তল্লিকটস্থ স্থানের উপর বিশেষ অধিকার রাখে ।

হৃৎপিণ্ডের, এবং শারীরিক বৃহৎ যন্ত্র সকলের রোগাদি, রক্ত পরিচালনের অবরোধ বা ঘোরতর বিকার, প্লীহা, পাত বা যান্ত্রিক গুঠলির রোগ, যাহাতে কামলা প্রকাশিত হয়, পক্কাস-য়ের এবং অন্ত্র সকলের প্রদাহ বিশিষ্ট রোগাদি, পিত্ত বিকৃতি, বক্ষঃস্থলের বা উদরের অথবা সর্বাঙ্গিক শোথঃ, মস্তকে জলবদ্ধ, মূত্র ধাতুস্থ জ্বর, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

ড্রোসেরা ।

প্রতিষেধক ও দোষদ্ব।—কপূর ।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলের রোগ, বিশেষতঃ বায়ু-বাহক-প্রণালির অগ্রভাগের শ্লেষ্মাজ রোগ, সামান্য কফ জন্য স্বরভঙ্গ, উৎকাশী, গলদেশের স্ফীততা, দর্শনেন্দ্রিয়ের অসা-ধারণ পরিবর্তন, পাকস্থলীর বিকৃতি প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা দীপিকা ।

থুজা ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—ক্যামোমিলা, ককিউলস্, মার্কিউ-
'রিয়স্ ।

এই ঔষধ বসন্ত রোগ নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপকারক,
এবং চর্ম্মের উপর মাংস বৃদ্ধি, স্থানীয় কঠিনতা, বা উপদংশ
প্রভৃতি নানাবিধ রোগে উপকারী হয় ।

নক্স-বমিকা ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—বেলাডোনা, কপূর, ক্যামোমিলা,
কফি, ওপিয়ম্ ।

এই ঔষধ, পাকস্থলীর বা যান্ত্রিক শিরা সকলের, ভুক্ত-
দ্রব্য-বাহক-প্রণালীর উপর বিশেষ অধিকার রাখে । মস্তিষ্ক,
যক্ৰৗ, মূত্র-গ্রন্থি, প্রভৃতির উপর ও শীঘ্র কার্য করে ।

পাকস্থলীর বিকৃতি, পিত্ত জন্য পীড়া, ক্ষীণ, পিত্তাধিক্য
ধাতু বিশিষ্ট, অথবা বলিষ্ঠ, বা গৃহিণী রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তি-
গণের উদরের পীড়া, শিরা সম্বন্ধীয় উত্তেজনার আধিক্যতা,
উপর্যুপরিভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা, ও অতিসার, যক্ৰতের যান্ত্রিক
বিকৃতি, প্রদাহ বিশিষ্ট জ্বরাদি, স্ত্রীলোকের জরায়ু-দোষ জন্য
মূর্ছা রোগ, পিত্তজ বিরতি জ্বর, পাকস্থলীর প্রাচীন বিকৃতি,
শ্লেষ্মোদ্ভূত জ্বর এবং উদরের পীড়া, অর্শঃ, অত্যন্ত পাঠে নিমগ্ন
থাকায়, রাত্রি জাগরণ, ও তীব্র মদ্যাদি সেবন জন্য যে সকল উপ-
সর্গ উপস্থিত হয়, কএক প্রকার অন্তর্বৃদ্ধ বা সন্ততঃ জ্বর, গর্ভ
কালীন পাকস্থলীর বিকৃতি, মূত্রস্থলীর এবং মূত্র-গ্রন্থিদ্বয়ের
প্রদাহ বিশিষ্ট উপসর্গ, বাত রোগ, প্রভৃতিতে এই ঔষধ
বিশেষ উপকারী হয় ।

নাট্রম্-মিউরিএটিকম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—আর্সেনিকম্, কর্পূর ।

পরিপাক-শক্তির বা আর্ন্তবের স্বাভাবিক বা প্রাচীন বিকৃতি, সম্ভূত জ্বর কালীন অতিরিক্ত পরিমাণে কুইনাইন্ সেবন জন্য যকৃতের বা প্লীহার, যে সকল প্রাচীন রোগ হয়, ধাতুস্থ জ্বর, শারীরিক রসোভাগের অস্পৃশ্যতা জন্য দুর্বলতা, চর্ম্মের বা নাড়ির প্রাচীন রোগ, যাড়ের গুঠলির বৃদ্ধি, দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা, বা অতিসার, প্রাচীন চক্ষুঃ রোগ, অর্শঃ প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

পডোফায়লম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—(?) অর্থাৎ প্রকাশিত হয় নাই ।

এই ঔষধ পিত্ত জন্য পাকস্থলীয় বিকৃতি, যকৃতের জড়তা, যকৃতঃ বৃদ্ধি, ও যকৃতের উপর স্ফোটক প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী হয় ।

পতেসটিল ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—ক্যামোমিলা, ককি, ইণ্ডেশিয়া, নক্স-বমিকা ।

এই ঔষধ হাম জ্বর বা মূহু ধাতুস্থ জ্বর, অজীর্ণের সহিত প্রবল জ্বর, অতিরিক্ত আবেগের সহিত চক্ষুঃ এবং কর্ণের প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ, পিত্ত জ্বর, পিত্ত বিকৃতি, পিত্তজ বিরতি জ্বর,

শিশুর বিরতি জ্বর, হিম-সেবা জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বা
পরিপাকের যন্ত্র সকলের বিকৃতি, গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন
জন্য পাকস্থলীর বিকৃতি, সন্তান প্রসবের সময় অধিক কাল-
স্থায়ী বেদনা, আর্ন্তব দোষ অর্থাৎ বদ্ধার্ন্তব, কষ্টার্ন্তব ও তজ্জন্য
যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়, অতিসার এবং উদরের অন্যান্য
পীড়া, গ্রন্থিবাৎ ও বাত রোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী
হয় ।

পিট্টোলিয়ম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—একোনাইট, নক্স-বমিকা ।

প্রাচীন চর্ম্ম রোগ, সাধারণতঃ ক্লেদ বিশিষ্ট কুক্ষুড়ি
ইত্যাদি, চর্ম্ম ফাটিয়া যাওয়া, শ্লেষ্মা জন্য চক্ষুঃ এবং চক্ষুর
পাতা কোলা, শিশুর ক্ষয় রোগ, প্রাচীন কর্ণ রোগ, দুর্বলতার
সহিত প্রাচীন পাকস্থলীর বিকৃতি, ইত্যাদিতে এই ঔষধ
বিশেষ উপকারী ।

প্লস্ম ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—বেলাডোনা, মর্কিউরিয়স্,
নক্স-বমিকা, ওপিয়ম্ ।

সামান্যতঃ শোথঃ রোগ, উদরের জড়তা, পরিপাক-শক্তির
বাধাদায়ক যান্ত্রিক কার্যের লঘুতা, উদরের শূলবৎ বেদনা,
অপস্মার, প্রভৃতি টঙ্কার বিশিষ্ট রোগ সকল, পাকস্থলীর

এবং উদরের প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ, প্রাচীন যক্ষ্ম এবং প্লীহা রোগ, ক্ষয় রোগের সহিত শারীরিক অবসন্নতা, দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা অতিসার, ও শ্বাস রোগাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

প্ল্যাটিনম ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—পল্‌সেটিল ।

উগ্র স্বাভাবা স্ত্রীলোকদিগের স্মৃতিকা রোগ, অতিরিক্ত রক্তস্রাব জন্য রক্তস্ফা কালীন যাতনা এবং মুচ্ছা রোগ প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

ফস্ফরস্

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন—কপূর, কফি, নক্স-বমিকা, মদ্য ।

শরীর পোষক যন্ত্র সকলের এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ও পরিপাকের বিকৃতি, দুর্বলকারক অতিসার, ফুস্ফুস যন্ত্রের বা বায়ু-বাহক-প্রণালীর স্ফীততা, য়হু জ্বরের সহিত অস্ত্র মধ্যে, মস্তিষ্কে অথবা ফুস্ফুস যন্ত্রের স্থান বিশেষে রক্তবদ্ধতা, বৈকালিক জ্বর, য়হু জ্বর, ক্ষয় রোগ বিশিষ্ট জ্বর, প্রাচীন বাত রোগ, অগ্নি-মান্দ্য, দুর্বলকারক ঘর্ষের সহিত রাত্তিকালের জ্বর, জলবৎ স্রাবের সহিত শারীরিক গুঠলির প্রাচীন ঘা, (যাহা আরোগ্য হইয়া পুনর্ব্যার প্রকাশিত হয়,) পাক-স্থলীর এবং অস্ত্রের প্রাচীন স্ফীততা, ওলাউঠার শেষ রোগ প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারজনক হয় ।

ফেরম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষল্প ।—আর্সেনিকম্, চার্না, ইপিগ্ণা—
কুয়ানা, পলসেটিলা ।

এই ঔষধ পাকস্থলী এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকল,
জরায়ু ও তল্লিকটস্থ স্থান সকলের উপর বিশেষ অধিকার
রাখে ।

শারীরিক পরিশোধক যন্ত্র সকলের দুর্বলতা, রসঃ বা
রক্ত ক্ষয় জন্য দৌর্বল্য, দুর্বলতার সহিত শারীরিক যন্ত্রে বা
স্থান বিশেষে রক্তবদ্ধ, হস্ত পদাদির অগ্রভাগে আরম্ভ হইয়া
সর্বদ্বীপ শোথঃ, স্নাতাবিক অগ্নিমান্দ্য, ভুক্ত-দ্রব্য বমন, বা
বিরেচন, বক্ষঃস্থলে রক্ত বদ্ধ, প্রাচীন কাশী, কফ, ইত্যাদি,
(যদ্বারা ক্ষয় রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভব থাকে,) ক্রমশঃ
মাংশ ক্ষয়, দুর্বলতার সহিত হৃৎকম্প, হৃদম্য প্রদর রোগ, বহু
পরিমাণে কুইনাইন্ ব্যবহার করাতে যে সকল পালা জ্বর হয়,
ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

বেরাট্রম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষল্প ।—একোনাইট্, কপূর, কফি, ।

পিত্তজ সম্ভূত জ্বর, সামান্যতঃ পিত্ত বিকৃতি, পিত্ত-বিকৃতি
জন্য বমন এবং বিরেচন, ওলাউঠা, অতিসার, ভয় জন্য টঙ্কার
রোগ, শুষ্ক, ও চক্রাকার চর্ম-রোগ, স্মৃতিকার পীড়া, আর্ন্তব দোষ
জন্য বাতঃ ব্যাধি ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

বেলাডোনা।

প্রতিষেধক ও দোষদ্ব।—কফি, ওপিয়ম্, পল্‌সেটিলা, মদ্য।

এই ঔষধ মস্তিষ্ক, গুঠলি, এবং যান্ত্রিক শিরা সকলের উপর বিশেষ অধিকার রাখে।

শারীরিক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র সকলের বা স্থান বিশেষের মধ্যে রক্তবদ্ধ হইয়া প্রদাহ জন্য টঙ্কার উপসর্গ, মস্তিষ্ক এবং শিরা সম্বন্ধীয় বিকৃতি জন্য প্রদাহ বিশিষ্ট প্রবল জ্বর, রসঃ ও পিত্তজ্বর, মস্তিষ্কের প্রদাহ, মেরু দণ্ডের স্ফীততা, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রাদির স্ফীততা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলের নানাবিধ বিকৃতি, জরায়ুর স্ফীততার সহিত বিকৃতি, প্রদাহ যুক্ত চর্ম্ম রোগ, সামান্যতঃ প্রদাহ বিশিষ্ট স্ফীততা, গুঠলির স্ফীততা এবং প্রদাহ, প্রলাপ, বিষযুক্ত জন্তু, দংশন জন্য জলভীতি, শিশুর দন্ত উঠিবার সময় টঙ্কার রোগ প্রদাহের সহিত মুখ বা দন্ত রোগ, গলার ভিতর রক্তবর্ণ হইয়া ফুলা প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয়।

ব্রায়োনিয়া।

প্রতিষেধক ও দোষদ্ব।—একোনাইট্, ক্যামোমিলা, নক্স-বমিকা, ইগ্নেশিয়া।

পাকস্থলীর প্রবল বিকৃতির সহিত প্রদাহ বিশিষ্ট উপসর্গ সকল, প্রদাহান্বিত ধাতুস্থ জ্বর, বিকার জ্বর, ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের প্রবল প্রদাহ, পাকস্থলীর এবং যকৃতের প্রদাহ, পিত্ত জ্বর, পিত্ত জন্য পালা জ্বর, প্রদাহ বিশিষ্ট চর্ম্ম রোগ, প্রবল বাত রোগ, নানাস্থানীয় প্রদাহ সংশ্লিষ্ট স্ফীততা, গ্রন্থি সকলের

নিকট, উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ স্ফোটক সকল, গ্রন্থি সকলের উত্তাপের সহিত স্ফীততা, প্রবল কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত প্রদাহ যুক্ত উদরের পীড়া, এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় প্রদাহ বিশিষ্ট, রোগাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

ব্যারায়্টা ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—বেলাডোনা, কর্পূর, ডল্ফেমেরা, মর্কিউরিয়স্ ।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের প্রাচীন রোগ, গুঠলি সকলের প্রদাহাবৃত স্ফীততা, বা কাঠিন্য, প্রদাহ বিশিষ্ট বেদনার সহিত জিহ্বাব গোড়ার গুঠলি বৃদ্ধি, প্রাচীন বা শিশুগণের সাধারণ রোগ, প্রাচীন চর্ম রোগ, হৃদম্য দ্রুত রোগ, শ্লেষ্মা জন্য কর্ণ, চক্ষুঃ, চক্ষুর পাতা, এবং গুঠলি সকলের রোগ, পাকস্থলীর প্রাচীন বিকৃতি, প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক হয় ।

মর্কিউরিয়স্ । *

* এই নামে চারি প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ মর্কিউরিয়স্-করোসাইবস্, মর্কিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্, মর্কিউরিয়স্-বাইবস্, এবং মর্কিউরিয়স্-আরোডেটস্, ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্তটী তিন্ন এই পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনটী ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব যে সকল স্থানে বিশেষ নাম লিখিত না হইয়া কেবল মর্কিউরিয়স্ লিখিত আছে সেই সকল স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনটীর মধ্যে যে কোম একটী দেওয়া বিধের ।

মর্কিউরিয়স্-করোসাইবস্।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—এসিডম্-নাইট্রিকম্, হেপার, ওপিয়ম্, সার্মাপ্যারিলা, সল্ফর।

এই ঔষধ যন্ত্র সকলের, বিশেষতঃ রক্তমাশয় প্রভৃতির উপর বিশেষ কার্য করে।

মর্কিউরিয়স্-সোলিউবিলিস্।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—মর্কিউরিয়স্-করোসাইবসের ন্যায়।

এই ঔষধ এবং উপরোক্ত ঔষধ, রক্ত পরিচালন বিষয়ে, সমস্ত শিরা সম্বন্ধে, স্লেয়া পরিচালক-সুক্ষ্ম-চর্মের, ও অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র সকলের উপর, বিশেষ অধিকার রাখে। তজ্জন্য বিষম পোষণবশতঃ শরীরের মধ্যে যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার করে। যে সকল ক্ষত দিয়া জলবৎ পাতলা রসঃ নির্গত হয়, গুঠলি সকল প্রদাহ বিশিষ্ট হইয়া স্ফীত, বন্ধঃস্থল, যক্লৎ বা প্লীহার স্ফীততা, আমাশয়, পিত্ত নিঃসরণ, শুষ্ক কণ্ঠ, যক্ল-তের বিকৃতি জন্য কামলা, বদনের স্ফীততা, কৃমি রোগ, স্লেয়াজ ব্যাধি সকল, কাশী, কএক প্রকার শোথঃ, প্রবল উদর বিকৃতির সহিত যুহু জ্বর, প্রভৃতিতে পূর্বোক্ত এবং এই ঔষধ বিশেষ উপকারজনক।

মর্কিউরিয়স্-বাইবস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—পূর্বের ন্যায় ।

এই ঔষধ, জ্বরের সহিত, দক্ষিণ পার্শ্বে, পঙ্করের নীচে, বেদনা থাকিয়া যকৃতের দোষ থাকিলে, গলার বেদনা, অতিসার, কফ, অত্যন্ত ঘর্ম্মের সহিত প্রবল জ্বর, শোথঃ, এবং মুত্রস্থলীর নানাবিধ উপসর্গে, বিশেষ উপকারী হয় ।

রস্-টল্লিকোডেণ্ড্রন ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—ত্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর, কফি, সল্ফর ।

স্নায়ু, বন্ধনী-শিরা প্রভৃতি, এবং পাকস্থলী ও উদরের শ্লেষ্মা-পরিবাহক-সূক্ষ্ম-চর্ম্মের ও রক্ত পরিচালনের উপর বিশেষ অধিকার রাখে । স্নায়ু সহজীয় বাত রোগ, শ্লেষ্মাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চর্ম্ম রোগ, ক্ষুদ্র ফোঁফা, লোম বিশিষ্ট স্থানের দ্রুত রোগ, দৈনিক দোষ জন্য বিকার জ্বর, অজীর্ণ দোষ জন্য বিকার জ্বর, ধাতুস্থ জ্বর, অতিসার, আমাশয়, বাত রোগের তরুণাবস্থা, পাকস্থলী, অন্ত্র, বা ফুস্ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহ ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকার করে ।

রস্-রেডিকাস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—পূর্ববৎ ।

এই ঔষধ উক্ত ঔষধের ন্যায় লক্ষণানুযায়ী ফলদায়ক হয়, বিশেষতঃ বিকারাবস্থায় নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণা হইলে বিশেষ কার্য্য করে ।

লাইকোপোডিয়ম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—কফি, কপূর, পল্‌সেটিল।

ইহা শারীরিক পরিশোধক এবং প্রক্ষারক যন্ত্র সকলের উপর প্রবল রূপে অধিকার রাখে। বিশেষতঃ পরিপাক-শক্তির বিকৃতি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রাচীন রোগ, প্রাচীন চর্ম রোগ, অস্থি রোগ, স্ফোটক, কোষ্ঠবদ্ধতা, চক্ষুঃ এবং চক্ষুর পাতার ক্ষীণতা, যকৃতের প্রাচীন রোগ, যান্ত্রিক দোষের সহিত প্রাচীন এবং যুহু জ্বর, স্থান বিশেষের শোথঃ, প্রকাশ্য কারণ ব্যতিরেকে মাংস ক্ষয়, প্রাচীন কফ, বহুকাল স্থায়ী বাত রোগ, প্রভৃতিতে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

ল্যাকিসিস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—আর্সেনিকম্, বেলাডোনা, চায়না, এসিডম্-ফস্ফরিকম্ ।

এই ঔষধ, যান্ত্রিক শিরা সকলের উপর অতুল্য শক্তি ধারণ করে।

জীবনী-শক্তির হ্রাসতা জন্য যে সকল বিকৃতি হয়, তৎপক্ষে বিশেষতঃ তীব্র প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ সকলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থার ক্ষীণতায়, অত্যন্ত মাদক দ্রব্য ব্যবহার বা অতিরিক্ত পরিমাণে পান্য প্রভৃতি অন্যান্য প্রচণ্ড ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবন জন্য যে সকল রোগ হয়, প্রায় যাবতীয় শিরা সম্বন্ধীয় বহুকাল স্থায়ী রোগেতে, পিত্ত দোষ জন্য পাকস্থলীর এবং ভুক্ত-দ্রব্য-বাহক-প্রণালির মধ্যস্থ প্রদাহ, শ্বাস, কাশ, প্রভৃতি

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালীর রোগ, হৃৎপিণ্ডের এবং রক্ত পরিচালনের বিষয়তা, ও বিকৃতি, মস্তিষ্কের প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

ফ্যানম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষম্ব ।—পল্‌সেটিল ।

এই ঔষধ ক্ষয় রোগের সহিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের প্রাচীন রোগ, আন্তরিক মূত্র জ্বর, প্রাচীন শ্লেষ্মা উঠা, এবং দুর্বল শরীরে শ্লেষ্মা জন্য যে সকল রোগ হয়, উৎকাশী, স্ত্রীলোকের স্মৃতিকা রোগ, শ্বেত প্রদর, এবং প্রাচীন জরায়ু যন্ত্রের রোগ, প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারক হয় ।

ফ্যাকিসেগ্রিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষম্ব ।—কপূর ।

চুল্কানির ন্যায় প্রাচীন চর্ম্ম রোগ, রসঃস্রাব বিশিষ্ট ফুঙ্কুড়ি, পারা ব্যবহার জন্য যে সকল প্রাচীন রোগ হয়, মানসিক বৈরক্তি জন্য পীড়া, আহারের আতিশয্য জন্য প্রাচীন উপসর্গ সকল, মাটির পীড়া, চক্ষুর পাতার প্রাচীন ক্ষীততা, প্রবল দ্রুত, জরায়ু সম্বন্ধীয় যান্ত্রিক রোগ সকল, আমাশয় প্রভৃতি পাকস্থলী, বা উদরের দোষ জন্য পীড়া, অস্থি রোগ, মুখ রোগ ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয় ।

ইমোনিয়ম্ ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—নক্স-বমিকা, আকিং, তামাকু, উন্টিজ্জ অল্প ।

শিরা সকলের প্রবল উত্তেজনার সহিত, পিত্ত জন্য প্রদাহ বিশিষ্ট বিষম জ্বর, ধাতুস্থ জ্বর, প্রবল মস্তিষ্কের বিকৃতির সহিত বিকার জ্বর, মস্তিষ্কের স্ফীততা, এবং প্রদাহ, মস্তিষ্কের প্রদাহ জন্য টঙ্কার ও অপস্মারাদি রোগ, প্রলাপ, মস্তিষ্কের শোথঃ, প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক হয় ।

সাইকিউটা ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—আণিকা, তামাকু ।

এই ঔষধ, মস্তিষ্ক, যান্ত্রিক শিরা সকল, ও বাহ্যিক চর্ম্মা-দির উপর, বিশেষ অধিকার রাখে ।

তামাকু ইত্যাদি কটু-দ্রব্য-ব্যবহার জন্য যে সকল টঙ্কার রোগ হয়, বহ্যিক আঘাত বা আন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতি, ও মস্তিষ্কের প্রদাহ জন্য যে সকল অপস্মার, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ হয়, পাকস্থলীর এবং উদরের প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ সকল, মাংসপেশীর সঙ্কোচন, বা প্রসারণ, দাঁতি লাগা, স্মৃতিকাবস্থার মূর্ছাদি রোগ, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সাইলিশিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—কপূর, হেপার ।

শরীরের স্থান বিশেষে রক্ত বা অন্য প্রকার রসঃ, একত্র হওয়াতে গুঠলির প্রদাহ, এবং ক্ষত, বর্ণবিহীন স্ফোটক ইত্যাদি,

যান্ত্রিক বৃদ্ধি ও কঠিনতা, চর্ম্ম ফাটা, অস্থি রোগ, সমস্ত প্রকার শোথঃ, চক্ষুঃ এবং কর্ণ রোগ, পাকস্থলীর ও উদরের প্রাচীন রোগ, মস্তকে স্বাভাবিক শ্লেষ্মা বদ্ধতা, যে সকল শ্লেষ্মাজ ব্যাধিতে শক্তিহীন করে, প্রাচীন ঘা, দুর্বলতা বা ক্ষীণতার সহিত স্মৃতিকা রোগ প্রভৃতিতে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সিনা ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—ত্রায়োনিয়া, কুইনাইন্, হায়ো-
মায়েমস্, ইপিক্যাকুয়ানা ।

এই ঔষধ যান্ত্রিক শিরা সকলের, পাকস্থলীর, ভুক্ত-
বাহক-প্রণালীর ও মস্তিষ্কের উপর বিশেষ অধিকার রাখে ।
শরীর পোষণের অস্পৃশ্যতা জন্য সম্পূর্ণ মাংস-ক্ষয়ের সহিত যে
সকল মূর্ছা ইত্যাদি রোগ হয়, অজীর্ণ রোগের সহিত ক্রমি
দোষ, মস্তিষ্কের শোথঃ এবং প্রদাহ, ও স্বাভাবিক ক্রমিদোষ
জন্য বালকগণের শয্যায় প্রস্রাব করা, প্রভৃতি রোগের পক্ষে
এই ঔষধ বিশেষ উপকারক ।

সল্ফার ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—একোনাইট্, কপূর, ক্যামো-
মিলা, মর্কিউরিয়স্, নক্স-বমিকা, সিপিয়া ।

এই ঔষধ দুর্নানাবিধ রোগের প্রথমাবস্থায় বা শেষাবস্থায়,
বিশেষতঃ কোন প্রকার পারা ঘটিত ঔষধ সেবন দ্বারা যে সকল
রোগ উপস্থিত হয় তৎপক্ষে বিশেষ উপকারী ; আরও অনেক-

নেক রোগের চিকিৎসার প্রথমাবস্থায়, ইহা ব্যবহার করা-
ইয়া পুনর্ব্যায় চরমাবস্থায়, ব্যবস্থা করা যায়। অপিচ গুঠলি
বা চর্মের যাবতীয় প্রাচীন রোগ, বা যক্ষ্ম, প্লেইসা, পাত
রোগ, প্রাচীন অজীর্ণ রোগ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালীর এবং
রক্ত পরিচালনের যন্ত্রের প্রাচীন রোগাদিতে এই ঔষধ মধ্যে
মধ্যে প্রয়োজন হয়। বহুকাল স্থায়ী বাত রোগ, দুর্নিবার ঘা,
অস্থিস্বক্ষীয় রোগ সকল, শোথঃ, এবং দৌর্বল্য জন্য রোগ
সমুদয়, স্ফোটক প্রভৃতি নানাবিধ চর্ম রোগের তরুণাবস্থায়,
ও প্রাচীন চক্ষুরোগ, শিরারোগ, বৈকালিক এবং যুহু ধাতুস্থ
জ্বর, বহুকাল স্থায়ী দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা, বা ক্ষীণকারক অতিসার,
শ্বেত প্রদর, কষ্টার্ভব, প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ ও যে সকল
রোগে এই ঔষধ পূর্বে অধিক পরমাণে ব্যবহৃত না হইয়া
থাকে তৎসমুদয়ে ইহাকে সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা
যাইতে পারে।

সিকেন্।

প্রতিষেধক ও দোষল্প।—কপূর।

এই ঔষধ জরায়ু এবং তল্লিকটস্থ শিরা সকলের উপর
বিশেষ অধিকার রাখে। দুর্বলতা, স্মৃতিকা-রোগ বিশিষ্টা
স্ত্রীলোক সকলের টঙ্কার রোগ, শারীরিক নানাবিধ রক্ত হইতে
রক্ত স্রাব, ওলাউটার ঘোরতর বিকারাবস্থা, জরায়ুর অতিপ্র-
বল রোগ, ও উদ্বেজনা, অতিশয় রক্তস্রাব, গর্ভ পাতের প্রারম্ভ
কাল, অতিরিক্ত প্রসব বেদনা ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ
উপকারী হয়।

সিপিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—একোনাইট্, এণ্টিমোনিয়ম্-টার্ট্রে-
রিকম্, বিনিগার ।

ওই ঔষধ নানাবিধ যান্ত্রিক দোষ জন্য প্রাচীন উপসর্গ,
যাহা দুর্বলতা এবং ক্ষীণা স্ত্রীলোকগণের হইয়া থাকে, তৎপক্ষে
এবং দ্রুত ও স্ত্রীলোকের আর্তব দোষ জন্য অজীর্ণাদি রোগে
বিশেষ উপকারী ।

স্পঞ্জিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—কপূর ।

এই ঔষধ গ্লেজা-বাহক-সুক্ষ্ম-চর্ম্মের উপর এবং বায়ু-
বাহক প্রণালীর রোগ সকলে ও নানাবিধ গুঠলির বৃদ্ধি রোগেতে
বিশেষ উপকারী হয় ।

স্পাইজিলিয়া ।

প্রতিষেধক ও দোষস্ব ।—অরম্, ক্যাম্ফর, ।

বদনের শিরাতে এবং বাত রোগ জন্য যে সকল যাতনা
সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, সামান্যতঃ শিরার যাতনা, তীব্র
বাতরোগ, ক্রমি জন্য উপসর্গ সকল, উদরের প্রবল বিকৃতির
সহিত জ্বর, বক্ষঃস্থলে জল বদ্ধ, কফ জন্য জ্বর, হৃৎপিণ্ডের
যান্ত্রিক রোগাদির পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

স্থাবাইনা ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—কপূর, পলমেটিল ।

এই ঔষধ জরায়ু এবং তল্লিকটস্থ স্থানে রক্ত বদ্ধ জন্য যে সকল যান্ত্রিক উদ্বেজনা উপস্থিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ অধিকার রাখে । গর্ভপাত আশঙ্কার সহিত গর্ভ কালীন অতিরিক্ত রজঃ প্রাব, ও অত্যন্ত বেদনা, গর্ভকালীন, বা গর্ভপাতের পর, জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত প্রাব, আর্তব দোষ, গ্রন্থিবাত এবং বাতরোগ, স্মৃতিকাবস্থায় দন্তরোগ, প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

হায়োসায়েরমন্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—বেলাডোনা, কপূর, সিন্‌কোনা, বিনিগার, ।

এই ঔষধ মস্তিষ্ক এবং যান্ত্রিক শিরা সকলের ও রক্ত পরিচালনের উপর বিশেষ অধিকার রাখে । প্রবল শিরা সম্বন্ধীয় বিকৃতির সহিত প্রদাহ যুক্ত বা টঙ্কার বিশিষ্ট রোগ সকল, প্রদাহ বিশিষ্ট অপস্মার রোগ, প্রদাহ জন্য মস্তিষ্কের এবং মানসিক বিকৃতি, প্রলাপ, ধাতুস্থ জ্বর, পশু কর্তৃক দংশন জন্য জলভীতি, প্রসব কালীন মুচ্ছাদি রোগ, মস্তিষ্কের শোথের তরুণাবস্থা, প্রভৃতি রোগেতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

হেপার ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—বেলাডোনা, ক্যামোমিল, বিনিগার ।

এই ঔষধ বায়ু-প্রবাহ-প্রণালীর সূক্ষ্ম-ভ্রকের উপর, যাবতীয় গুঠলি এবং সর্বাঙ্গীন চর্ম্মের ও পরিশোধক ও প্রক্ষারক

যন্ত্র সকলের, এবং লাল উৎপাদক গুঠলি সকলের উপর বিশেষ অধিকার রাখে । বদনে এবং মস্তকে বা শরীরের অন্য স্থানে যে সকল প্রদাহ বিশিষ্ট দুর্দম্য চর্ম্ম রোগ উপস্থিত হয়, পারা দোষ জন্য নানাবিধ উপসর্গ, দুর্গিবার ঘা, (যাহা পচিয়া এবং গলিয়া যাইবার উপক্রম বোধ হয়,) বায়ু-বাহক-প্রণালির ভিতর প্রদাহ বিশিষ্ট স্ফোটকাদি, (যাহা পাকিবার সম্ভাবনা), অতিরিক্ত পারা সেবন জন্য মাটিতে বেদনা, নানাবিধ কাশী, এবং ক্ষয় কাশের উপক্রম, কর্ণের প্রদাহ, কর্ণ হইতে রসঃ স্রাব, স্ফীততার সহিত গুঠলি পাকিবার ন্যায় প্রদাহ, প্রাচীন বা তরুণ স্ফোটক, গুঠলির ঘা প্রভৃতিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

হিলেবোরস্ ।

প্রতিষেধক ও দোষঘ্ন ।—কপূর, চায়না ।

ইচ্ছাৎ হিম সেবন জন্য বা কোন প্রকার বিষ-স্ফোটকাদি নিবারণ জন্য যে সকল শোথঃ রোগ উপস্থিত হয়, মস্তিষ্কের, কশেরুকা সম্বন্ধীয় প্রদাহ বিশিষ্ট উপসর্গ, অথবা শিরা সমূহের অবসন্নতা প্রযুক্ত রোগাদিতে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সম্পূর্ণ

এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নিঘণ্ট । *

অরম্ ।	ককিউলস্
আর্গিকা ।	কফি ।
আর্সেনিকম্ ।	কপূরের আরক ।
ইউফ্রেশিয়া ।	কলোসিস্টিস্ ।
ইথ্রেশিয়া ।	কল্‌টিকম্ ।
একোনাইট্ ।	কফিকম্ ।
এণ্টিমোনিয়ম-ক্লডম্ ।	কর্বো-বেজিটেবিলিস্
এণ্টিমোনিয়ম-টার্টেরিকম্	কুপ্রম্ ।
এলম্ ।	কোনিয়ম্ ।
এসিডম্-নাইট্রিকম্ ।	ক্যান্‌থ্যারাইডিস্
এসিডম্-কস্‌ফরিকম্ ।	ক্যাপ্‌সিকম্ ।
এসিডম্-সল্‌ফরিকম্ ।	ক্যামোমিলা ।
ওপিয়ম্ ।	ক্যালেকেরিয়া ।

* সঙ্গুণ ব্যবস্থাস্থায়ী ঔষধে গুণমিশ্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্বারা ঔষধের গুণের তারতম্য হয়, অতএব এতদ্বারা যে সকল স্থানে ঔষধের গুণমিশ্র বিষয়, বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে তৎ তৎ স্থানে সেই মত এবং অনুরূপ স্থানে যষ্ট গুণ মিশ্র ঔষধ ব্যবহার করিবেক । গুণমিশ্র, লিখিবার নিয়ম, যথা অরম্ ১ অর্থাৎ এক গুণ মিশ্র, অরম্ ৬ অর্থাৎ ষষ্ট গুণ মিশ্র, অরম্ ৬০ অর্থাৎ ত্রিংশ গুণ মিশ্র অরম্ ৮ অর্থাৎ অমিশ্র ইত্যাদি ।

ক্যালি-কার্বোনিকম্ ।

ক্যালি-বাইক্লোম্যাস্

ক্যালেন্ডিউলা ।

গ্র্যাকাইটিস্ ।

চায়না ।

জিঙ্কম্ ।

ট্যারেক্সেসেকম্ ।

ডল্কেমেরা ।

ডিজিটেলিস্ ।

ড্রোসেরা ।

খুজা ।

নক্স-বম্বিকা ।

পডোফায়লম্ ।

পল্‌সেটিল ।

পিট্রোলিয়ম্ ।

প্লম্‌ম্ ।

প্ল্যাটিনম্ ।

ফস্ফরিকম্ ।

ফেরম্ ।

বেরাট্রম্ ।

বেলাডোনা ।

ব্রায়োনিয়া ।

ব্যারায়টা ।

মর্কিউরিয়স্-করোসাইবস্ ।

মর্কিউরিয়স্-বাইবস্ ।

মর্কিউরিয়স্-মোলিউবিলিস্

রস্-টক্সিকোডেন্ড্রন্ ।

রস্-রোডিক্যান্স্ ।

লাইকোপোডিয়ম্ ।

ল্যাকিসিস্ ।

ফ্যানম্ ।

ফ্যাফিসেগ্রিয়া ।

ফ্র্যামোনিয়ম্ ।

সাইকিউটা ।

সাইলিশিয়া ।

সিনা ।

সল্‌ফর্ ।

সিকেল্ ।

সিপিয়া ।

স্পঞ্জিয়া ।

স্পাইজিলিয়া ।

স্যাবায়না ।

হায়োসায়েরস্ ।

হেপার্ । (অর্থাৎ হেপার্-সল্-
কর্)

হিলেবোরস্ ।

এতদ্রূপে যে সকল কাঠিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ ।

অবসন্নতা, অবসাদ; এক প্রকার শক্তির হানি ।

অন্ত্র, আঁতড়ি, ভুঁড়ি ।

আর্তব, স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুকালীন যে রক্তবর্ণ পদার্থ নির্গত হয় ।

আবল্য, এক প্রকার অলস ।

উদরাদ্ধান, পেট ফাঁপা ।

উত্তানশায়ী, চিৎ হইয়া শয়ন করা ।

উপদংশ, গর্ম্মির পীড়া ।

উপর্যুপরি, এক বার একটা পুনর্ব্বার অপরটা, পুনর্ব্বার প্রথম হইতে

ঐ রূপে ।

কর্কশ কাশী, যে কাশীতে কর্কশ শব্দ হয় ।

কণ্ডু, চুল্কনা ।

কষ্ঠার্ভব, স্ত্রীলোকের বাধকের পীড়া ।

কশেরুকা, পিঠের ভাঁড়ার হাড় ।

ক্ষার, ভস্মের স্থায় ।

ক্ষুদ্রান্ন, পাকস্থলী হইতে রহদন্ত্র পর্য্যন্ত যে নাল-ভাগ ২৪ ফুট দীর্ঘ ।

গৃহিণী, প্রাচীন অতিসার রোগ ।

ছিল্লি, বিরিক্তিজনক স্বভাব ।

জরায়ু, স্ত্রীলোকের গর্ভে, যে স্থানে সন্তান থাকে ।

টঙ্কার, এক প্রকার শরীরের টান ।

ইন্দ্রিয় দ্বারা শরীরের উপর স্পর্শ বোধ হয় ।

বিশেষ বা যন্ত্রবিশেষ দিয়া জলবৎ পদার্থ নিঃসরণ ।

যথ দ্বারা অত্র ঔষধের বিষ দোষ নষ্ট হয় ।

ঔষধিক অবস্থা বিশেষ ।

নিদান, রোগের আদি কারণ ।

নিঃশেষিত, এক কালীন নিবারিত হওয়া ।

পাকাশয়, আহাৰ করিলে ভুক্ত-দ্রব্য প্রথমতঃ যে স্থানে থাকে ।

প্রতিষেধক, যে ঔষধ, অত্র ঔষধের গুণের বাধক হয় ।

পরিশোধক যন্ত্র, শরীরের যে যন্ত্র, রসঃ শোধন করে ।

পাকস্থলী, পাকাশয় দেখ ।

পিচ্ছিল, পিছলা, তৈলের স্থায় ।

পূর্ববৎ, উপরের ব্যবস্থায় যাহা লিখিত হইয়াছে সেই অনুসারে ।

প্রস্ফারক-যন্ত্র, শারীরিক যে যন্ত্র হইতে বাষ্প উঠে ।

ফুস্ফুস্ যন্ত্র, যে যন্ত্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি হয় ।

বন্ধনি শিরা, শরীরের অভ্যন্তরস্থ এক প্রকার শিরা বিশেষ ।

বলি, এক প্রকার বুটি ।

বয়ু-বাহক-প্রাণালী, ফুস্ ফুস্ যন্ত্র হইতে যে পথ দিয়া বায়ু চালিত হয় ।

বায়ুরক্ত, শারীরিক যে সকল গহ্বর মধ্যে বায়ু নিবিষ্ট থাকে ।

বিরাম, যখন আর কিছুই থাকে না ।

বিরেচন, মলাদি নির্গত হওয়া ।

বিষম, যাহা সমভাবে চলে না ।

বৃহদন্ত্র, মলদ্বার হইতে উর্দ্ধদিগে দুই হস্ত পরিমাণ পর্য্যন্ত নাল ।

ভুক্ত-দ্রব্য-প্রবাহক-প্রাণালী, আহাৰ করিলে যে পথ দিয়া ভুক্ত-দ্রব্য, মল-ভাণ্ডের দিকে চালিত হয় ।

তাড়ই, পক্ষীবিশেষ ।

মল নিঃসরণের প্রণালী, মলদ্বার হইতে উদরের মধ্যে

পরিমাণ যে নাল আছে ও যাহার মধ্যে মল থাকে ।

মস্তিষ্ক, সাধারণ ভাষায় মগজ্জ, মস্তকের ভিতর তুলার ত্র্যায় যে পদ থাকে ।

মাংসপেশী, শারীরিক মাংসবিশেষ যাহা স্বচ্ছ-স্ফন্দ-চর্মের দ্বারা আবৃত থাকে ।

মূত্রস্থলী, উদরের অধোভাগে স্থিত থলিয়া যাহার মধ্যে মূত্র থাকে ।

মূত্রআবক যন্ত্র, যে যন্ত্র দিয়া মূত্র নির্গত হয় ।

মূত্রগ্রন্থি, যে স্থানে মূত্র উৎপন্ন হয় ।

মেরুদণ্ড, মস্তকের নিম্নভাগ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত যে সকল অস্থি খণ্ড সজ্জিত আছে, অর্থাৎ পিঠের ডাঁড়া ।

যান্ত্রিকআব, শরীরের মধ্যস্থিত যন্ত্র হইতে রসাদি নির্গমন ।

যান্ত্রিকপোষণ, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র, রসাদি দ্বারা পোষিত হওয়া ।

যান্ত্রিকশোষণ, যে ক্রিয়া দ্বারা শরীরিক যন্ত্র, রসাদি টানিয়া লয় ।

রেচন, রসাদি নির্গমন ।

লালা, জলবৎ পিচ্ছলা পদার্থ ।

সংশ্লিষ্ট, মিশ্রিত হওয়া, বা মিলিয়া থাকা ।

স্তন্য, স্তনের দুগ্ধ ।

স্মৃতিকা, সন্তান প্রসব কাল সম্বন্ধীয় ।

আবকযন্ত্র, শরীরের যে যন্ত্র দিয়া রসাদি আব হয় ।

আয়ু, শারীরিক শিরা বিশেষ ।

হৃৎপিণ্ড, বক্ষঃস্থলের বাম ভাগের মধ্যে স্থিত কুঁস্ কুঁস্ যন্ত্রের একাংশ যাহার মধ্যে অপরিষ্কৃত রক্তভাগ প্রবিষ্ট হইয়া পরিষ্কৃত হওয়ার পর সমস্ত শরীরে চালিত হয় ।

বিজ্ঞাপন ।



সদৃশ ব্যবস্থা (হোমিওপ্যাথি) মতের ঔষধ সকল মহানগর কলিকাতা লাল বাজারের ১২ নম্বর বাটীতে বেরিনি কোম্পানির ঔষধালয়ে পাওয়া যায়, অতএব যাঁহার উক্ত ঔষধ সকল গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র বা লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন ।

ঔষধের মূল্য জানিবার আবশ্যক হইলে উক্ত কোম্পানির নিকট জানিতে এবং আবশ্যকীয় ঔষধের উপযুক্ত মূল্য প্রেরণ করিলে অনায়াসে পাইতে পারিবেন । প্রয়োজনীয় ঔষধ অনাইবার জন্য পত্র লিখিতে হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে লিখিতে হইবে ।

নিয়ম যথা ।



একোনাইট ক্ষুদ্র-বটিকা^৬ ১ এক ড্রাম্ ।

আর্সেনিকম্^{১২} ... আরক ৪ চারি ড্রাম্ ।

২ দুই ড্রাম্ ।

১ এক আউন্স ।

৪ চারি ড্রাম ইত্যাদি ।

